

ACETYLCYSTEINE 200mg

Viên nang

CÔNG THỨC:

Acetylcysteine200mg

Tá dược vừa đủ1 viên

(Tinh bột ngô, lactose, povidone, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, ethanol 96%).

TÍNH CHẤT:

Acetylcysteine là chất điều hòa chất nhầy theo kiểu làm tan đàm, làm lỏng dịch tiết niêm mạc đường hô hấp. Thuốc tác động trên pha gel của đàm bằng cách cắt đứt cầu disulfur của các glycoprotein.

CHỈ ĐỊNH:

- Làm long đàm trong trường hợp viêm phế quản-phổi, viêm khí phế quản cấp và mạn.
- Phòng ngừa các biến chứng hô hấp ở bệnh nhân nhiễm khuẩn, đa tiết phế quản, khí phế thũng.

CÁCH DÙNG:

- Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: uống 1 viên/lần, ngày 3 lần.
- Trẻ từ 2 - 7 tuổi: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với thành phần của thuốc.
- Tiền sử hen suyễn.
- Trẻ dưới 2 tuổi.

THẬN TRỌNG:

- Phải giám sát nguy cơ phát hen khi dùng thuốc cho người có tiền sử dị ứng.
- Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân giảm khả năng ho, loét dạ dày-tá tràng.

THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:

Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú.

TÁC DỤNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY:

Thận trọng khi sử dụng cho người lái tàu xe hoặc vận hành máy.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Ở liều cao, có thể gây rối loạn tiêu hóa (đau dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy), trong trường hợp này cần giảm liều.
- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Trong thời gian điều trị với acetylcysteine không nên dùng các thuốc chống ho hoặc các thuốc làm giảm dịch tiết phế quản.
- Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng.

QUÁ LIỀU & CÁCH XỬ TRÍ:

Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

HẠN DÙNG:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TRÌNH BÀY:

- Chai 80 viên.
- Vỉ 10 viên. Hộp 10 vỉ.

Sản xuất theo TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam