https://trungtamthuoc.com/

Thành phần:
Adenosin triphosphat dinatri.....60 mg
Tá dược vđ.....1 viên

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

M.S.D.N: 3700634575-C.T.C.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN
TX. BẾN CÁT-T. BÌNH DƯƠNG

Rx Thuốc kê đơn

GMP-WHO

Adenosin EC MDS 60 mg

Adenosin triphosphat dinatri 60 mg

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao tan trong ruột

MEDISUN

Composition:
Adenosine triphosphate disodium.....60 mg
Excipients q.s.....1 tablet

Storage: Dry place, not above 30°C, protect from light.

Specification: Manufacturer's.

Keep out of reach of children
Read the leaflet carefully before use

Indications, administration, contraindications and other information: See package insert.

Manufacturer:
MEDISUN PHARMACEUTICAL J.S.C
No. 521, An Loi Quarter, Hoa Loi Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province

SĐK (Reg. No) :
Số lô SX (Lot. No) :
NSX (Mfg. Date) :
HD (Exp. Date) :

Rx Prescription drug


GMP-WHO

Adenosin EC MDS 60 mg

Adenosine triphosphate disodium 60 mg

Box of 3 blisters x 10 enteric coated tablets

MEDISUN



https://trungtamthuoc.com/

Thành phần:
Adenosin triphosphat dinatri.....60 mg
Tá dược vđ.....1 viên

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

M.S.D.N: 3700634575-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN
TX. BẾN CÁT - T. BÌNH DƯƠNG

Rx Thuốc kê đơn

GMP-WHO

Adenosin EC MDS 60 mg

Adenosin triphosphat dinatri 60 mg

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao tan trong ruột

MEDISUN

Composition:
Adenosine triphosphate disodium.....60 mg
Excipients q.s.....1 tablet

Storage: Dry place, not above 30°C, protect from light.

Specification: Manufacturer's.

Keep out of reach of children
Read the leaflet carefully before use

Indications, administration, contraindications and other information: See package insert.

Manufacturer:
MEDISUN PHARMACEUTICAL J.S.C
No. 521, An Loi Quarter, Hoa Loi Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province

SĐK (Reg. No) :
Số lô SX (Lot. No) :
NSX (Mfg. Date) :
HD (Exp. Date) :

Rx Prescription drug


GMP-WHO

Adenosin EC MDS 60 mg

Adenosine triphosphate disodium 60 mg

Box of 6 blisters x 10 enteric coated tablets

MEDISUN



https://trungtamthuoc.com/

Rx - Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc



ADENOSIN EC MDS 60 mg

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

1. THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

Mỗi viên nén bao tan trong ruột chứa:

Thành phần dược chất: Adenosin triphosphat dinatri 60 mg

Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, cellulose vi tinh thể 101, dinatri edetat, hydroxypropyl methylcellulose E6, natri croscarmellose, silicon dioxid keo, magnesi stearat, methacrylic acid and methyl methacrylate copolymer (1:1), PEG 6000, titan dioxid, talc, natri lauryl sulfat

2. DẠNG BÀO CHẾ

Viên nén bao tan trong ruột.

Mô tả: Viên nén bao tan trong ruột màu trắng, hình tròn, cạnh và thành viên lành lặn.

3. CHỈ ĐỊNH

Cải thiện các di chứng do chấn thương đầu.

Điều trị suy tim.

Điều trị viêm dạ dày mạn tính liên quan đến rối loạn chức năng của đường tiêu hóa.

Điều trị chứng mỏi mắt do điều tiết.

4. CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG

Uống 40-60 mg x 3 lần/ngày. Liều nên được điều chỉnh tùy theo triệu chứng của bệnh nhân.

Nuốt nguyên viên thuốc với nước, không được nhai, bẻ hay nghiền nhỏ viên.

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Tính an toàn và hiệu quả ở trẻ em chưa được thiết lập.

Thận trọng khi dùng thuốc cho người cao tuổi vì chức năng sinh lý ở người cao tuổi có thể bị suy giảm.

Thuốc này có chứa lactose. Bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp về không dung nạp galactose, thiếu lactase hoàn toàn hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này.

7. SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Không khuyến cáo dùng adenosin triphosphat dinatri cho phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ có thể mang thai.

Phụ nữ cho con bú

https://trungtamthuoc.com/

Cân nhắc việc tiếp tục hoặc ngừng cho con bú dựa trên lợi ích của việc điều trị và lợi ích của việc cho con bú.

8. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

9. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC

Dipyridamol có thể làm tăng nồng độ trong máu của adenosin, một sản phẩm phân hủy của adenosin triphosphat, và có thể làm tăng tác dụng trên tim mạch.

10. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Ít gặp, ADR < 1/100

Tiêu hóa: Buồn nôn, chán ăn, rối loạn tiêu hóa, táo bón, loét miệng

Tim mạch: Rối loạn nhịp tim

Quá mẫn: Ngứa

Thần kinh: Nhức đầu, buồn ngủ, bồn chồn

Thính giác: Ù tai

Khác: Mệt mỏi

Chưa rõ tần suất

Quá mẫn: Phát ban

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

11. QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

12. ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược lý: Các chế phẩm hỗ trợ tim mạch khác

Mã ATC: C01EB10

Adenosin triphosphat tham gia vào quá trình chuyển hóa của tế bào cơ và mô thần kinh.

13. ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Sau khi dùng một liều uống duy nhất 120 mg adenosin triphosphat dinatri (ATP-2Na, n = 5) cho nam giới khỏe mạnh, kết quả định lượng nồng độ ATP trong máu ở 30, 60, 120 và 180 phút có xu hướng tăng sau 60 phút dùng thuốc.

14. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 3 vỉ x 10 viên.

Hộp 6 vỉ x 10 viên.

15. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THUỐC

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: TCCS.

16. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

https://trungtamthuoc.com/

Tên cơ sở sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN**

Địa chỉ: Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

