

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 2 vỉ

2 - Mẫu nhãn vỉ chứa 10 viên nén bao phim

(Số lô SX, Hạn dùng được dập nổi trên vỉ)

Thành phần:

Escin 20 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn
và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:

R_x

THUỐC KÊ ĐƠN

GMP - WHO

AENEAS 20

Escin
20 mg

VIÊN NÉN BAO PHIM
Hộp 2 vỉ x 10 viên



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Sân xuất tại nhà máy:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:

R_x
AENEAS 20
Escin
20 mg

AN THIÊN PHARMACEUTICAL CORPORATION
314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

FILM-COATED TABLETS
Box of 2 blisters x 10 tablets

AENEAS 20
Escin
20 mg

PRESCRIPTION DRUG

R_x

GMP - WHO



Ngày 22. Tháng 05. Năm 2020

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS.DS. Nguyễn Trung Hiếu

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 3 vỉ

2 - Mẫu nhãn vỉ chứa 10 viên nén bao phim

(Số lô SX, Hạn dùng được dập nổi trên vỉ)

Thành phần:

Escin 20 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn
và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:



THUỐC KÊ ĐƠN

GMP - WHO

AENEAS 20

Escin
20 mg

VIÊN NÉN BAO PHIM
Hộp 3 vỉ x 10 viên



AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh



Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:

BÊ XÁ TÂM TAY TRỀ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Sản xuất tại nhà máy:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh



AENEAS 20
Escin
20 mg

AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION
314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City



FILM-COATED TABLETS
Box of 3 blisters x 10 tablets

AENEAS 20

Escin
20 mg

PRESCRIPTION DRUG



GMP - WHO



Ngày ..22 Tháng ..05 Năm 2020

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS.DS. Nguyễn Trọng Hiếu

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 5 vỉ

2 - Mẫu nhãn vỉ chứa 10 viên nén bao phim

(Số lô SX, Hạn dùng được dập nổi trên vỉ)

Thành phần:

Escin 20 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:

R_x

THUỐC KÊ ĐƠN

GMP - WHO

AENEAS 20

Escin
20 mg

VIÊN NÉN BAO PHIM
Hộp 5 vỉ x 10 viên



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh



Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:

ĐỀ XA TÂM TÂY TRÉ EM
ĐƯỢC KÝ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Sân xuất tại nhà máy:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION
314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City



FILM-COATED TABLETS
Box of 5 blisters x 10 tablets

Escin
20 mg

AENEAS 20

PRESCRIPTION DRUG

R_x


GMP - WHO

AENEAS 20
Escin
20 mg



Ngày ..22.. Tháng ..05.. Năm 2020

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS.DS. Nguyễn Trung Hiếu

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 10 vỉ

2 - Mẫu nhãn vỉ chứa 10 viên nén bao phim

(Số lô SX, Hạn dùng được dập nổi trên vỉ)

Thành phần:

Escin 20 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:

Rx
THUỐC KÊ ĐƠN

GMP - WHO

AENEAS 20

Escin
20 mg

VIÊN NÉN BAO PHIM
Hộp 10 vỉ x 10 viên

AT
AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh



Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:

ĐỀ XA TÂM TAY TRẒ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Sân xuất tại nhà máy:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION
314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City



AENEAS 20
Escin
20 mg
FILM-COATED TABLETS
Box of 10 blisters x 10 tablets

Rx
PRESCRIPTION DRUG

GMP - WHO

Rx

AENEAS 20
Escin
20 mg



Ngày 12. Tháng 05. Năm 2020

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS.DS. Nguyễn Trung Hiếu

- 1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 30 viên nén bao phim
- 2 - Mẫu nhãn chai 30 viên nén bao phim

 THUỐC KÊ ĐƠN GMP - WHO	Thành phần: Escin 20 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Rx THUỐC KÊ ĐƠN AENEAS 20 Escin 20 mg VIÊN NÉN BAO PHIM Chai 30 viên GMP - WHO Sản xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Rx THUỐC KÊ ĐƠN AENEAS 20 Escin 20 mg VIÊN NÉN BAO PHIM Hộp 1 chai 30 viên GMP - WHO Thành phần: Escin 20 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Số lô sản xuất: Ngày sản xuất: Hạn dùng: AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	Rx PRESCRIPTION DRUG AENEAS 20 Escin 20 mg FILM-COATED TABLETS Box of 1 bottle of 30 tablets GMP - WHO Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Tiêu chuẩn: TCCS SDK: ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Sản xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh  AN THIEN PHARMA AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

Ngày ..22.. Tháng ..05.. Năm 2020
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS.DS. Nguyễn Trung Hiếu

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 60 viên nén bao phim

2 - Mẫu nhãn chai 60 viên nén bao phim

 THUỐC KÊ ĐƠN GMP - WHO	Thành phần: Escin 20 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. THUỐC KÊ ĐƠN AENEAS 20 Escin 20 mg VIÊN NÉN BAO PHIM Chai 60 viên GMP - WHO Sản xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh		
THUỐC KÊ ĐƠN AENEAS 20 Escin 20 mg VIÊN NÉN BAO PHIM Hộp 1 chai 60 viên AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	Thành phần: Escin 20 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Số lô sản xuất: Ngày sản xuất: Hạn dùng:	PRESCRIPTION DRUG AENEAS 20 Escin 20 mg FILM-COATED TABLETS Box of 1 bottle of 60 tablets AN THIEN PHARMA AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City	Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Tiêu chuẩn: TCCS SDK: ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Sản xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 

Ngày ..22.. Tháng ..05.. Năm ..2020

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS.DS. Nguyễn Trung Hiếu



1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 100 viên nén bao phim

2 - Mẫu nhãn chai 100 viên nén bao phim

AENEAS 20 Escin 20 mg THUỐC KÉ ĐƠN GMP - WHO	Thành phần: Escin 20 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. THUỐC KÉ ĐƠN AENEAS 20 Escin 20 mg VIÊN NÉN BAO PHIM Chai 100 viên GMP - WHO Sản xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh		
AENEAS 20 Escin 20 mg VIÊN NÉN BAO PHIM Hộp 1 chai 100 viên AN THIEN PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	Thành phần: Escin 20 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Số lô sản xuất: Ngày sản xuất: Hạn dùng:	AENEAS 20 Escin 20 mg FILM-COATED TABLETS Box of 1 bottle of 100 tablets AN THIEN PHARMA AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City	Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Tiêu chuẩn: TCCS SĐK: ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Sản xuất tại nhà máy: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 

Ngày ..22.. Tháng ..05.. Năm ..2020

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS.DS. Nguyễn Trung Hiếu

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

 Thuốc kê đơn

Viên nén bao phim AENEAS 20

Viên nén bao phim AENEAS 40

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ

KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC QUÁ HẠN DÙNG GHI TRÊN NHÃN

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC

THÀNH PHẦN: Viên nén bao phim AENEAS có 2 hàm lượng:

	AENEAS 20	AENEAS 40
Hoạt chất	Escin 20 mg	Escin 40 mg
Tá dược: Vừa đủ 1 viên	Lactose, Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, Talc, Magnesium stearate, Opadry white II, Iron oxide red, Iron oxide yellow	Lactose, Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, PVP K30, Talc, Magnesium stearate, Opadry white II
Dạng bào chế	Viên nén bao phim	Viên nén bao phim
Mô tả sản phẩm	Viên nén tròn, bao phim màu cam	Viên nén tròn, bao phim màu trắng

CHỈ ĐỊNH

Viên nén bao phim AENEAS được chỉ định trong:

- Điều trị suy giãn tĩnh mạch mạn tính, giãn tĩnh mạch chân, trĩ.
- Điều trị viêm tĩnh mạch chân.
- Phòng và điều trị tụ máu, chống viêm, chống phù nề sau phẫu thuật và chấn thương.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng

Người lớn

Liều tấn công: Dùng 40 mg escin (1 viên AENEAS 40 hoặc 2 viên AENEAS 20), 3 lần/ngày.

Liều duy trì: Dùng 20 mg escin (1 viên AENEAS 20), 3 lần/ngày hoặc 40 mg escin (1 viên AENEAS 40), 1 – 2 lần/ngày, tùy vào chỉ định của bác sĩ.

Dùng thuốc trong thời gian ít nhất 4 tuần để có đáp ứng mong muốn. Nếu cần dùng thuốc trong thời gian dài hơn, cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Trẻ em: Không khuyến cáo sử dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.

Cách dùng

Uống thuốc sau bữa ăn, uống với nhiều nước.



CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mẫn cảm với escin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Bệnh nhân có tình trạng tan máu, suy thận cấp, phù do tim.

Bệnh nhân có nguy cơ huyết khối.

Phụ nữ dùng đồng thời biện pháp tránh thai đường uống.

Phụ nữ trong ba tháng đầu thai kỳ và phụ nữ cho con bú.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

AENEAS không nên dùng cho các bệnh nhân bị suy thận. Tuy nhiên, trong trường hợp cần dùng thuốc cho các bệnh nhân bị giảm chức năng thận (ví dụ: chấn thương phần mềm, chấn thương sọ não, bong nặng), cần theo dõi chức năng thận từ khi bắt đầu sử dụng thuốc và có thể ngừng thuốc khi cần thiết.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như: Viêm da, viêm tĩnh mạch huyết khối hoặc cứng dưới da, đau dữ dội, loét, sưng đột ngột một hoặc cả hai chân, suy tim hoặc suy thận. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh trầm trọng, cần ngừng thuốc và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Trong trường hợp sử dụng đồng thời với thuốc chống đông máu, nên thường xuyên theo dõi các thông số giúp đánh giá khả năng đông máu (các xét nghiệm đông máu).

Cần kết hợp sử dụng thuốc với các biện pháp điều trị không xâm lấn khác theo chỉ định của bác sĩ, chẳng hạn như băng bó chi dưới, mang vớ nén hoặc chườm chân bằng nước lạnh

Cảnh báo tá dược

Thành phần thuốc có chứa lactose, bệnh nhân bị rối loạn di truyền hiếm gặp như không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase hoàn toàn hoặc kém hấp thu glucose – galactose không nên dùng thuốc này.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Sự an toàn và hiệu quả của escin ở phụ nữ có thai chưa được thiết lập, không dùng escin cho phụ nữ có thai trong ba tháng đầu thai kỳ.

Phụ nữ cho con bú

Sự an toàn và hiệu quả của escin ở phụ nữ cho con bú chưa được thiết lập, không dùng escin cho phụ nữ cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chóng mặt có thể xảy ra sau khi dùng thuốc, do đó, cần thận trọng khi dùng escin ở người lái xe hay vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Tương tác

Tránh dùng đồng thời kháng sinh aminoglycoside (như gentamicin) với escin vì escin có thể làm tăng độc tính trên thận của những kháng sinh này.

Sự liên kết của escin với protein huyết tương có thể bị ảnh hưởng bởi một số loại kháng sinh, như cefalotin, có thể làm tăng nồng độ escin tự do trong huyết thanh.

Escin có thể làm tăng cường tác dụng của thuốc chống đông máu dùng đồng thời. Trong trường hợp này, cần điều chỉnh liều thích hợp, dựa trên các kết quả của một số xét nghiệm đông máu (như thời gian prothrombin).

Tương kỵ

Không áp dụng.

305706

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUỐC PH
N THỊ

2.7.5.15

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Cũng như tất cả các thuốc khác, viên nén bao phim AENEAS có thể gây ra các tác dụng không mong muốn, mặc dù không phải ai cũng gặp phải. Các tác dụng không mong muốn sau đây được báo cáo với các tần số tương ứng: *Rất thường gặp* ($ADR \geq 1/10$), *thường gặp* ($1/100 \leq ADR < 1/10$), *ít gặp* ($1/1.000 \leq ADR < 1/100$), *hiếm gặp* ($1/10.000 \leq ADR < 1/1.000$), *rất hiếm gặp* ($ADR < 1/10.000$) và *không biết* (tần số không thể được ước tính từ dữ liệu có sẵn).

Rối loạn hệ thống cơ quan	Tần suất	Tác dụng không mong muốn
Rối loạn hệ thống miễn dịch	<i>Hiếm gặp</i>	Viêm da dị ứng (ngứa, phát ban, ban đỏ, chàm).
	<i>Rất hiếm gặp</i>	Phản ứng quá mẫn nghiêm trọng (trong một số trường hợp bị xuất huyết).
Rối loạn hệ thần kinh	<i>Ít gặp</i>	Chóng mặt, nhức đầu.
Rối loạn tiêu hóa	<i>Ít gặp</i>	Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, khó tiêu.
Rối loạn tim	<i>Rất hiếm gặp</i>	Nhịp tim nhanh.
Rối loạn mạch máu	<i>Rất hiếm gặp</i>	Tăng huyết áp.
Rối loạn hệ thống sinh sản và rối loạn vú	<i>Rất hiếm gặp</i>	Băng huyết.

THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ NHỮNG PHẢN ỨNG CÓ HẠI GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Quá liều

Quá liều escin có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn và tiêu chảy và có thể xảy ra một số tác dụng không mong muốn.

Cách xử trí

Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Khi xảy ra quá liều, bệnh nhân cần được điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ thích hợp.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

Dược lực học

Nhóm dược lý: Thuốc bảo vệ mao mạch.

Mã ATC: C05CX

Escin làm giảm tính thấm thấu của nước và protein qua mao mạch. Được dùng để điều trị các loại viêm nhiễm và phù nề khác nhau, để làm giảm sưng do thâm tím, gãy xương, chấn thương sọ não, sau phẫu thuật và sưng mô mềm sau chấn thương, và các viêm tắc tĩnh mạch cấp. Escin làm giảm hoạt tính các enzyme ở lysosome và giới hạn sự phóng thích enzyme. Escin cũng cải thiện trương lực tĩnh mạch bằng cách tăng cường hiệu quả co thắt của noradrenaline – nhưng không ảnh hưởng đến huyết áp động mạch và huyết áp tâm thu.

Dược động học:

Escin được hấp thu chủ yếu từ tá tràng và đoạn đầu ruột non. Escin liên kết với protein huyết tương và được bài tiết chủ yếu qua mật và nước tiểu dưới dạng các chất chuyển hóa không hoạt tính.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

AENEAS 20	AENEAS 40
Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên Hộp 1 chai 30 viên, 60 viên, 100 viên	Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên Hộp 1 chai 30 viên, 60 viên, 100 viên

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.


Sản xuất tại nhà máy:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2020

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ThS. DS. Nguyễn Trung Hiếu

