

Nhãn chai ALOGAS (43x65mm)

Thể tích 50ml

Mặt trước

Mặt sau



TP.HCM Ngày 26 tháng 11 Năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT
Giám Đốc



Lê Văn Thống

Nhãn chai ALOGAS (43x65mm)

Thể tích 100ml

Mặt trước

Mặt sau





TP.HCM Ngày 26 tháng 11 Năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT
Giám Đốc



Lê Văn Thống

Nhãn gói 5ml



TP.HCM Ngày 06 tháng 11 Năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT
Giám Đốc



Lê Văn Thống

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT

Giám Đốc 

Lê Văn Thống

Giám Đốc 

Lê Văn Thống



Hộp ALOGAS (65x130mm)

Thể tích 100ml

TP.HCM Ngày 26 tháng 11 Năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT

Giám Đốc



Lê Văn Thống



Hộp ALOGAS (65x130mm)

Thể tích 50ml

TP.HCM Ngày 26 tháng 11 Năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT

Giám Đốc



Le Văn Thống

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Dung dịch gội đầu

ALOGAS

(Ciclopirox 1%)

Khuyến cáo:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Để xa tầm tay trẻ em
- Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

1. Thành phần:

Mỗi 1 ml dung dịch gội đầu **ALOGAS** chứa:

Thành phần hoạt chất: Ciclopirox 10 mg

Thành phần tá dược: Natri lauryl ether sulfate (SLES), dinatri laureth succinate, tween 80, propylen glycol, acid citric, natri clorid, natri benzoate, cocamidoproyl betain, nước tinh khiết.

2. Dạng bào chế: Dung dịch gội đầu.

Mô tả: Dung dịch trong suốt, không màu, đồng nhất, hơi nhớt.

3. Chỉ định:

Điều trị viêm da tiết bã ở da đầu người lớn, giúp ngăn ngừa gàu và ngứa da đầu.

4. Liều dùng và cách dùng:

Làm ướt tóc và da đầu với nước sạch, sau đó lấy khoảng 5 ml dung dịch cho lên da đầu, có thể lấy lượng gấp đôi (10 ml) nếu tóc dài. Thoa đều, tạo bọt và giữ nguyên thuốc trên tóc và da đầu khoảng 3 phút, sau đó gội lại với nước để làm sạch tóc và da đầu.

Gội đầu với **ALOGAS** 2 lần/tuần trong khoảng 4 tuần. Nên gội cách 3 ngày 1 lần.

5. Chống chỉ định:

Người quá mẫn với ciclopirox hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Thuốc chỉ dùng ngoài da (gội đầu), không được nuốt.
- Tránh tiếp xúc với niêm mạc mắt, miệng, âm đạo. Nếu vô tình dính lên các niêm mạc này, nên rửa kỹ với nước sạch.
- Nếu có kích ứng hoặc quá mẫn khi dùng thuốc, cần ngưng thuốc và có biện pháp điều trị thích hợp.
- Phải dùng thuốc đủ thời gian khuyến cáo mặc dù triệu chứng có thuyên giảm sớm hơn.
- Nếu tình trạng bệnh không cải thiện sau 4 tuần điều trị, bệnh nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Không dùng quá liều được chỉ định.
- Chưa có thử nghiệm lâm sàng nào được thực hiện ở các đối tượng dưới 16 tuổi, do đó không khuyến cáo dùng thuốc này cho người dưới 16 tuổi.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai:

Dữ liệu trong các nghiên cứu độc tính trên sinh sản cho thấy ciclopirox không gây độc cho phôi hoặc gây quái thai trên động vật khi dùng đường uống và dùng ngoài da. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu nghiên cứu có kiểm soát ở phụ nữ có thai. Do đó, chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai khi lợi ích vượt trội so với nguy cơ.



Phụ nữ cho con bú:

Chưa biết ciclopirox có bài tiết qua sữa mẹ hay không. Ciclopirox ít được hấp thu toàn thân khi dùng ngoài da, do đó nếu có bài tiết vào sữa mẹ thì lượng thuốc có trong sữa mẹ sẽ không đáng kể và không gây ảnh hưởng đến trẻ bú mẹ.

ALOGAS có thể dùng cho phụ nữ cho con bú, nhưng cần thận trọng.

8. Ảnh hưởng của thuốc trên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Không có bằng chứng ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

9. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Tương tác của thuốc:

Chưa ghi nhận tương tác với các thuốc khác.

Tương kỵ của thuốc:

Chưa có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc.

Không nên dùng dung dịch dùng ngoài ALOGAS lẫn với các thuốc trị viêm da tiết bã ở da đầu khác.

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR):

Có thể xảy ra ngứa, rát hoặc đỏ da đầu.

Các tác dụng không mong muốn ghi nhận từ các thử nghiệm lâm sàng: nhịp nhanh thất, rối loạn da, tăng tiết bã nhờn.

Các tác dụng không mong muốn được báo cáo hậu mãi: đổi màu tóc, rụng tóc, kích ứng, phát ban.

Do các tác dụng không mong muốn này được ghi nhận từ các báo cáo tự nguyện nên không thể ước đoán tần suất xuất hiện cũng như mối quan hệ nhân quả với việc sử dụng thuốc.

11. Quá liều và cách xử trí:

Bôi tại chỗ: chưa có trường hợp dùng quá liều nào được báo cáo.

Nếu lỡ nuốt phải: xử trí bằng cách gây nôn hoặc rửa dạ dày và áp dụng các biện pháp hỗ trợ chung.

12. Quy cách đóng gói:

Hộp 1 chai 50 ml, kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 1 chai 100 ml, kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 10 gói 5 ml, kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 20 gói 5 ml, kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng và tiêu chuẩn chất lượng:

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.



14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký:

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM

300C Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Cơ sở đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT

Tầng 46, Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2025

Giám đốc



Lê Văn Thống

