



MẪU ĐĂNG KÝ VỊ THUỐC AM DEXCOTYL 500 mg




Handwritten signature.

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Văn Nền



500 mg

AM DEXCOTYL



AM DEXCOTYL
500 mg

THÀNH PHẦN:
Mephesisin 500 mg
Tá được vào đ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số 16 SX:
Ngày SX:
Hạn dùng:

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC

Số 843 quốc lộ 6 ở Phú Thọ, thành phố Bắc Sơn và thị trấn Việt Nam

Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN

SEK:

TIÊU CHUẨN: TCCS

AM DEXCOTYL



500 mg

Mephenesin 500 mg

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim



TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
LIÊN DOANH

DO NOT

2000

٢٠٠٠

7



ĐS. Nguyễn Văn Nền

AM DEXCOTYL
500 mg

COMPOSITION:
Mephenezin 500 mg
Excipients q.s. for one caplet

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE:
Please read the instruction.

STORAGE: In a cool, dry place. Protected from light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE.**

MEYER-BPC JOINT VENTURE COMPANY
843 National Road No. 60, Phu Tan ward, Ben Tre city, Ben Tre province, VN

6A23 National road No 80 Phyllis ward District city Bankers and more VMI

Rx
PRESCRIPTION DRUG

REG. NO. _____
SPECIFICATION- MANUFACTURER'S STANDARD

AM DEXCOTYL


500 mg

Mephenesin 500 mg

BOX OF 10 BLISTERS X 10 FILL M-COATED TABLETS



MẪU ĐĂNG KÝ NHÃN THUỐC AM DEXCOTYL 500 mg



TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Văn Nên

MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC AM DEXCOTYL 500 mg

R_x THUỐC BÁN THEO ĐƠN SĐK: TIÊU CHUẨN: TCCS AM DEXCOTYL 500 mg Mephenesin 500 mg HỘP 1 CHAI X 200 VIÊN NÉN BAO PHIM 	AM DEXCOTYL 500 mg THÀNH PHẦN: Mephenesin 500 mg Tá dược vừa đủ 1 viên. CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp. BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. ĐỂ XA TẤM TAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. Số lô SX: Ngày SX: Hạn dùng: CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC Số 6A3 quốc lộ 60 p. Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre-Việt Nam
--	--



TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Văn Nền

MẪU ĐĂNG KÝ
TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC AM DEXCOTYL 500 mg

R_x THUỐC BÁN THEO ĐƠN		Tiêu chuẩn: TCOS	
AM DEXCOTYL 500 mg			
THÀNH PHẦN:			
Mephenesin 500 mg			
Tá dược: Era pac, Era gel, Croscarmellose sodium, Polyvinyl pyrolidon, Aerosil, Magnesi stearat, HPMC 606, HPMC 615, PEG 6000, Talc, Titan dioxyd Sunset yellow lake, Ponceau, Brown vừa đủ 1 viên.			
DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén bao phim			
DƯỢC LỰC HỌC:			
Thuốc thư giãn cơ có tác động trung ương. Gây thư giãn cơ và trấn tĩnh nhẹ theo cơ chế phong bế thần kinh cơ có tác dụng toàn thân và cũng có tác dụng tại nơi thuốc tiếp xúc. Lợi ích của thuốc bị hạn chế do thời gian tác dụng ngắn.			
DƯỢC ĐỘNG HỌC:			
-Mephenesin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và phân bố ở hầu hết các mô trong cơ thể, đạt nồng độ cao trong máu chưa đến 1 giờ. -Mephenesin được chuyển hóa chủ yếu ở gan. -Mephenesin có nửa đời thải trừ khoảng 45 phút. -Mephenesin được bài tiết ra nước tiểu chủ yếu ở dạng đã chuyển hóa và một phần ở dạng thuốc chưa biến đổi			
CHỈ ĐỊNH:			
Điều trị hỗ trợ các cơ thắt cơ gây đau trong các bệnh lý thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.			
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:			
-Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. -Rối loạn chuyển hóa porphyrin.			
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:			
Người lớn: Mỗi lần uống 1 viên, ngày dùng 3 lần.			
THẬN TRỌNG:			
-Người có tiền sử dị ứng, hen phế quản, phản ứng dị ứng với thuốc, đặc biệt dị ứng với aspirin. -Người có bệnh ở đường hô hấp, yếu cơ, có tiền sử nghiện thuốc, suy chức năng gan thận. -Sử dụng đồng thời với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể làm các tác dụng không mong muốn có liên quan đến thuốc tăng thêm.			
TRƯỜNG HỢP PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:			
Không nên dùng Mephenesin cho phụ nữ trong thời gian mang thai hay nuôi con bú.			
TRƯỜNG HỢP LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:			
Do thuốc có thể gây buồn ngủ và làm giảm khả năng phối hợp các động tác, cho nên người bệnh sử dụng thuốc không được lái xe và điều khiển máy móc.			
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:			
-Thường gặp: Mệt mỏi, buồn ngủ, uể oải, khó thở, yếu cơ, mất điều hòa vận động. -Ít gặp: Đau khớp, buồn nôn, tiêu chảy, táo bón, nổi mẩn. Một vài trường hợp đặc biệt bị mất cảm giác ngon miệng, nôn mửa, ảo giác, kích động và có thể có sốc phản vệ. -Hiếm gặp: Phản ứng dị ứng; sốc phản vệ rất hạn hữu xảy ra; ngù gà, phát ban.			
Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc			
TƯƠNG TÁC THUỐC:			
Không dùng đồng thời mephenesin với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương vì có thể làm tăng tác dụng ngoại ý của thuốc.			
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:			
-Triệu chứng: Giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rối loạn thị giác, mất phối hợp động tác, ảo giác, liệt hô hấp và hôn mê. Gây co giật ở trẻ em và có thể gây xúc động mạnh và lú lẫn ở người già. -Điều trị: Điều trị triệu chứng và chuyển ngay đến bệnh viện.			
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.			
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.			
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 200 viên nén bao phim.			
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.			
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ.			
NEU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC.			

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Văn Nền



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng