https://trungtamthuoc.com/

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU HỘP 3 VỈ X 10 VIÊN NANG MỀM ANT TAKINA 80



Ngày 21 tháng 08 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thái Nhã Ngôn

https://trungtamthuoc.com/

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU HỘP 6 VỈ X 10 VIÊN NANG MỀM
ANT TAKINA 80



Ngày 19 tháng 08 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC


Thái Nhã Ngôn

https://trungtamthuoc.com/

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU HỘP 10 VỈ X 10 VIÊN NANG MỀM
ANT TAKINA 80



Ngày 17 tháng 12 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thái Nhã Ngôn

https://trungtamthuoc.com/

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU VỈ X 10 VIÊN NANG MỀM
ANT TAKINA 80



Ngày 15 tháng 08 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thái Nhã Ngôn

https://trungtamthuoc.com/

ANT TAKINA 80

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ

NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

1. Thành phần công thức thuốc:

Thành phần dược chất: Cao khô Bạch quả *(Extractum Ginkgo bilobae siccum)* 80 mg

Thành phần tá dược: Soybean oil, geloil sc, butylated hydroxyl toluene, sorbitol 70% liquid, gelatin (bloom 210), glycerin, vanilin, methy paraben, propyl paraben, titanium dioxid, blue brilliant, candurin silver sheen, yellow tartrazin.

2. Dạng bào chế: Viên nang mềm

Mô tả: Viên nang mềm hình oval 7,5, màu xanh lá.

3. Chỉ định:

Suy giảm trí nhớ, thiểu năng tuần hoàn não, mạch vành, hội chứng tiền đình. Suy tuần hoàn não với các biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng, ù tai.

Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, nhũn não, di chứng não.

Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

4. Cách dùng, liều dùng:

Cách dùng: Dùng đường uống. Uống trong bữa ăn

Liều dùng: Người lớn: Uống mỗi lần 1 viên, 1-2 lần/ngày.

5. Chống chỉ định:

Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai.

Người đang chảy máu.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Thận trọng với người có rối loạn chảy máu, đang xuất huyết.

Không ăn măng, rau muống, không uống nước đá, tắm nước lạnh khi dùng thuốc.

Yellow tartrazin: Có thể gây phản ứng dị ứng.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú: Không sử dụng vì chưa xác định được tính an toàn.

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Thuốc thường không gây ảnh hưởng.

9. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Tương tác: Chưa có báo cáo

Tương kỵ của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

https://trungtamthuoc.com/

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Nhẹ và hiếm gặp thường do dùng thuốc lâu ngày: rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, có thể kéo dài thời gian chảy máu.

11. Quá liều và cách xử trí:

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều.

Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

12. Quy cách đóng gói:

Hộp 03 vỉ (Al-PVC) x 10 viên nang mềm kèm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Hộp 06 vỉ (Al-PVC) x 10 viên nang mềm kèm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Hộp 10 vỉ (Al-PVC) x 10 viên nang mềm kèm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

Điều kiện bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ – CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICHPHARM

Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 19 tháng 08 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0301427564 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ Q.BÌNH TÂN-T.P HỒ CHÍ MINH

THÁI NHÃ NGÔN