https://trungtamthuoc.com/

ANTRIMIN

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nén **ANTRIMIN** có chứa:

Thành phần hoạt chất:

Diosmin .....300 mg

***Thành phần tá dược*:** Cellulose vi tinh thể, hypromellose, pregelatinized starch, natri starch glycolat, magnesi stearat, talc.

DẠNG BÀO CHẾ

Viên nén hình oval, màu vàng nâu, hai mặt khum trơn.

CHỈ ĐỊNH

- Cải thiện triệu chứng liên quan đến suy tĩnh mạch - bạch huyết (như nặng chân, đau, bứt rứt khi nằm lâu).
- Điều trị bổ trợ các rối loạn chức năng của mao mạch nhỏ, dễ vỡ.
- Điều trị các triệu chứng của cơn trĩ cấp.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG

Liều dùng

Suy tĩnh mạch - bạch huyết, mao mạch dễ vỡ: liều trung bình là 2 viên mỗi ngày (1 viên vào buổi trưa và 1 viên vào buổi tối).

Cơn trĩ cấp: 4 đến 6 viên mỗi ngày.

Cách dùng

Dùng đường uống, uống vào thời gian bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân quá mẫn với hoạt chất hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Cơn trĩ cấp

Việc dùng thuốc này để điều trị triệu chứng đợt trĩ cấp không cản trở việc điều trị tại chỗ vùng hậu môn.

Nên điều trị theo từng đợt ngắn. Nếu các triệu chứng không thuyên giảm nhanh, cần tiến hành khám hậu môn trực tràng và đánh giá lại việc điều trị.

https://trungtamthuoc.com/

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Các thí nghiệm trên động vật không cho thấy bất kỳ tác dụng gây quái thai nào. Hơn nữa, ở người, cho đến nay chưa có tác dụng có hại nào được báo cáo.

Phụ nữ cho con bú

Do thiếu dữ liệu về sự bài tiết của thuốc qua sữa, không nên cho con bú trong thời gian điều trị.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Dữ liệu có sẵn cho đến nay không cho thấy sự tồn tại của các tương tác có ý nghĩa lâm sàng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Một vài trường hợp rối loạn tiêu hóa nhẹ (1%) đã được mô tả, nhưng không cần phải ngừng điều trị.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Không có trường hợp quá liều nào được báo cáo, tuy nhiên, quá liều có thể dẫn đến các tác dụng phụ trầm trọng hơn.

DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược lý: Thuốc bảo vệ tĩnh mạch và mao mạch.

Mã ATC: C05CA03

Cơ chế tác dụng

Diosmin thuộc nhóm thuốc venotropic: bảo vệ tĩnh mạch và trợ tĩnh mạch (venotonic), nghĩa là nó làm tăng sức cản của mạch, giảm tính thấm và gây co mạch.

Diosmin thu được bằng cách tổng hợp, diosmin là đề tài của nhiều nghiên cứu dược lý và được xác nhận rằng diosmin làm tăng trương lực thành của tĩnh mạch, do đó cải thiện huyết động tĩnh mạch, điều chỉnh rối loạn tính thấm mao mạch và tăng cường sức đề kháng của mao mạch.

Ở người, các thử nghiệm lâm sàng đã xác nhận đặc tính chống phù nề của diosmin và tác dụng bổ trợ của nó đối với tĩnh mạch và mao mạch.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Diosmin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa. Nồng độ tối đa trong máu và trong các cơ quan khác nhau của chuột cống (gan, thận, mạch máu) đạt được sau 01 đến 02 giờ. Sự thải trừ diễn ra với lượng bằng nhau qua nước tiểu và phân trong vòng 24 giờ sau khi uống. Thuốc được thải trừ chủ yếu qua phân trong 24 giờ tiếp theo. Diosmin và các chất chuyển hóa của nó trải qua chu kỳ gan ruột, góp phần làm chậm quá trình hấp thu ở cấp độ mô. Thật vậy, nồng độ không đáng kể trong thành mạch máu tĩnh mạch tồn tại trong 48 giờ sau khi uống diosmin.

https://trungtamthuoc.com/

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 3 vỉ hoặc 5 vỉ hoặc 6 vỉ hoặc 10 vỉ × 10 viên kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 2 vỉ hoặc 3 vỉ hoặc 5 vỉ × 15 viên kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn cơ sở.

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH.

Địa chỉ: Lô CN4-6.2 KCN Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3559 6583

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N:0101362831-C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH ★ H.THẠCH THẤT - T.P HÀ NỘI

ĐÀO ĐÌNH BẢNG

https://trungtamthuoc.com/

VỈ NHÔM ANTRIMIN



S.Đ.N.H 0101362831-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH
THẠCH THẤT - T.P HÀ NỘI

In 1 màu

Số lô, hạn dùng được dập nổi bằng nhiệt của máy ép vỉ trên màng nhôm. (Mặt trước của vỉ thuốc)

https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/

