

NHÃN THUỐC



ARICA

ACNE BC

ARICA

ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%

TRỊ MỤN TRỨNG CÁ

Nhóm thuốc kháng khuẩn trị mụn

Gel bôi ngoài da

1 tuýp 30g

THÀNH PHẦN:
Mỗi g gel có chứa:
Benzoyl peroxid 5%
Clindamycin 1%
Tá được vừa đủ 1 g

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

Sản xuất bởi:
Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

ARICA

ACNE BC

ARICA

ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%

TRỊ MỤN TRỨNG CÁ

Nhóm thuốc kháng khuẩn trị mụn

Gel bôi ngoài da

1 tuýp 30g

BẢO QUẢN: Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp 30g

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS

SDK: _____
Số lô SX: _____
NSX: _____
HD: _____

Mã vạch (nếu có)

Mã vạch (nếu có)



ARICA

ACNE BC

ARICA

ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%

TRỊ MỤN TRỨNG CÁ

Nhóm thuốc kháng khuẩn trị mụn

Gel bôi ngoài da

1 tuýp 30g

Chanh

ARICA

ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%

♦ **THÀNH PHẦN:**
Benzoyl Peroxid 5%
Clindamycin 1%
Tá được vừa đủ 1g

♦ **DẠNG BẢO CHẾ:**
Gel bôi ngoài da

♦ **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

Rửa sạch nhẹ nhàng, làm khô hoàn toàn vùng da cần điều trị. Bôi một lớp gel mỏng và đều lên vùng da cần điều trị. Nên làm sạch tay sau khi bôi thuốc

♦ **BẢO QUẢN:**
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm nhiệt độ dưới 30 C

♦ **CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

♦ **TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:**
TCCS

♦ **QUY CÁCH:**
Tuýp 30 g

♦ **NHÀ SẢN XUẤT:**

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

LSX: _____ HD: _____



ARICA
ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%



TRỊ MỤN TRỨNG CÁ
Nhóm thuốc kháng khuẩn trị mụn

Gel bôi ngoài da
1 tuýp 5 g

THÀNH PHẦN:
Mỗi g gel có chứa:
Benzoyl peroxid 5%
Clindamycin 1%
Tá được vừa đủ 1g

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để xa tầm tay trẻ em

Sản xuất bởi:
Công ty cổ phần Dược phẩm CPCI Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội



ARICA
ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%



TRỊ MỤN TRỨNG CÁ
Nhóm thuốc kháng khuẩn trị mụn

Gel bôi ngoài da
1 tuýp 5 g

BẢO QUẢN: Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp 5g

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS

SDK: _____
Số lô SX: _____
NSX: _____
HD: _____

Mã vạch (nếu có)





ARICA
ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%



TRỊ MỤN TRỨNG CÁ
Nhóm thuốc kháng khuẩn trị mụn

Gel bôi ngoài da
1 tuýp 5 g

Chanh



ARICA
ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%



TRỊ MỤN TRỨNG CÁ
Nhóm thuốc kháng khuẩn trị mụn

Gel bôi ngoài da
1 tuýp 5 g

♦ THÀNH PHẦN:
Benzoyl Peroxid.....5%
Clindamycin.....1%
Tá được vừa đủ1g

♦ DẠNG BẢO CHẾ:
Gel bôi ngoài da

♦ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Rửa sạch nhẹ nhàng, làm khô hoàn toàn vùng da cần điều trị. Bôi một lớp gel mỏng và đều lên vùng da cần điều trị. Nên làm sạch tay sau khi bôi thuốc

♦ BẢO QUẢN:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm nhiệt độ dưới 30 C

♦ CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

♦ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:
TCCS

♦ QUY CÁCH:
Tuýp 5 g

♦ NHÀ SẢN XUẤT:


CPCI

Công ty cổ phần Dược phẩm CPCI Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

LSX: _____ HD: _____

ARICA

ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%

TRỊ MỤN TRỨNG CÁ
Nhóm thuốc kháng khuẩn trị mụn

Gel bôi ngoài da
1 tuýp 10 g

THÀNH PHẦN:
Mỗi g gel có chứa:
Benzoyl peroxid 5%
Clindamycin 1%
Tá được vừa đủ 1g

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Sản xuất bởi:
Công ty cổ phần Dược phẩm CPCI Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để xa tầm tay trẻ em

ARICA

ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%

TRỊ MỤN TRỨNG CÁ
Nhóm thuốc kháng khuẩn trị mụn

Gel bôi ngoài da
1 tuýp 10 g

Mã vạch (nếu có)

SBK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

BẢO QUẢN: Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp 10 g
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS



ARICA

ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%

TRỊ MỤN TRỨNG CÁ
Nhóm thuốc kháng khuẩn trị mụn

Gel bôi ngoài da
1 tuýp 10 g

ARICA

ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%

TRỊ MỤN TRỨNG CÁ
Nhóm thuốc kháng khuẩn trị mụn

Gel bôi ngoài da
1 tuýp 10 g

◆ THÀNH PHẦN:
Benzoyl Peroxid 5%
Clindamycin 1%
Tá được vừa đủ 1g

◆ ĐANG BẢO CHẾ:
Gel bôi ngoài da

◆ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Rửa sạch nhẹ nhàng, làm khô hoàn toàn vùng da cần điều trị. Bôi một lớp gel mỏng và đều lên vùng da cần điều trị. Nên làm sạch tay sau khi bôi thuốc

◆ BẢO QUẢN:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm nhiệt độ dưới 30 C

◆ CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

◆ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:
TCCS

◆ QUY CÁCH:
Tuýp 10 g

◆ NHÀ SẢN XUẤT:

Công ty cổ phần Dược phẩm CPCI Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

LSX: HD:

Handwritten signature

ARICA

ACNE BC

ARICA

ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%

TRỊ MỤN TRỨNG CÁ

Nhóm thuốc kháng khuẩn trị mụn

Gel bôi ngoài da

1 tuýp 15 g

THÀNH PHẦN:
Mỗi g gel có chứa:
Benzoyl peroxid 5 %
Clindamycin 1 %
Tá dược vừa đủ 1 g

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Đặc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:
Đeo xa tầm tay trẻ em

Sản xuất bởi:
Công ty cổ phần Dược phẩm CPCI Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

ARICA

ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%

TRỊ MỤN TRỨNG CÁ

Nhóm thuốc kháng khuẩn trị mụn

Gel bôi ngoài da

1 tuýp 15 g

BẢO QUẢN: Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp 15 g

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS

SDK: Số lô SX: NSX: HD:

Mã vạch (nếu có)



ARICA

ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%

TRỊ MỤN TRỨNG CÁ

Nhóm thuốc kháng khuẩn trị mụn

Gel bôi ngoài da

1 tuýp 15 g

ARICA

ACNE BC

BENZOYL PEROXID 5%
+ CLINDAMYCIN 1%

♦ **THÀNH PHẦN:**
Benzoyl Peroxid 5%
Clindamycin 1%
Tá dược vừa đủ 1g

♦ **ĐANG BẢO CHẾ:**
Gel bôi ngoài da

♦ **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

Rửa sạch nhẹ nhàng, làm khô hoàn toàn vùng da cần điều trị. Bôi một lớp gel mỏng và đều lên vùng da cần điều trị. Nên làm sạch tay sau khi bôi thuốc

♦ **BẢO QUẢN:**
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm nhiệt độ dưới 30 C

♦ **CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

♦ **TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:**
TCCS

♦ **QUY CÁCH:**
Tuýp 15 g

♦ **NHÀ SẢN XUẤT:**

Công ty cổ phần Dược phẩm CPCI Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

LSX: HD:

Thanh

Rx: Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

ARICA ACNE BO

Clindamycin 1% kl/kl (dưới dạng Clindamycin phosphat);
Benzoyl peroxid 5% kl/kl (dưới dạng hydrous Benzoyl peroxid)

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần

Mỗi g gel có chứa:

Thành phần hoạt chất:

Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 1% kl/kl

Benzoyl peroxid khan (dưới dạng benzoyl peroxid ngậm nước) 5% kl/kl

Thành phần tá dược: HPMC K4M, natri lauryl sulfat, dinatri edetat, glycerin, poloxamer 407, nước tinh khiết vừa đủ 1 g

Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da.

Mô tả: Gel có thể chất mềm, trong suốt có thể dàn mỏng trên da

Chỉ định

Chỉ định để điều trị tại chỗ mụn trứng cá từ nhẹ đến trung bình, đặc biệt là các tổn thương viêm do mụn trứng cá gây nên.

Liều dùng và cách dùng

Liều dùng

Người trưởng thành và thanh thiếu niên (từ 12 tuổi trở lên)

Bôi lên vùng da bị mụn hoặc bị tổn thương viêm do mụn một lớp gel mỏng, 1 lần/ngày vào mỗi buổi tối. Hiệu quả điều trị có thể thấy ngay sau khi dùng thuốc khoảng 2-5 tuần. Không nên dùng thuốc quá 12 tuần vì hiệu quả điều trị và sự an toàn của thuốc khi dùng trên 12 tuần chưa được xác nhận

Trẻ em

Hiệu quả điều trị của thuốc chưa được xác định ở trẻ em dưới 12 tuổi, do đó không nên dùng thuốc cho đối tượng này.

Bệnh nhân cao tuổi

Không có hướng dẫn cụ thể.

Cách dùng

Rửa sạch nhẹ nhàng, làm khô hoàn toàn vùng da cần điều trị

Bôi một lớp gel mỏng và đều lên vùng da cần điều trị



Uanh



				nhạy cảm và quá mẫn
Hệ thần kinh*			Dị cảm	
Tiêu hóa				Viêm đại tràng (bao gồm viêm đại tràng giả mạc), tiêu chảy, đau bụng, xuất huyết tiêu hóa
Da và mô dưới da*	Mẩn đỏ, bong tróc, khô da	Cảm giác bỏng rát	Viêm da, ngứa, ban đỏ, làm trầm trọng thêm tình trạng mụn trứng cá	Mày đay
Toàn thân và tại chỗ				Thay đổi màu da tại chỗ bôi

Chú ý: (*): Tại vị trí bôi thuốc

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp phải các tác dụng phụ của thuốc.

Quá liều và cách xử trí

Sử dụng quá mức **ARICA ACNE BC** có thể gây kích ứng nghiêm trọng. Trong trường hợp này, ngưng sử dụng thuốc và chờ cho đến khi da đã hồi phục.

Benzoyl peroxid được bôi trên cơ thể thường không hấp thụ đủ lượng để tạo ra các phản ứng toàn thân.

Clindamycin dùng tại chỗ có thể được hấp thu với lượng đủ để gây ra tác dụng toàn thân. Trong trường hợp quá liều các biện pháp điều trị triệu chứng và hỗ trợ cần được chỉ định khi cần thiết. Trong trường hợp ngẫu nhiên nuốt phải gel **ARICA ACNE BC** có thể thấy các tác dụng không mong muốn trên dạ dày-ruột tương tự như những trường hợp dùng clindamycin đường toàn thân. Do đó, cần áp dụng các biện pháp điều trị triệu chứng phù hợp để giảm tác dụng không mong muốn

Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý: Nhóm thuốc kháng khuẩn điều trị mụn


Mã ATC: D10AF51

Clindamycin: Clindamycin phosphat khi bôi trên da được thủy phân thành clindamycin.

Clindamycin là một kháng sinh họ lincosamid có tác động chủ yếu lên vi khuẩn gram dương hiếu khí và nhiều chủng vi khuẩn kỵ khí.

Khi bôi trên da, nồng độ clindamycin trong các mẫu bệnh phẩm lấy từ mụn đủ để kháng lại hầu hết các chủng vi khuẩn *Propionibacterium* (*P. acnes*). Từ đó làm giảm số lượng trên bề mặt và các nang *P. acnes*, một trong những tác nhân gây nên mụn.

Cũng như các kháng sinh khác, việc sử dụng clindamycin đường ngoài da có thể dẫn tới tình



trạng đề kháng.

Benzoyl peroxid: Benzoyl peroxid có tác dụng kháng khuẩn. Tác dụng kháng khuẩn của benzoyl peroxid có thể do hoạt tính oxi hóa, có tác dụng trên vi khuẩn *Staphylococcus epidermidis* và *Propionibacterium acnes*. Tác dụng này có hiệu quả trong điều trị mụn trứng cá. Phối hợp clindamycin và benzoyl peroxid làm tăng hiệu quả điều trị các tổn thương viêm do mụn trứng cá từ nhẹ đến trung bình và làm giảm khả năng xuất hiện các vi khuẩn kháng clindamycin.

Đặc tính dược động học

Clindamycin: Sau khi bôi tại chỗ nhiều lần clindamycin phosphat với nồng độ tương đương 10 mg/ml clindamycin, nồng độ clindamycin tìm thấy trong huyết thanh rất thấp (0-3 ng/ml) và dưới 0,2% liều dùng xuất hiện trong nước tiểu dưới dạng clindamycin.

Hoạt tính của clindamycin được chứng minh trên những bệnh nhân có mụn trứng cá. Nồng độ kháng sinh có hoạt tính trung bình lấy từ mụn trứng cá sau khi sử dụng clindamycin bôi tại chỗ trong 4 tuần là 597 mcg/g (thay đổi từ 0-1490). Trên *invitro*, clindamycin ức chế tất cả mụn trứng cá do *propionibacterium* trong lô vi khuẩn thử nghiệm (MIC 0,4 mcg/ml). Lượng acid béo tự do trên bề mặt giảm từ 14% xuống 2% sau khi bôi clindamycin.

Sử dụng ở bệnh nhân cao tuổi: Không có đủ số lượng bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên trong các nghiên cứu lâm sàng về clindamycin bôi tại chỗ để kết luận liệu đáp ứng ở nhóm đối tượng này có khác với các nhóm đối tượng trẻ hơn hay không.

Benzoyl peroxid: Thuốc được hấp thu qua da khoảng 1,8 microgam/cm². Lượng benzoyl peroxid được hấp thu sẽ chuyển hoàn toàn thành acid benzoic ở da và được thải trừ nhanh chóng vào nước tiểu.

Quy cách đóng gói

Hộp 1 tuýp 5 g, 10 g, 15 g, 30 g

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Nhà sản xuất



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

