

Attadia

Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam

Hộp 20 gói x 3,205 gam bột pha hỗn dịch uống

Hộp 20 gói

Attadia

Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam

Hộp 20 gói

Bột pha hỗn dịch uống

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói 3,205 gam chứa

Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam

Tá dược vừa đủ 1 gói

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị triệu chứng do rối loạn chức năng đường ruột ở người lớn, đặc biệt là tiêu chảy và chướng bụng.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

Liều dùng: Người lớn 2 - 3 gói/ ngày, nên uống trước bữa ăn 30 phút.

Cách dùng: Pha thuốc với nước, có thể thêm đường cho dễ uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

SĐK/Reg.No:

ĐỂ XA TẤM TAY CỦA TRẺ EM

Attadia

Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam

Hộp 20 gói

Bột pha hỗn dịch uống

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



Nhà phân phối:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT HÙNG
Tầng 2, tòa nhà CT3, khu đô thị Dream Town, P. Tây Mỗ,
Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
Số 358 Đường Giải Phóng, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
SX tại: Nhà máy dược phẩm số 2, Trung Hậu, Tiền Phong,
Mê Linh, Hà Nội



THIS BOX IS SUITABLE FOR RECYCLING

LOT	Số lô SX/ Lot.No :
Ngày SX/ Mfd :	
Hạn dùng/ Exp:	

Hà nội, ngày 12 tháng 9 năm 2021



HỒ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Phong

Attadia

Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam

Hộp 30 gói x 3,205 gam bột pha hỗn dịch uống

Attadia

Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam

Hộp 30 gói

Bột pha hỗn dịch uống

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói 3,205 gam chứa
Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam
Tá dược vừa đủ 1 gói

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị triệu chứng do rối loạn chức năng đường ruột ở người lớn, đặc biệt là tiêu chảy và chướng bụng.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

Liều dùng: Người lớn 2 - 3 gói/ ngày, nên uống trước bữa ăn 30 phút.

Cách dùng: Pha thuốc với nước, có thể thêm đường cho dễ uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

SĐK/Reg.No:

ĐỂ XA TẤM TAY CỦA TRẺ EM

Attadia

Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam

Hộp 30 gói

Bột pha hỗn dịch uống

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



Nhà phân phối:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT HÙNG
Tầng 2, tòa nhà CT3, Khu đô thị Dream Town, P. Tây Mỗ,
Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEK
Số 358 Đường Giải Phóng, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Số fax: Nhà máy dược phẩm số 2, Trung Hòa, Tân Phong,
Mê Linh, Hà Nội



THE BOX IS SUITABLE FOR RECYCLING

LOT Số lô SX/ Lot.No :

Ngày SX/ Mfg :

Hạn dùng/ Exp:

Attadia

Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam

Gói 3,205 gam
Bột pha hỗn dịch uống

Thành phần: Mỗi gói 3,205 gam chứa
Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam
Tá dược vừa đủ 1 gói

Chỉ định:

Điều trị triệu chứng do rối loạn chức năng đường ruột ở người lớn, đặc biệt là tiêu chảy và chướng bụng.

Cách dùng và liều dùng:

Liều dùng: Người lớn 2 - 3 gói/ ngày, nên uống trước bữa ăn 30 phút.

Cách dùng: Pha thuốc với nước, có thể thêm đường cho dễ uống.

Chống chỉ định, cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc, tác dụng không mong muốn và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK/Reg.No:

ĐỂ XA TẤM TAY CỦA TRẺ EM

Nhà phân phối: **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT HÙNG**
Tầng 2, tòa nhà CT3, Khu đô thị Dream Town, P. Tây Mỗ,
Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEK**
Số 358 Đường Giải Phóng, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Số fax: Nhà máy dược phẩm số 2, Trung Hòa, Tân Phong,
Mê Linh, Hà Nội

Số lô SX/ Lot.No :
Hạn dùng/ Exp:

Hà nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Phong

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Attadia

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần công thức thuốc cho 1 gói

Thành phần được chất: Attapulgit hoạt hóa : 3,0 gam

Thành phần tá dược: Natri saccharin, glucose, ethyl vanilin vừa đủ 01 gói.

Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống

Mô tả dạng bào chế: Bột mịn, màu kem hoặc màu nâu vàng, vị ngọt, mùi thơm.

Chỉ định

Điều trị triệu chứng do rối loạn chức năng đường ruột ở người lớn, đặc biệt là tiêu chảy và chướng bụng.

Cách dùng và liều dùng

Liều dùng

- Người lớn: 2 - 3 gói/ngày, nên uống trước bữa ăn 30 phút

Cách dùng: Pha thuốc với nước, có thể thêm đường cho dễ uống.

Chống chỉ định.

- Quá mẫn với hoạt chất hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Hẹp đường tiêu hóa.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

- Nên thận trọng khi dùng cho người bị bệnh phình đại tràng vô hạch bẩm sinh hoặc giảm nhu động đại tràng (do có nguy cơ gây u phân).

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ có thai

- Dữ liệu về việc sử dụng attapulgit 3 g ở phụ nữ có thai còn hạn chế (dưới 300 trường hợp mang thai).
- Các nghiên cứu trên động vật không đủ để kết luận về độc tính sinh sản.
- Chỉ sử dụng attapulgit 3 g trong thai kỳ nếu cần thiết.

Phụ nữ cho con bú

- Dữ liệu về việc sử dụng attapulgit 3 g ở phụ nữ cho con bú còn hạn chế.



- Chỉ sử dụng attapulgit 3 g ở phụ nữ cho con bú nếu cần thiết.

Khả năng sinh sản

Ảnh hưởng của thuốc nên khả năng sinh sản của người chưa được nghiên cứu

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

- Ảnh hưởng của attapulgit lên khả năng lái xe và sử dụng máy móc chưa được nghiên cứu. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về attapulgit ảnh hưởng lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc

Thuốc có thể làm giảm hấp thu qua đường tiêu hóa của các thuốc khác khi dùng đồng thời bằng đường uống. Nếu có thể, nên uống thuốc cách ít nhất 2 giờ với các thuốc sau:

- Thuốc kháng sinh kháng lao (ethambutol, isoniazid) (đường uống)
- Kháng sinh – nhóm cyclin (đường uống)
- Kháng sinh – nhóm fluoroquinolon (đường uống)
- Kháng sinh – nhóm lincosamid (đường uống)
- Thuốc kháng histamin H₂ (đường uống)
- Atenolol, metoprolol, propranolol (đường uống)
- Chloroquin (đường uống)
- Diflunisal (đường uống)
- Digoxin (đường uống)
- Diphosphonat (đường uống)
- Natri florua
- Các glucocorticoid (prednisolon, dexamethason) (đường uống)
- Indomethacin (đường uống)
- Kayexalat (đường uống)
- Ketoconazol (đường uống)
- Lansoprazol
- Thuốc an thần kinh phenothiazin (đường uống)
- Penicillamin (đường uống)
- Muối sắt (đường uống)



Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR)

- Bảng tóm tắt các phản ứng có hại: được phân nhóm theo tần suất: rất thường gặp ($ADR \geq 1/10$), thường gặp ($1/100 \leq ADR < 1/10$), ít gặp ($1/1000 \leq ADR < 1/100$), hiếm gặp ($1/10000 \leq ADR < 1/1000$) và rất hiếm gặp ($ADR < 1/10000$); Không biết (không thể ước tính tần suất từ dữ liệu có sẵn).
- Có khả năng bị táo bón trong trường hợp sử dụng kéo dài hoặc với liều lượng cao.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều và cách xử trí:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. **Nếu sử dụng quá liều**, tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Đặc tính dược lực học

- Nhóm dược lý: Chất hấp phụ đường ruột.
- Mã ATC: A07BC04.
- Attapulgit bao phủ dạ dày ruột, thuốc không làm thay đổi màu sắc phân.
- Attapulgit là chất thấm xạ (cho tia phóng xạ truyền qua); nên có thể thăm khám hoặc điều trị bằng tia X mà không cần ngừng dùng thuốc.

Đặc tính dược động học

- Không hấp thu và được đào thải theo phân.

Quy cách: Hộp 20 gói, 30 gói, gói giấy/nhôm/PE.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C .

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: Tiêu chuẩn cơ sở

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

Địa chỉ: Số 358 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội

Sản xuất tại: Nhà máy dược phẩm số 2, Trung Hậu - Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội

ĐT: 0243 668 611 Fax: 0243 864 1584

Hà Nội, Ngày 23 tháng 9 năm 2021 25



HỌ TÊN TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Phong