

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
La Khê - Văn Khê - TP. Hà Đông

HATAPHAR

L-CYSTINE 500mg

HỘP 12 VỈ X 5 VIÊN NANG MỀM



THÀNH PHẦN/COMPOSITION:

Mỗi viên nang mềm chứa/Each softgel contain:
L - Cystine 500mg
Tá dược vd/ Excipients

CHỈ ĐỊNH/INDICATIONS:

Hỗ trợ điều trị các trường hợp: sạm da, chàm, nổi mề dáy; Viêm nhiễm mụn nhọt, từng cà trên da; Ngứa và các bệnh lý biểu bì trên da, tóc, móng; Ngứa ngứa rụng tóc, phòng ngừa các bệnh lý biểu bì làm gãy móng tay, móng chân, rụng tóc; Phục hồi các tổn thương giác mạc.

Treatment incase: tanning, delayed skin, urticaria, Dermatitis, ance. Allergic and diseases of the skin, hair, nail. Prevention hairloss, pathological epidermal such as: broken fingernail, toenail, hairloss. Recovery damages corneal.

Số lô SX (Lot.No) :

Ngày SX (Mfg. Date):

HD (Exp. Date) :



BOX OF 12 BLISTERS X 5 SOFTGELS

AUSLIS
L-CYSTINE 500mg



BOX OF 12 BLISTERS X 5 SOFTGELS
AUSLIS
L-CYSTINE 500mg

AUSLIS
L - CYSTINE500mg
SDK:
HATAPHAR GMP - WHO

AUSLIS
L - CYSTINE500mg
SDK:
C.T.C.P.D.P HÀ TÂY

AUSLIS
L - CYSTINE500mg
SDK:
HATAPHAR GMP - WHO

AUSLIS
L - CYSTINE500mg
SDK:
C.T.C.P.D.P HÀ TÂY

Số lô SX:

HD:

AUSLIS
L-CYSTINE 500mg

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG/DOSEAGE -

ADMINISTRATION: Uống mỗi lần 1 viên x 2 - 3 lần/ngày.

The usual dose in adults is generally 1 capsule x 2 - 3 times per day.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH/CONTRAINDICATIONS:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp/See the package insert inside.

BẢO QUẢN/STORAGE: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/

Store in a dry place. Below 30°C.

TÌU CHUẨNÁP DỤNG/SPECIFICATIONS:

TCCS/Manufacturers:

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING

INSTRUCTIONS BEFORE USE

SDK (Reg.No):

Sản xuất bởi/Manufactured by:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C
La Khê - Hà Đông - TP Hà Nội/La Khê - Hà Đông - Hà Noi City

Đơn hướng dẫn sử dụng thuốc

Viên nang mềm

AUSLIS (L-Cystin 500mg)

- **Dạng thuốc:** Viên nang mềm. .

- **Qui cách đóng gói:** Hộp 12 vỉ x 5 viên

- **Thành phần**

L-cystine 500mg

Tá dược vđ 1 viên

(Tá dược gồm: Dầu đậu nành, gelatin, glycerin, nước, dầu cọ, sáp ong trắng, nipagin, nipasol, sorbitol, ethyl vanilin, Phẩm màu Chocolate)

- **Chỉ định:** Hỗ trợ điều trị các trường hợp: Sạm da, chàm, nổi mề đay; Viêm nhiễm mụn nhọt, trứng cá trên da; Ngứa và các bệnh lý biểu bì trên da tóc, móng; Ngăn ngừa rụng tóc, phòng ngừa các bệnh lý biểu bì làm gãy móng tay, móng chân, rụng tóc; Phục hồi các tổn thương giác mạc.

- **Cách dùng- Liều dùng:** Uống thuốc trong bữa ăn.

Trung bình người lớn: Uống mỗi lần 1 viên x 2 - 3 lần/ngày.

- **Chống chỉ định:** Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Suy thận nặng, hôn mê gan.

- **Thận trọng:** Cần thận trọng khi dùng cho những bệnh nhân Cystine niệu hoặc phối hợp với L-dopa.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Rất hiếm xảy ra như buồn nôn, nôn và tiêu chảy, khát nước, đau bụng nhẹ.

* **Ghi chú:** Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

- **Tương tác thuốc:** Chưa có tài liệu báo cáo

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**

Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, loang màu, dính vỏ nang, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới trả lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Quy cách đóng gói:** Hộp 12 vỉ x 5 viên.

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ



Thuốc sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

La Khê- Hà Đông- TP Hà Nội

ĐT: 0433. 522203- 33516101 FAX: 0433522203

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



PHÓ GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Bá Lai