

MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

1 - MẪU ỐNG BEVITIN (20 viên bao đường)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 10 / 12 / 2012

BEVITIN 20 VIÊN BAO ĐƯỜNG
CÔNG THỨC: Vitamin B1 250 mg Tá dược vđ 1 viên bao đường
CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG -CÁCH DÙNG, THẬN TRỌNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
SẢN XUẤT THEO TCCS SDK:
GMP-WHO
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM BẢO QUẢN NHIỆT ĐỘ (NHỆT ĐỘ ≤ 30°C) TRÁNH ẨM SÁNG.
CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM N.I.C Lô 110, Đường C, KCN Tân Tân, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Mã Vạch Số ít 10: Ngày 01: Tháng 01:

Tp.HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2011
KT.Tổng Giám Đốc



DS. NGUYỄN TRUNG KIÊN

MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

4 - MẪU HỘP BEVITIN (hộp 10 vỉ x 10 viên bao đường)




Tp.HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2011
KT. Tổng Giám Đốc



NGUYỄN TRUNG KIÊN

MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

2 - MẪU HỘP BEVITIN (hộp 1 ống x 20 viên bao đường)



Tp.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2011
KT. Tổng Giám Đốc



DS. NGUYỄN TRUNG KIẾN

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Viên bao đường BEVITIN

BEVITIN Viên bao đường:

♦ Công thức (cho một viên):

- Vitamin B₁ (Thiamin HCl)250 mg
- Tá dượcvừa đủ..... 1 viên bao đường
(Magnesi stearat, Bột talc, Tinh bột sắn, Polyvinylpyrrolidon, Đỏ erythrosin, Titan dioxyd, Sáp carnauba, Đường trắng, Gelatin, Calcicarbonat)

♦ Chỉ định:

- Điều trị tình trạng thiếu Vitamin B₁ như: bệnh tê phù (beriberi)

♦ Liều dùng:

- Người lớn: Uống mỗi ngày 1 viên

♦ Chống chỉ định:

- Quá mẫn với Thiamin và các thành phần khác của chế phẩm.

♦ Tác dụng không mong muốn:

- Hiếm gặp: Ban da, ngứa, mề đay.

THÔNG BÁO CHO BÁC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

♦ Tương tác thuốc

- Chưa thấy vitamin B₁ tương tác với thuốc nào

♦ Thận trọng

- Thời kỳ cho con bú: Thiamin qua được sữa mẹ, tuy nhiên do còn thiếu dữ liệu về ảnh hưởng trên nhũ nhi, cần thận trọng khi dùng thuốc trong thời gian cho con bú. Khẩu phần thiamin hàng ngày trong thời kỳ cho con bú là 1,6 mg. Nếu chế độ ăn của người mẹ được cung cấp đầy đủ, thì không cần phải bổ sung thêm thiamin.

♦ Quá liều

- Chưa có tài liệu báo cáo về các biểu hiện khi sử dụng quá liều vitamin B₁

♦ Trình bày:

- Hộp 1 chai x 20 viên bao đường.
- Hộp 10 vi x 10 viên bao đường.

♦ Hạn dùng:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất

♦ Bảo quản:

- Nơi khô mát (nhiệt độ $\leq 30^{\circ}\text{C}$), tránh ánh sáng.

♦ Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA THẦY THUỐC

KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ HẠN SỬ DỤNG GHI TRÊN HỘP

CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM NIC (NIC-PHARMA)

Lô 11D đường C – KCN Tân Tạo – Q.Bình Tân – TP.HCM

ĐT : 7.541.999 – Fax: 7.543.999

TP.HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2011

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



ĐS. NGUYỄN TRUNG KIÊN



Đm