

Dùng dịch uống

Bicanma



<https://trungtam>



Thành phần:

Mỗi ống chứa

Magnesium gluconate 0,426 g

Calcium glycerophosphate 0,456 g

Tá được vỡ 10 ml

Chỉ định:

- Điều trị suy nhược chức năng.
- Thích hợp cho bệnh nhân trong thời kỳ dưỡng bệnh (sau nhiễm trùng, sau phẫu thuật, bệnh nội tiết hoặc chuyển hóa, suy dinh dưỡng, nghiện rượu), học sinh và sinh viên trong thời gian thi cử, người bị stress, người hoạt động trí não quá sức, người lao động chân tay, người chơi thể thao, người cao tuổi, phụ nữ mãn kinh, trẻ đang tăng trưởng.

Liều dùng - cách dùng:

- Sử dụng đường uống.
- Người lớn: 2 - 3 ống mỗi ngày.
- Trẻ em từ 6 - 15 tuổi: 1 ống mỗi ngày.
- Pha loãng thuốc trong một ít nước và uống trước bữa ăn.

Quá liều và cách xử trí:

- Thông tin về quá liều chưa thấy báo cáo đầy đủ.
- Quá liều Magnesi có thể xảy ra: nhịp tim chậm, ngủ gà, uể oải, chóng mặt, lú lẫn, yếu cơ, mất ý thức... Quá liều Calci có thể xảy ra: buồn nôn, nôn mửa, chán ăn, táo bón, rối loạn, mê sảng, hôn mê.
- Nếu xảy ra quá liều cần ngưng sử dụng thuốc và đến bệnh viện để được điều trị kịp thời.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Tăng calci huyết, calci niệu, có cặn calci trong mô. Đang theo chế độ ăn kiêng đường.
- Trẻ em dưới 6 tuổi.

Tương tác thuốc khác:

Không dùng chung với Kayexalate (natri polystyrene sulphonate) do Bicanma có chứa sorbitol. Cần thận trọng khi kết hợp với các thuốc Fluoroquinolones, thuốc thuộc nhóm cyclines, diphosphonate, khuyến cáo nên uống cách nhau ít nhất 3 giờ, các thuốc bằng dạ dày có chứa nhôm. Khi kết hợp với các thuốc lợi tiểu thiazid (indapamide, xipamide...) cần lưu ý đến nguy cơ tăng calci máu do giảm đào thải calci qua nước tiểu.

Thận trọng:

Vì thuốc có chứa sorbitol, thận trọng trong các trường hợp tắc ống mật hoặc suy gan nặng.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thận trọng không nên dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai và cho con bú.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không gây ảnh hưởng gì khi lái xe và vận hành máy.

Tác dụng không mong muốn:

Muối magnesi, calci dùng đường uống có thể gây kích đường tiêu hóa và tiêu chảy, rất hiếm khi xảy ra các triệu chứng của tăng magnesi huyết, calci huyết trừ trường hợp có suy thận.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản: Tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

CÔNG TY DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Sản xuất tại: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm BIDIPHAR 1

408 Nguyễn Thái Học - Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định - Việt Nam