

## BIXOVOM 8

### VIÊN NÉN BAO PHIM

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nén bao phim chứa:

- ♦ **Hoạt chất chính:** Bromhexin hydroclorid.....8 mg.
- ♦ **Tá dược:** Tinh bột ngô, lactose, P.V.P K30, bột talc, magnesii stearat, aerosil, H.P.M.C, titan dioxyd, phẩm màu violet, dầu thầu dầu.

#### CHỈ ĐỊNH:

Trong các bệnh rối loạn dịch phế quản: Nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính.

#### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bromhexin và các thành phần của thuốc.

#### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

**Cách dùng:** Dùng đường uống.

#### Liều dùng:

- ♦ Thời gian điều trị không được kéo dài quá 8 – 10 ngày nếu chưa có ý kiến của thầy thuốc.
- ♦ Trung bình:
  - Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 8mg (1 viên)/lần, 3 lần/ngày.
  - Trẻ em 6 – 12 tuổi: 4mg (½ viên)/lần, 3 lần/ngày.
  - Trẻ nhỏ 2 – 6 tuổi: 4mg (½ viên)/lần, 2 lần/ngày.

#### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

##### Ít gặp:

- ♦ Tiêu hóa: Đau dạ dày, buồn nôn, nôn, tiêu chảy.
- ♦ Thần kinh: Nhức đầu, chóng mặt, ra mồ hôi.
- ♦ Da: Ban da, mẩn ngứa.
- ♦ Hô hấp: Nguy cơ ứ dịch phế quản ở người bệnh không có khả năng khạc đờm.

##### Hiếm gặp:

- ♦ Tiêu hóa: Khó miệng.
- ♦ Gan: Tăng enzym transaminase AST, ALT.

**Ghi chú:** Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

#### THẬN TRỌNG:

- ♦ Tránh phối hợp với thuốc giảm ho vì có nguy cơ ứ đọng đờm ở đường hô hấp.
- ♦ Khi dùng cho người có tiền sử loét dạ dày (do tác dụng làm tiêu dịch nhầy, nên có thể gây hủy hoại hàng rào niêm mạc dạ dày).
- ♦ Người bệnh hen (do thuốc có thể gây co thắt phế quản ở người mẫn cảm).
- ♦ Sự thanh thải bromhexin và các chất chuyển hoá có thể bị giảm ở bệnh nhân bị suy gan hoặc suy thận nặng, nên cần phải thận trọng và theo dõi.
- ♦ Cần thận trọng khi dùng bromhexin cho người cao tuổi hoặc suy nhược, quá yếu không có khả năng khạc đờm có hiệu quả do đó càng tăng ứ đờm.
- ♦ Không nên dùng BIXOVOM 8 cho trẻ em dưới 2 tuổi.

#### PHỤ NỮ MANG THAI:

- ♦ Chưa nghiên cứu tác dụng sinh quái thai của bromhexin ở động vật thí nghiệm.
- ♦ Trên người, cũng chưa có đủ tài liệu nghiên cứu: vì vậy không khuyến cáo dùng bromhexin cho người mang thai.

#### PHỤ NỮ CHO CON BÚ:

- ♦ Còn chưa biết bromhexin có bài tiết vào sữa mẹ không. Vì vậy, không khuyến cáo dùng bromhexin cho người mẹ đang cho con bú.

#### NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thận trọng khi sử dụng vì thuốc có thể gây nhức đầu, chóng mặt.

#### TƯƠNG TÁC THUỐC:

- ♦ Không phối hợp với thuốc làm giảm tiết dịch (giảm cả dịch tiết khí phế quản) như các thuốc kiểu atropin (hoặc anticholinergic) vì làm giảm tác dụng của bromhexin.
- ♦ Không phối hợp với các thuốc chống ho.

#### QUÁ LIỀU, XỬ TRÍ:

- ♦ Cho đến nay chưa có báo cáo về quá liều do bromhexin. Nếu xảy ra trường hợp quá liều, cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ.
- ♦ Báo ngay cho bác sỹ khi dùng quá liều chỉ định.

#### QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

- ♦ Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim.
- ♦ Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim.
- ♦ Hộp 1 chai x 100 viên bao phim.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

#### TIÊU CHUẨN: TCCS

#### CHÚ Ý:

**Không sử dụng thuốc nếu:**

- ♦ **Viên thuốc bị biến màu, nứt vỡ.**
  - ♦ **Ví thuốc bị rách.**
  - ♦ **Chai thuốc bị nứt, mất nhãn.**
  - ♦ Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sỹ khi gặp những triệu chứng dị ứng.
  - ♦ Để xa tầm tay trẻ em.
  - ♦ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
- ♦ Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.



VIDIPHA

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.Ư VIDIPHA**  
184/2, Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

**Sản xuất tại chi nhánh**  
**CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG**  
Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương