

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 22/6/2018



BỔ GAN TIÊU ĐỘC
LIVDHT

Ông uống 5ml

Sản xuất bởi:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

SĐK:
Số lô SX:
HD:


THÀNH PHẦN: Mỗi ống 5ml chứa:
Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*).....1g
Chua ngọt (*Fructus Embeliae*).....0,5g
Cỏ nhọ nôi (*Herba Ecliptae*).....1g
Tã được vđ.....5ml

CHỈ ĐỊNH:
Viêm gan cấp và mãn tính, viêm gan B. Suy giảm chức năng gan với các biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, dị ứng, lở ngứa, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón. Bảo vệ và phục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia hoặc sử dụng thuốc chống lao dài ngày. Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan.

Số đăng ký:
Số lô SX:
NSX:
HD:



BỔ GAN TIÊU ĐỘC
LIVDHT



DHT
HATAPHAR

Hộp 20 ống x 5ml cao lỏng



CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Người lớn: Uống mỗi lần 20 - 40 ml/ngày, chia làm nhiều lần
Trẻ em: Uống mỗi lần 10 - 20 ml/ngày, chia làm nhiều lần
Uống sau các bữa ăn, mỗi đợt dùng kéo dài 30 ngày.

Chống chỉ định và các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.


BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

TRƯỚC UỐNG, KHÔNG ĐƯỢC TIÊM



Sản xuất bởi:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - T.P Hà Nội
Tổng đài tư vấn khách hàng: 04 33 52 25 25

BỔ GAN TIÊU ĐỘC
LIVDHT



DHT
HATAPHAR

Hộp 20 ống x 5ml cao lỏng

TM/19158

29195 1857

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

1. Tên thuốc: Bổ gan tiêu độc LIVDHT

2. Thành phần: Mỗi 5ml cao lỏng chứa:

Diệp hạ châu (<i>Herba Phyllanthi urinariae</i>)	1g
Chua ngút (<i>Fructus Embeliae</i>)	0,5g
Cỏ nhọ nồi (<i>Herba Ecliptae</i>)	1g
Tá dược vđ	5ml



(Tá dược gồm: Acid benzoic, acid citric, natri citrat, aspartam, ethanol 96%, nước tinh khiết).

3. Dạng bào chế: Cao lỏng

4. Tác dụng: Thuốc bổ gan tiêu độc LIVDHT là sự kết hợp của 3 vị thuốc: Diệp hạ châu, chua ngút, cỏ nhọ nồi, trong đó:

Diệp hạ châu: Tác dụng của cây diệp hạ châu đáng giống như một loài thuốc quý, có vị đắng, tính mát và khả năng chữa trị nhiều bệnh: khôi phục chức năng gan, lợi mật, điều hòa huyết áp, diệt khuẩn, chữa gan nhiễm mỡ, mụn nhọt, lở ngứa, tiêu hóa; hạn chế tác động sinh trưởng của virus viêm gan (đặc biệt là viêm gan siêu vi B).

Chua ngút: Quả chứa tanin, hợp chất anthraquinon, tinh dầu, dầu béo và 2-3% embelin (embelic acid). Kháng sinh, sát trùng. Quả có tác dụng trừ giun sán, làm se, gây trung tiện, tăng chuyển hoá và kích thích giải khát và bổ. Cao lỏng của quả có tác dụng kháng khuẩn *Staphylococcus aureus* và *Escherichiacoli*; cao này cũng có tác dụng co bóp tử cung, có tác dụng trên chức năng nội tiết sinh dục và khả năng sinh sản.

Cỏ nhọ nồi: có tác dụng nhuận tràng, thông tiểu, sát trùng.

Sự phối hợp của 3 vị thuốc làm tăng hiệu lực và tác dụng của thuốc.

5. Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 5ml cao lỏng. Kèm theo đơn hướng dẫn sử dụng thuốc.

6. Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định

6.1. Chỉ định:

Viêm gan cấp và mãn tính, viêm gan B. Suy giảm chức năng gan với các biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, dị ứng, lở ngứa, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón. Bảo vệ và phục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia hoặc sử dụng thuốc chống lao dài ngày. Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan.

6.2. Liều lượng và cách dùng:

Người lớn: Uống mỗi lần 20-40 ml/ngày, chia làm nhiều lần

Trẻ em: Uống mỗi lần 10-20 ml/ngày, chia làm nhiều lần

Uống sau các bữa ăn, mỗi đợt dùng kéo dài 30 ngày.

6.3. Chống chỉ định:

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc, người bị viêm tắc mật. Phụ nữ có thai và cho con bú. Người thể hàn, chủ hàn, nam giới có ý định sinh con.

7. Thận trọng: Chưa có tài liệu báo cáo.

- **Thời kỳ mang thai, cho con bú:** Thuốc không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của thầy thuốc.

- **Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

8. Tương tác thuốc:

Hiện nay chưa có tương tác nào xảy ra với các thuốc khác.

9. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Thuốc chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn.

10. Quá liều và cách xử trí:

Chưa có tài liệu báo cáo.

11. Khuyến cáo:

Chưa có tài liệu báo cáo.

12. Điều kiện bảo quản và hạn dùng:

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất. **Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng.**

* **Lưu ý:** Khi thấy thuốc bị vẩn đục, số lô SX, HD mờ hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

13. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở sản xuất : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

Số điện thoại: 04.33824685, 04.33522203; **Số fax:** 04.33829054, 04.33522203

Biểu tượng:



14. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

Ngày tháng năm



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH



1. Tên thuốc: Bổ gan tiêu độc LIVDHT

2. Khuyến cáo:

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

“Để xa tầm tay trẻ em”

“Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”

3. Thành phần, hàm lượng: Mỗi 5ml cao lỏng chứa:

Diệp hạ châu (<i>Herba Phyllanthi urinariae</i>)	1g
Chua ngút (<i>Fructus Embeliae</i>)	0,5g
Cỏ nhọ nồi (<i>Herba Ecliptae</i>)	1g
Tá dược vđ	5ml

(Tá dược gồm: *Acid benzoic, acid citric, natri citrat, aspartam, ethanol 96%, nước tinh khiết*).

4. Mô tả sản phẩm: Chất lỏng sánh, màu nâu đen, mùi thơm vị ngọt, hơi đắng.

5. Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 5ml. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

6. Thuốc dùng cho bệnh gì? Viêm gan cấp và mãn tính, viêm gan B. Suy giảm chức năng gan với các biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, dị ứng, lở ngứa, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón. Bảo vệ và phục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia hoặc sử dụng thuốc chống lao dài ngày. Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan.

7. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Người lớn: Uống mỗi lần 20-40 ml/ngày, chia làm nhiều lần

Trẻ em: Uống mỗi lần 10-20 ml/ngày, chia làm nhiều lần

Uống sau các bữa ăn, mỗi đợt dùng kéo dài 30 ngày.

8. Khi nào không nên dùng thuốc này?

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc

Người bị viêm tắc mật.

Người thể hàn, chủ hàn, nam giới có ý định sinh con.

9. Tác dụng không mong muốn:

Không có.

10. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

Hiện nay chưa có tương tác nào xảy ra với các thuốc khác.

11. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Bổ sung liều ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu thời gian giãn cách với liều tiếp theo quá ngắn thì bỏ qua liều đã quên và tiếp tục lịch dùng thuốc. Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã bị bỏ lỡ.

12. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Giữ thuốc trong hộp kín, ngoài tầm với của trẻ em.

Bảo quản thuốc ở nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tránh nguồn nhiệt và ánh sáng trực tiếp.

13. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều?

Không có tài liệu báo cáo.

14. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?

Chưa có tài liệu báo cáo.

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này? Chưa có báo cáo

- **Thời kỳ mang thai, cho con bú:** Thuốc không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của thầy thuốc.

- **Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ?

Có thể có các tác dụng phụ không được đề cập. Khi bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các tác dụng phụ, hãy tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.

17. Hạn dùng của thuốc:

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. **Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng.**

* *Lưu ý:* Khi thấy thuốc bị vẩn đục, số lô SX, HD mờ hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

18. Tên, địa chỉ, biểu tượng của nhà sản xuất:

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Trụ sở: 10A – Quang Trung - Hà Đông - TP. Hà Nội

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

Số điện thoại: 04.33824685, 04.33522203; **Số fax:** 04.33829054, 04.33522203

Biểu tượng:



19. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

Ngày tháng năm



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lỗ Minh Hùng