




THÀNH PHẦN:
 Guaifenesin2%
 Bromhexin HCl0,08%
 Tá dược vừa đủ

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
 Xem trong tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN:
 Bảo quản nơi khô mát, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C, tránh ánh sáng mặt trời.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Đề xa tâm tay trẻ em
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



Số lô SX:
Ngày sản xuất:
Hạn sử dụng:
SDK:

Nhà phân phối:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM THANH NGÂN
 Số 6, ngõ 63 đường Vạn Phúc, tổ dân phố 10, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

Cơ sở sản xuất thuốc:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
 Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 Địa điểm sản xuất:
Nhà máy Dược phẩm DKPharma
 chi nhánh Bắc Ninh:
Công Ty Cổ Phần Dược Khoa
 Lô III-1.3, đường D3, khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

kt: 80x43mm



kt: 45x45x110mm

Dung dịch uống
BronchoMT
 Guaifenesin 2%
 Bromhexin HCl 0.08%

Hộp 1 lọ 60ml

THÀNH PHẦN:
 Guaifenesin 2%
 Bromhexin HCl 0,08%
 Tá dược vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:
 Giúp giảm triệu chứng tắc nghẽn đường hô hấp (do đờm) và ho do cảm lạnh thông thường.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
 Mỗi lần uống cách nhau 8 giờ
 - Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 10ml
 - Trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi: mỗi lần 5ml. Chỉ sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ, dược sĩ hoặc nhân viên y tế.
 - Không dùng quá 3 lần mỗi 24 giờ

Thận trọng, cảnh báo, tương tác thuốc và các thông tin khác xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp



Dung dịch uống
BronchoMT
 Guaifenesin 2%
 Bromhexin HCl 0.08%

Hộp 1 lọ 60ml

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
 - Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
 - Trẻ em dưới 6 tuổi.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:
 Bảo quản nơi khô mát, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C, tránh ánh sáng mặt trời.

HẠN DÙNG:
 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Chỉ sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở nắp lần đầu.

TIÊU CHUẨN: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:

Nhà phân phối:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM THANH NGÂN
 Số 6, ngõ 63 đường Vạn Phúc, tổ dân phố 10, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
 Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 Địa điểm sản xuất: Nhà máy Dược phẩm DKPharma- chi nhánh Bắc Ninh công ty Cổ phần Dược Khoa:
 Lô III-1.3, đường D3, khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Đề xa tâm tay trẻ em
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
Hoàng Sỹ Đường

| | | |
|--|---|---|
| <p>THÀNH PHẦN: Guaifenesin2% Bromhexin HCl 0,08% Tá dược vừa đủ</p> <p>CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.</p> <p>BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô mát, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C, tránh ánh sáng mặt trời.</p> <p>TIÊU CHUẨN: TCCS</p> <p><small>Để xa tầm tay trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.</small></p> | <p>Dung dịch uống BronchoMT Guaifenesin 2% Bromhexin HCl 0.08%</p> <p>Lọ 100ml</p> | <p>Số lô SX: Ngày sản xuất: Hạn sử dụng: SĐK:</p> <p>Nhà phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM THANH NGÂN Số 6, ngõ 63 đường Vạn Phúc, tổ dân phố 10, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội</p> <p>Cơ sở sản xuất thuốc: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Địa điểm sản xuất: Nhà máy Dược phẩm DKPharma chi nhánh Bắc Ninh: Công Ty Cổ phần Dược Khoa Lô III-1.3, đường D3, khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh</p> |
|--|---|---|

kt: 128x50mm

Dung dịch uống
BronchoMT
Guaifenesin 2%
Bromhexin HCl 0.08%

51x51x130mm

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Dung dịch uống BronchoMT Guaifenesin 2% Bromhexin HCl 0,08%</p> | <p>THÀNH PHẦN: Guaifenesin2% Bromhexin HCl0,08% Tá dược vừa đủ</p> <p>CHỈ ĐỊNH: Giúp giảm triệu chứng tắc nghẽn đường hô hấp (do đờm) và ho do cảm lạnh thông thường.</p> <p>CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG: Mỗi lần uống cách nhau 8 giờ - Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 10ml - Trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi: mỗi lần 5ml. Chỉ sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ, dược sĩ hoặc nhân viên y tế. - Không dùng quá 3 lần mỗi 24 giờ</p> <p>Thận trọng, cảnh báo, tương tác thuốc và các thông tin khác xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp</p> <p>Hộp 1 lọ 100ml</p> | <p>Dung dịch uống BronchoMT Guaifenesin 2% Bromhexin HCl 0,08%</p> | <p>CHỐNG CHỈ ĐỊNH - Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. - Trẻ em dưới 6 tuổi.</p> <p>ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô mát, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C, tránh ánh sáng mặt trời.</p> <p>HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Chỉ sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở nắp lần đầu.</p> <p>TIÊU CHUẨN: TCCS</p> <p>SĐK: Số lô SX: NSX: HSD:</p> <p>Nhà phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM THANH NGÂN Số 6, ngõ 63 đường Vạn Phúc, tổ dân phố 10, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội</p> <p>Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Địa điểm sản xuất: Nhà máy Dược phẩm DKPharma- chi nhánh Bắc Ninh công ty Cổ phần Dược Khoa: Lô III-1.3, đường D3, khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh</p> <p><small>Để xa tầm tay trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.</small></p> <p>Hộp 1 lọ 100ml</p> |
|---|--|---|--|

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BRONCHOMT

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

Thành phần được chất:
Guaifenesin: 2%
Bromhexin hydrochlorid: 0,08%
Thành phần tá dược: Acid citric monohydrate, Natri hydroxyd, Dinatri edetat, Natri metabisulfít, Propylen glycol, Glycerin, Gum xanthan, Kali sorbat, Đường trắng, Natri saccharin, Hương cam, Hương dâu, Màu vàng tartrazin, Màu đỏ Ponceau 4R, Nước tinh khiết vừa đủ

DANG BẢO CHẾ: Dung dịch uống dạng lỏng, sánh, màu cam đến cam đỏ, mùi thơm, vị ngọt, chua, hơi đắng.

CHỈ ĐỊNH

- Giúp giảm triệu chứng tắc nghẽn đường hô hấp (do đờm) và ho do cảm lạnh thông thường.
- Nhóm dược lý: Thuốc long đờm
- Mã ATC: Bromhexin hydrochlorid: R05CB02, Guaifenesin: R05CA03

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Mỗi lần uống cách nhau 8 giờ
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 10ml
- Trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi: mỗi lần 5ml. Chỉ sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ, dược sĩ hoặc nhân viên y tế.
- Không dùng quá 3 lần mỗi 24 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Trẻ em dưới 6 tuổi.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

- Hồi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nếu:
+ Ho dai dẳng hoặc mãn tính như xảy ra với trường hợp: hút thuốc, hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, khí phế thũng, + Ho có nhiều đờm
+ Đang mang thai hoặc cho con bú
+ Có tiền sử loét dạ dày
+ Đang dùng các loại thuốc ho và cảm lạnh khác
+ Không sử dụng quá liều được khuyến cáo
- Ngưng sử dụng và hồi ý kiến bác sĩ nếu bị ho kéo dài hơn 1 tuần, có xu hướng tái phát hoặc kèm theo sốt, phát ban hoặc nhức đầu dai dẳng. Đây có thể là dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng.
- Dùng sử dụng và liên hệ với bác sĩ ngay nếu thấy có phản ứng dị ứng.
- Thuốc này có chứa 30mg propylene glycol/ml nên thận trọng khi dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi
- Thuốc có chứa Natri metabisulfite, có thể gây các phản ứng quá mẫn nghiêm trọng và có thể phế quản với xác suất hiếm gặp.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Do chưa có nghiên cứu đầy đủ khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú, cần nhắc giữa lợi ích và nguy cơ và tham khảo ý kiến của thầy thuốc để đảm bảo an toàn cho thai nhi và trẻ bú mẹ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc đã được thực hiện với thuốc kết hợp Bromhexin hydrochlorid và Guaifenesin. Thuốc có tác dụng không mong muốn là có thể gây ra chóng mặt, nhức đầu. Trong trường hợp này, chỉ lái xe hay vận hành máy móc khi hết các triệu chứng trên.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

- Tương tác:**
- Dùng đồng thời kháng sinh (amoxicillin, cefuroxime, erythromycin, doxycycline) sẽ làm tăng nồng độ kháng sinh.
- Tương kỵ:**
- Do chưa có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Thuốc được dung nạp tốt. Các tác dụng phụ trên đường tiêu hóa đã được báo cáo. Các phản ứng dị ứng, đặc biệt là phát ban trên da, rối hiếm khi xảy ra. Tăng transaminase, nhức đầu và chóng mặt có thể xảy ra.

Rối loạn hệ thống miễn dịch, rối loạn da và mô dưới da và rối loạn hô hấp, trung thất và lồng ngực

Bromhexine: phản ứng phản vệ bao gồm sốc phản vệ mạch, co thắt phế quản, phát ban, mày dáy, ngứa và quá mẫn cảm khác.
Guaifenesin: phát ban, bao gồm mày dáy

Rối loạn tiêu hóa

Bromhexine: buồn nôn, nôn, tiêu chảy và đau vùng bụng trên.
Guaifenesin: khó chịu đường tiêu hóa, nôn mửa và tiêu chảy đã được báo cáo, đặc biệt khi dùng liều cao.

Rối loạn hệ thần kinh

Bromhexine: chưa có thông tin
Guaifenesin: chóng mặt và nhức đầu đã được báo cáo
Lạm dụng thuốc có chứa guaifenesin có thể gây sỏi niệu

Ghi chú

Những bệnh nhân được dùng BronchomT Kids nên được thông báo về sự gia tăng chất tiết
Hướng dẫn và cách xử lý ADR: các ADR thường nhẹ và qua khỏi trong quá trình điều trị. Khi gặp các phản ứng nặng như co thắt phế quản, sốc phản vệ mạch, phát ban, mày dáy, ngứa cần dừng thuốc và liên hệ với bác sĩ.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUẢ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Triệu chứng:
- Bromhexine: cho đến nay, chưa có báo cáo về quả liều cụ thể cho con người. Dựa trên các báo cáo về quả liều ngẫu nhiên và/hoặc liều thuốc, các triệu chứng phù hợp với các tác dụng phụ đã biết ở liều khuyến cáo và có thể cần điều trị triệu chứng.
- Guaifenesin: các tác dụng độc cấp tính của guaifenesin bao gồm khó chịu đường tiêu hóa, buồn nôn và buồn ngủ.

Cách xử lý:

Nếu xảy ra trường hợp quá liều, cần theo dõi và hỗ trợ điều trị triệu chứng, gọi ngay cho bác sĩ nếu có các biểu hiện nặng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Lọ 60ml/ 100ml, Hộp 1 lọ kèm cốc đong liều và tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Chỉ sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở nắp lần đầu.

TIÊU CHUẨN: TCCS

CƠ SỞ ĐĂNG KÝ THUỐC: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
SẢN XUẤT TẠI: Nhà máy Dược phẩm DKPharma – chi nhánh Bắc Ninh Công ty cổ phần Dược Khoa
Địa chỉ: Lô III – 1.3, đường D3, khu công nghiệp Quế V6 2, xã Quế Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh



GIAM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
Hoàng Sỹ Đường

kt: 100x200mm