



CADIMIN C 500

Viên nang cứng Vitamin C 500 mg

Thành phần

Mỗi viên nang cứng chứa:

Vitamin C (Acid ascorbic) 500 mg

Tá dược: Lactose, Acid stearic, Aerosil, Talc.

Phân loại Vitamin C (Acid ascorbic) là 1 vitamin tan trong nước.

Chỉ định

CADIMIN C 500 được chỉ định trong trường hợp điều trị các bệnh do thiếu vitamin C (Bệnh scorbut).

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Liều lượng và cách dùng

Liều dùng cho từng trường hợp cụ thể tùy theo chỉ định của bác sĩ. Liều thông thường là 1-2 viên/ngày.

Cách dùng: Uống nguyên viên thuốc.

Chống chỉ định

- Chống chỉ định dùng vitamin C liều trên 1g mỗi ngày cho người bị thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase.
- Chống chỉ định cho người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hoá oxalat, bệnh thalassemia.

Thận trọng

- Không nên uống vitamin C liều trên 1g mỗi ngày trong thời gian mang thai vì có thể dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh.
- Tăng oxalat niệu có thể xảy ra sau khi dùng liều trên 1g mỗi ngày vitamin C.

Phụ nữ mang thai

Không nên dùng vitamin C liều trên 1g mỗi ngày ở phụ nữ mang thai vì thuốc có thể đi qua nhau thai, có thể dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh.

Phụ nữ cho con bú

Vitamin C được bài tiết vào sữa mẹ, tuy nhiên không thấy ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh khi dùng theo nhu cầu bình thường.

Tương tác thuốc

- Tăng hấp thu sắt qua đường dạ dày ruột.
- Tăng bài tiết khi dùng đồng thời với aspirin.
- Không dùng vitamin C liều trên 1g mỗi ngày cùng với vitamin B₁₂ vì có thể phá huỷ vitamin B₁₂.
- Vitamin C làm tăng giả tạo glucose trong định lượng bằng thuốc thử đồng (II) sulfat và làm giảm giả tạo lượng glucose nếu định lượng bằng phương pháp glucose oxydase.

Tác dụng phụ

Dùng liều lớn hơn 1 g mỗi ngày có thể gây:

- Tăng oxalat niệu.
- Rối loạn tiêu hóa.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

Các triệu chứng quá liều bao gồm sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dày, tiêu chảy. Xử trí bằng cách truyền dịch gây lợi tiểu.

Dạng trình bày



Hộp 10 vỉ x10 viên

Chai 200 viên

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cơ sở.

Bảo quản

Bảo quản thuốc ở nơi khô, mát, dưới 30⁰C, tránh ánh sáng mặt trời.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất

CÔNG TY TNHH US PHARMA USA

Địa chỉ : Lô B1- 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08 37908860 – 08 37908861,

Fax: 08 37908856



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

