

882/1159

# Calcium Hasan 250 mg

Hộp 01 tuýp x 12 viên nén sủi bọt

Kích thước: 38 x 38 x 106 mm

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Ngày đầu: 19/07/18



**Calcium Hasan**  
250 mg

**Composition**  
 Calcium lactate gluconate ...1470 mg  
 Calcium carbonate ..... 150 mg  
 (equivalent to Calcium ..... 250 mg)  
 Excipients ..... q.s. 1 tablet

**Indications, Contraindications, Dosage and Administration, Interactions, Undesirable effects, Precautions and other information:**  
 Read carefully the enclosed leaflet.

Store in a dry place, below 30°C.  
 Protect from light.  
 Manufacturer's specification.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**READ CAREFULLY THE DIRECTIONS**  
**BEFORE USE!**



HASAN - DERMAPHARM CO., LTD.  
 Road No. 2, Dong An Industrial Park,  
 Binh Duong, Vietnam

Calcium Hasan 250 mg

**Calcium Hasan**  
250 mg

Calci lactat gluconat 1470 mg  
Calci carbonat 150 mg

Hộp 01 tuýp x 12 viên nén sủi bọt  
Tuýp nhựa, nắp được đóng silicagel



**Calcium Hasan**  
250 mg

**Thành phần**  
 Calci lactat gluconat ..... 1470 mg  
 Calci carbonat ..... 150 mg  
 (tương đương Ca) ..... 250 mg  
 Tá dược ..... sđ 1 viên

**Chỉ định, Chống chỉ định, Liều lượng, Cách dùng, Tương tác, Tác dụng không mong muốn, Thận trọng và các thông tin khác:** Xem đọc lượng dẫn sử dụng.

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C.  
 Tránh ánh sáng.  
 Tiêu chuẩn cơ sở.  
 SDK - Reg. No.

**ĐEN XÀM TAY TRẼM**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**TRƯỚC KHI DÙNG!**



CÔNG TY TNHH  
 HASAN - DERMAPHARM  
 Đường số 2, KCN Đông An,  
 Bình Dương, Việt Nam

**Calcium Hasan**  
250 mg

Hộp 01 tuýp x 12 viên nén sủi bọt  
Tuýp nhựa, nắp được đóng silicagel

Số lô SX -  
 Batch No.:  
 NSX -  
 Mfg. Date:  
 HD -  
 Exp. Date:



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**ĐS. Trần Đình Hương**

# Calcium Hasan 250 mg

Tuýp 12 viên nén sủi bọt

Kích thước: 93 x 91 mm

91.00 mm

**Calcium Hasan 250 mg**

Calci lactat gluconat 1470 mg  
Calci carbonat 150 mg

**Calcium Hasan 250 mg**

**12 viên nén sủi bọt**

**Thành phần**  
Calci lactat gluconat ..... 1470 mg  
Calci carbonat ..... 150 mg  
(tương đương Calci ..... 250 mg)  
Tá dược ..... q.s. 1 viên

**Chỉ định, Chống chỉ định, Liều lượng, Cách dùng, Tương tác, Tác dụng không mong muốn, Thận trọng và các thông tin khác:** Xin đọc hướng dẫn sử dụng.  
Bảo quản nơi khô, dưới 30°C.  
Tránh ánh sáng.  
Tránh ẩm ướt.  
SDK - Reg. No.  
Số ít SX/SSX/HD: xem đơn đây hoặc ĐỀ XÁI TÂM TÂY TRỆM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

**Composition**  
Calcium lactate gluconate ..... 1470 mg  
Calcium carbonate ..... 150 mg  
(equivalent to Calcium ..... 250 mg)  
Excipients ..... q.s. 1 tablet

**Indications, Contraindications, Dosage and Administration, Interactions, Undesirable effects, Precautions and other information:**  
Read carefully the enclosed leaflet.  
Store in a dry place, below 30°C.  
Protect from light.  
Manufacturer's specification.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS  
BEFORE USE!**

**HASAN**  
CÔNG TY TNHH  
HASAN - DERMAPHARM  
Đường số 2, KCN Đông An,  
Bình Dương, Việt Nam

8 936 024 139 801 9

HASAN - DERMAPHARM CO., LTD.  
Road No. 2, Dong An Industrial Park,  
Binh Duong, Vietnam

93.00 mm



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
DS. Trần Đình Hương



# Thông tin thuốc dành cho bệnh nhân Calcium Hasan 250 mg

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ nh từng tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

## THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG CŨA THUỐC

- Dược chất: calci lactat gluconat 1470 mg, calci carbonat 150mg (tương đương calci 250 mg).

- Tá dược: Lactose khan, saccharose, acid citric khan, natri hydrocarbonat khan, natri carbonat khan, natri saccharin, PEG 6000, bột thượng cam.

## MỘT SỐ SẢN PHẨM

Viên nén tròn, màu trắng, hai mặt phẳng, cạnh và thành viền lồi nhẵn, có hường và vị cam.

## QUY CÁCH DÙNG GÓI

Hộp 01 tuýp x 12 viên nén sùi bọt Viên được gói trong giấy nhôm. Tuýp nhtra HDPE, nắp được đóng silicone.

## THUỐC DÙNG CHO BỆNH GI

Calci là nguyên tố cần thiết cho quá trình hình thành và duy trì xương.

- Calcium Hasan 250 mg được sử dụng để:
- Phòng ngừa và điều trị thiếu hụt calci.
- Phối hợp với các thuốc khác trong phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương.
- Phối hợp với vitamin D3 để điều trị còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người lớn.

## NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO

Luôn sử dụng thuốc theo đúng các hướng dẫn dưới đây:

- Liều dùng cho người lớn và trẻ em: 4 viên/ngày; uống 2-4 lần/ngày.
- Hòa tan viên thuốc vào một cốc nước (khoảng 150-200 ml nước). Uống ngay sau khi viên thuốc tan hoàn toàn. Có thể uống trước, trong hoặc sau bữa ăn.
- Luôn tuân thủ đúng thời gian sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Calcium Hasan 250 mg được sử dụng để phòng ngừa và điều trị thiếu hụt calci hoặc phối hợp với các thuốc khác trong phòng ngừa và điều trị loãng xương. Vì vậy, thời gian điều trị thường kéo dài.

## KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY

- Dùng với calci lactat gluconat, calci carbonat hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Có nồng độ calci trong máu tăng cao (tăng calci huyết).
- Có nồng độ calci trong nước tiểu tăng cao (tăng calci niệu).
- Có các vấn đề về thận như sỏi thận, lắng đọng calci trong các mô ở thận.

## TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Giống như các thuốc khác, Calcium Hasan 250 mg có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn mặc dù không phải bệnh nhân nào cũng gặp phải.

**Ngừng thuốc và thông báo cho bác sĩ ngay lập tức trong trường hợp bạn gặp phải các triệu chứng của phản ứng dị ứng được liệt kê cụ thể dưới đây:**

- **Rất hiếm gặp (tần suất xuất hiện ở người là < 1/10000):** Phản ứng dị ứng nặng bao gồm sưng phù mắt, môi, lưỡi, họng, có thể gây khó thở hoặc khó nuốt.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ trong trường hợp các tác dụng không mong muốn trên trở nên nặng hơn khi sử dụng thuốc hoặc bạn gặp phải bất kỳ các tác dụng không mong muốn nào khác:

- **Ỉ gầy (tần suất xuất hiện ở người là < 1/100):** Tăng nồng độ calci trong máu (tăng calci huyết) hoặc tăng đào thải calci qua nước tiểu (tăng calci niệu).
- **Hiếm gặp (tần suất xuất hiện ở người là < 1/1000):** Buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, táo bón, đầy hơi, ngứa, đỏ và nóng da.

## NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những thuốc bạn đang hoặc vừa sử dụng gần đây, bao gồm thuốc không kê đơn, vì Calcium Hasan 250 mg có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc khác và ngược lại nếu sử dụng đồng thời.

- Các thuốc như glycosid tim, thuốc lợi tiểu, corticosteroid, vitamin D.
- Trong trường hợp bạn đang sử dụng thuốc nhóm biprophosphonat để điều trị hoặc phòng ngừa loãng xương (alendronat, etidronat, ibandronat, risedronat) hoặc natri fluorid, nên uống Calcium Hasan 250 mg ít nhất 3 giờ sau khi sử dụng các thuốc trên.
- Trong trường hợp bạn đang sử dụng các kháng sinh nhóm tetracyclin, nên uống Calcium Hasan 250 mg ít nhất sau 2 giờ hoặc 4-6 giờ trước khi sử dụng tetracyclin.
- Trong trường hợp bạn đang sử dụng các thuốc kháng sinh nhóm quinolon (như ciprofloxacin), nên uống cách Calcium Hasan 250 mg ít nhất là 3 giờ.
- Trong trường hợp bạn đang sử dụng các chế phẩm chứa sắt (viên bổ sung sắt), không nên uống cùng lúc với Calcium Hasan 250 mg.
- Không nên sử dụng Calcium Hasan 250 mg trong vòng 2 giờ khi sử dụng các loại thực phẩm giàu acid oxalic hoặc acid phytic như rau bina (rau chân vịt), đậu hoàng và tất cả các loại ngũ cốc.

## CẦN LƯU Ý KHI MỘT LẦN QUÊN DÙNG THUỐC

- Nếu quên dùng thuốc, uống ngay sau khi nhớ ra. Nếu thời gian nhớ ra gần với thời gian uống liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và tiếp tục uống liều tiếp theo như thường lệ.
- Không uống liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.

## CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO

- Nơi khô, dưới 30°C. Tránh ánh sáng.
- Bảo quản thuốc trong bao bì gốc và đầy kín nắp sau khi sử dụng.
- Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên hộp thuốc và tuýp thuốc.
- Không vứt thuốc vào thùng rác hay rác sinh hoạt. Hỏi dược sĩ cách hủy thuốc không sử dụng nữa. Điều này giúp bảo vệ môi trường.

## NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU

Quá liều Calcium Hasan 250 mg có thể gây ra buồn nôn, nôn mửa, khát nước, táo bón.

## CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO

Không dùng thuốc quá liều khuyến cáo. Trong trường hợp sử dụng quá liều, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ.

## NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY

- Trong trường hợp bạn mắc các bệnh về thận, đang hoặc có tiền sử sỏi thận hoặc được chẩn đoán tăng calci niệu, không nên tự sử dụng Calcium Hasan 250 mg, cần tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt trong trường hợp bạn đang sử dụng các chế phẩm có chứa nhôm.
- Thông báo cho bác sĩ nếu bạn đang sử dụng nhóm thuốc glycosid trợ tim (như digoxin) để điều trị một số bệnh tim mạch.

Không nên tự ý sử dụng các chế phẩm bổ sung vitamin D trong khi sử dụng liều cao Calcium Hasan 250 mg. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng đồng thời.

- Chế phẩm Calcium Hasan 250 mg chứa lactose, nếu bạn được chẩn đoán mắc phải các rối loạn chuyển hóa một số loại đường, không nên sử dụng thuốc này.
- Trong môi viên nén sùi bọt Calcium Hasan 250 mg có chứa khoảng 141 mg natri, cần thận trọng nếu bạn đang mắc các bệnh cần kiêng muối, nghiêm ngặt (tăng huyết áp, phù, ...).
- Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc.

## Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- + Thông báo cho bác sĩ trước khi sử dụng thuốc nếu bạn đang mang thai hoặc trong thời kỳ cho con bú.
- + Calcium Hasan 250 mg có thể sử dụng ở đối tượng phụ nữ mang thai và cho con bú trong trường hợp thiếu hụt calci. Thông thường, nhu cầu hàng ngày của calci ở các đối tượng này là 1000-1300 mg (bao gồm lượng calci cung cấp từ thức ăn và các chế phẩm bổ sung calci).

- + Lượng calci sử dụng không nên vượt quá 1500 mg/ngày.
- + Calci có thể tiết vào sữa mẹ, với lượng cung cấp theo nhu cầu hàng ngày không cho thấy tác động có hại trên trẻ bú mẹ.

**Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc:** Calcium Hasan 250 mg không ảnh hưởng đến khả năng lái xe, vận hành máy móc, làm việc trên cao hoặc các trường hợp khác.

## KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ

- Đang mắc bệnh thận, sỏi thận.
- Đang mắc các bệnh về tim mạch, tăng huyết áp, phù.
- Có nồng độ calci trong máu cao.
- Đang sử dụng các thuốc được liệt kê ở mục "Nên tránh những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang dùng thuốc này".
- Phụ nữ mang thai hoặc đang trong thời kỳ cho con bú.
- Có các rối loạn về dung nạp một số loại đường.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

## HẠN DÙNG

36 tháng (kể từ ngày sản xuất).

## NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



TU. CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
Đỗ Minh Hùng