



Cho Xương Chắc Khỏe



**Bổ sung canxi và vitamin D mỗi ngày
Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị loãng xương**

Số đăng ký: VD-15711-11

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa: Calcium carbonate 750mg (tương đương 300mg Calcium). Vitamin D3 125 IU. **Trình bày:** Viên nang mềm, vỉ 10 viên nang mềm, hộp 3 vỉ hoặc 10 vỉ. **Chỉ định:** Bổ sung trong các trường hợp thiếu hụt calcium/ vitamin D như phụ nữ có thai, nằm lâu tại chỗ, người cao tuổi. Hỗ trợ trong các điều trị bệnh loãng xương và nhuyễn xương phụ thuộc vitamin D. **Liều lượng và cách dùng:** Người lớn: 1-2 viên/ lần x 2 lần/ ngày, dùng trong các bữa ăn. Trẻ em trên 6 tuổi: 1 viên/ lần x 2 lần/ ngày, dùng trong các bữa ăn. **Chống chỉ định:** Chống chỉ định tuyệt đối trong trường hợp tăng calcium huyết như u tủy, di căn xương hoặc các bệnh ác tính về xương, bệnh sarcoid, tăng năng tuyến cận giáp nguyên phát và quá liều vitamin D. Suy thận nghiêm trọng. Chống chỉ định với tình trạng sỏi thận, tăng calci niệu trầm trọng. Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc. **Tác dụng phụ:** Sử dụng chế phẩm bổ sung calci hiếm khi làm tăng rối loạn đường tiêu hóa như táo bón, đầy hơi, buồn nôn, đau dạ dày, tiêu chảy. Sau khi dùng vitamin D đôi khi da nổi ban. Tăng calci niệu, một số ít trường hợp xảy ra tăng calci niệu khi điều trị dài ngày với liều cao. **Thận trọng:** Bệnh nhân bị suy thận nhẹ đến trung bình hoặc tăng nhẹ calci niệu nên được theo dõi cẩn thận. kiểm tra định kì mức calci huyết tương và sự bài tiết calci trong nước tiểu ở những bệnh nhân bị suy thận nhẹ hoặc trung bình hoặc tăng nhẹ calci niệu. Sự bài tiết của calci niệu nên được xác định. Ở những bệnh nhân có tiền sử bệnh sỏi thận phải theo dõi sự bài tiết calci trong nước tiểu để loại trừ tăng calci niệu. Khi điều trị lâu dài phải theo dõi mức calci trong nước tiểu, trong huyết tương và chức năng thận, giảm hoặc tạm thời ngưng điều trị nếu calci trong nước tiểu quá 7,5mmol/24 giờ. Calci và vitamin D nên được cung cấp từ những nguồn khác. Thận trọng dùng cho trẻ dưới 6 tuổi. **Tương tác thuốc:** Dùng chung với thuốc lợi tiểu Thiazide có nguy cơ tăng calci huyết vì những thuốc này có thể làm giảm sự bài tiết calci bằng đường tiểu. Một số thực phẩm (như những thức ăn chứa acid oxalic, phosphate hoặc acid phytinic) có thể làm giảm sự hấp thu calci. Điều trị đồng thời với Phenytonin hoặc barbiturate có thể làm giảm tác động của vitamin D bởi vì sự hoạt hóa trao đổi chất. Sử dụng đồng thời Glucocorticoid có thể làm giảm tác động của vitamin D. Tác động của Digitalis và một số Glycoside tim có thể tăng khi dùng chế phẩm calci kết hợp vitamin D bằng đường uống. Cần phải theo dõi nghiêm ngặt và nếu cần thiết cần phải theo dõi điện tâm đồ và mức calci. Thuốc có thể làm giảm sự hấp thu của Thyroxine, Bisphosphonate, Natri fluoride, Quinolon hoặc kháng sinh Tetracycline hoặc sắt, nên dùng các chất này ít nhất 4 giờ trước khi sử dụng thuốc. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** Sản xuất: CTY CPDP AMPHACO U.S.A. KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục QLD: .../.../QLD-TT, ngày...tháng...năm... Thông tin chi tiết xin liên hệ: Sanofi-Aventis, 10 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM. ĐT: (84 8) 3829 8526, Fax: (84 8) 3914 4801. VN. VIC. 13. 06. 01

Handwritten signature and date: 8/10/13

