

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
THUỐC CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ
ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM

CANASONE C.B

Thành phần:

Hoạt chất:

Betamethason Dipropionat	
Tính theo Betamethason	0,1 % (kl/kl)
Clotrimazol	1,0 % (kl/kl)

Tá dược: Emulsifying wax, Glycerin, Propylen glycol, Cồn benzylic, Acid citric, Natri phosphat, Natri bisulfít, Nước tinh khiết

Dạng bào chế của thuốc: Dạng kem

Chỉ định

Điều trị nấm ngoài da; nấm bẹn, nấm ở thân, đồi gầy ra bởi *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophyt*, *Epidermophyton floccosum* hay *Microspum canis*; Nhiễm nấm candida do *Candida albicans*.

Liều dùng và cách dùng

Thoa một lớp mỏng và chà nhẹ lên vùng bị nhiễm đã rửa sạch và vùng da xung quanh, mỗi ngày thoa 2 lần cho đến khi hết hẳn.

Chống chỉ định

- Mẫn cảm bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Người nhiễm virus (herpes, thủy đậu)

Tác dụng không mong muốn

Tại chỗ: nóng, ngứa, rát, ban đỏ, khô da, viêm nang lông, chứng rụng lông tóc, nổi ban dạng trứng cá, ngứa sắc tố, viêm da quanh miệng, viêm da dị ứng do tiếp xúc.

Thông báo cho bác sĩ về những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Cảnh báo và thận trọng

Chỉ dùng ngoài, tránh tiếp xúc với mắt.

Nếu bị kích ứng hay mẫn cảm phải ngưng dùng thuốc và thay thế bằng biện pháp trị liệu khác.

Dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ có thai: Không sử dụng cho phụ nữ có thai vì có khả năng gây quái thai, đặc biệt khi sử dụng trên diện rộng với số lượng lớn hay trong thời gian dài.

Tương tác thuốc

Sử dụng dài ngày hoặc đột ngột dùng dùng thuốc corticoid tại chỗ có thể làm trầm trọng hơn bệnh vẩy nến. Chính vì vậy, nên dùng dùng thuốc corticoid tại chỗ ít nhất 1 tuần rồi mới bắt đầu việc điều trị bệnh vẩy nến bằng anthralin.

Quá liều và cách xử trí

Corticoid dùng tại chỗ có thể hấp thu qua da một lượng đủ để gây tác dụng toàn thân. Nên điều trị triệu chứng, giảm liều của thuốc hoặc ngừng thuốc từ từ.

Quy cách đóng gói: Tuýp nhôm loại 5 gam, 15 gam và 25 gam đóng riêng lẻ trong hộp nhỏ. Hộp lớn chứa 12 hộp nhỏ.

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng của thuốc: 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Nhà sản xuất



Công ty TNHH Thái Nakorn Patana (Việt Nam)
Km3 - Quốc lộ 1 - Phường 9 - TP Tuy Hòa - Phú Yên - Việt Nam

Nhà nhượng quyền



Công ty TNHH Thai Nakorn Patana (Thái Lan)
94/7 Soi Ngamwongwan 8 (Yimprakorb) - Ngamwongwan - Tỉnh Nonthaburi - Thái Lan.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

