https://trungtamthuoc.com/

Carbocistein MCN OS

Ống **5** ml dung dịch uống



Carbocistein MCN OS

Ống **10** ml dung dịch uống



M.S.D.N: 1101972250 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN H. THỦ THỪA - T. LONG AN

PGĐ. NGUYỄN THANH NGUYÊN

https://trungtamthuoc.com/

Carbocistein MCN OS

Hộp **30** ống x **5** ml dung dịch uống



M.S.D.N: 1101972250 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
H. THỦ THỪA - T. LONG AN

PGĐ. NGUYỄN THANH NGUYÊN

https://trungtamthuoc.com/

Carbocistein MCN OS

Hộp **60** ống x **5** ml dung dịch uống



M.S.D.N: 1101972250 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
H. THỦ THỪA - T. LONG AN

PGĐ. NGUYỄN THANH NGUYÊN

https://trungtamthuoc.com/

Carbocistein MCN OS

Hộp **30** ống x **10** ml dung dịch uống



M.S.D.N: 1101972250 - C.T.C.P - H. THỦ THỪA - T. LONG AN
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

PGD. NGUYỄN THANH NGUYÊN

https://trungtamthuoc.com/



Carbocistein MCN OS

Hộp **60** ống x **10** ml dung dịch uống


M.S.D.N: 1101972250 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
H. THỦ THỪA - T. LONG AN

PGĐ. NGUYỄN THANH NGUYÊN

https://trungtamthuoc.com/

Carbocistein MCN OS

Gói **5** ml dung dịch uống



Carbocistein MCN OS

Gói **10** ml dung dịch uống



M.S.D.N: 1101972250 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
H. THỦ THỪA - T. LONG AN

PGĐ. NGUYỄN THANH NGUYÊN

https://trungtamthuoc.com/

Carbocistein MCN OS

Hộp **30** gói x **5** ml dung dịch uống



M.S.D.N: 1101972250 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
H. THỦ THỪA - T. LONG AN

PGĐ. NGUYỄN THANH NGUYÊN

https://trungtamthuoc.com/

Carbocistein MCN OS

Hộp **60** gói x **5** ml dung dịch uống



M.S.D.N: 1101972250 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
H. THỦ THỪA - T. LONG AN

PGĐ. NGUYỄN THANH NGUYÊN

https://trungtamthuoc.com/

Carbocistein MCN OS

Hộp **30** gói x **10** ml dung dịch uống



Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg.Date:
HD - Exp.Date:

M.S.D.N: 1101972250-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
H. THỦ THỪA - T. LONG AN

PGĐ. NGUYỄN THANH NGUYÊN

https://trungtamthuoc.com/

Carbocistein MCN OS

Hộp **60** gói x **10** ml dung dịch uống



M.S.D.N: 1101972250-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
H. THỦ THỪA - T. LONG AN

PGĐ. NGUYỄN THANH NGUYÊN

https://trungtamthuoc.com/

Carbocistein MCN OS
Chai **30** ml dung dịch uống



Carbocistein MCN OS
Chai **60** ml dung dịch uống



M.S.D.N: 1101972250 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
H. THỦ THỪA - T. LONG AN

PGD. NGUYỄN THANH NGUYÊN

Carbocistein MCN OS
Chai **90** ml dung dịch uống



Carbocistein MCN OS
Chai **120** ml dung dịch uống



https://trungtamthuoc.com/

Carbocistein MCN OS

Hộp 1 chai x **30** ml dung dịch uống



M.S.D.N: 1101972250 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
H. THỦ THỪA - T. LONG AN

PGĐ. NGUYỄN THANH NGUYÊN

https://trungtamthuoc.com/

Carbocistein MCN OS

Hộp **1** chai x **60** ml dung dịch uống



M.S.D.N: 1101972250 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
H. THỦ THỪA - T. LONG AN

PGD. NGUYỄN THANH NGUYÊN

https://trungtamthuoc.com/

Carbocistein MCN OS

Hộp **1** chai x **90** ml dung dịch uống



M.S.D.N: 1101972250 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
H. THỦ THỪA - T. LONG AN

PGĐ. NGUYỄN THANH NGUYÊN

https://trungtamthuoc.com/

Carbocistein MCN OS

Hộp **1** chai x **120** ml dung dịch uống



M.S.D.N: 1101972250 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
H. THỦ THỪA - T. LONG AN

PGĐ. NGUYỄN THANH NGUYÊN

https://trungtamthuoc.com/

CARBOCISTEIN MCN OS

Dung dịch uống

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THÀNH PHẦN

- **Thành phần dược chất:** Carbocistein 250 mg/5 ml (Carbocistein 5%).
- **Thành phần tá dược:** Gôm xanthan, glycerin, natri hydroxyd, methylparaben, natri saccharin, hương dâu, nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHẾ, MÔ TẢ SẢN PHẨM

Dung dịch uống.

Dung dịch trong suốt, không màu đến vàng nâu, hương dâu.

CHỈ ĐỊNH

Carbocistein là thuốc tiêu chất nhầy được chỉ định ở người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên để điều trị bổ trợ các rối loạn đường hô hấp đặc trưng bởi chất nhầy quá nhiều và nhớt, bao gồm cả bệnh tắc nghẽn đường hô hấp mạn tính.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG

Liều dùng

Lựa chọn quy cách đóng gói phù hợp với liều dùng.

Người trưởng thành kể cả người cao tuổi:

Liều dùng dựa trên liều ban đầu hàng ngày là 2250 mg carbocistein (45 ml) chia làm nhiều lần, giảm xuống 1500 mg (30 ml) mỗi ngày chia làm nhiều lần khi đạt được đáp ứng mong muốn.

Trẻ em:

Trẻ em 2 – 5 tuổi: Liều thông thường là 1,25 – 2,5 ml, 4 lần/ngày.

Trẻ em 5 – 12 tuổi: Liều thông thường là 5 ml x 3 lần/ngày.

Cách dùng

Sản phẩm này dùng bằng đường uống.

Lựa chọn quy cách đóng gói phù hợp với liều dùng.

Đối với dạng ống và gói, chỉ sử dụng cho các mức liều 5 ml và 10 ml.

Đối với dạng chai, việc dùng thuốc được thực hiện bằng cốc đong chia vạch 10 ml với các vạch chia 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml và 10 ml.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào của thuốc.

https://trungtamthuoc.com/

Viêm loét dạ dày đang hoạt động.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Cảnh báo

Việc dùng carbocistein sẽ tạo ra chất nhầy ít nhớt hơn, và được làm sạch thông qua hoạt động của biểu mô và phản xạ ho. Do đó, dùng đồng thời các thuốc chống ho không được khuyến khích.

Không nên sử dụng các chất làm biến đổi chất nhầy phế quản cùng với thuốc chống ho và/hoặc các chất làm khô dịch tiết (atropinic).

Thận trọng khi dùng thuốc

Cần thận trọng ở người cao tuổi, những người có tiền sử loét dạ dày tá tràng hoặc những người dùng đồng thời các thuốc gây xuất huyết tiêu hóa. Vì thuốc tiêu chất nhầy có thể phá vỡ hàng rào niêm mạc dạ dày. Nếu xuất huyết tiêu hóa xảy ra, bệnh nhân nên ngừng thuốc.

Tá dược

Sản phẩm có chứa glycerin có thể gây đau đầu, khó chịu dạ dày và tiêu chảy.

Sản phẩm có chứa methylparaben có thể gây dị ứng (phản ứng chậm).

Sản phẩm có chứa 32,52 mg natri trong mỗi 5 ml dung dịch uống, tương đương với 1,63% lượng natri tối đa ở người lớn theo khuyến cáo hàng ngày của WHO là 2 g.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ mang thai

Không có dữ liệu về việc sử dụng carbocistein ở phụ nữ mang thai. Không thể rút ra kết luận nào về việc carbocistein có an toàn khi sử dụng trong thai kỳ hay không. Việc sử dụng carbocistein ở phụ nữ mang thai không được khuyến khích, đặc biệt là trong ba tháng đầu.

Phụ nữ cho con bú

Không có dữ liệu sẵn có về sự hiện diện của carbocistein trong sữa mẹ, quá trình tạo sữa hoặc ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh bú sữa mẹ. Không thể rút ra kết luận nào về việc carbocistein có an toàn khi sử dụng trong thời kỳ cho con bú hay không. Không nên sử dụng carbocistein ở phụ nữ đang cho con bú.

Khả năng sinh sản

Không có dữ liệu về khả năng sinh sản

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC

Tương tác thuốc

Không nên kết hợp thuốc tiêu nhầy với thuốc chống ho và/hoặc các chất làm khô dịch tiết (atropinic).

Tương kỵ

Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

https://trungtamthuoc.com/

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Những tác dụng không mong muốn được phân nhóm theo tần suất: rất thường gặp (ADR ≥ 1/10), thường gặp (1/100 ≤ ADR < 1/10), ít gặp (1/1.000 ≤ ADR < 1/100), hiếm gặp (1/10.000 ≤ ADR < 1/1.000), rất hiếm gặp (ADR < 1/10.000), không rõ tần suất (tần suất không ước tính được từ những dữ liệu có sẵn).

Rối loạn tiêu hóa

Rất thường gặp: Đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.

Ít gặp: Nôn mửa

Rất hiếm gặp: Đã có báo cáo về xuất huyết tiêu hóa xảy ra khi điều trị bằng carbocistein.

Rối loạn hệ thống miễn dịch

Hiếm gặp: Đã có báo cáo về phản ứng phản vệ và phát ban do thuốc.

Không rõ tần suất: Phát ban da dị ứng.

Rối loạn da và mô dưới da

Hiếm gặp: Ngứa, phát ban, ban đỏ hoặc sưng mặt.

Không rõ tần suất: Các trường hợp riêng lẻ bị viêm da bọng nước hội chứng Stevens-Johnson đã được báo cáo.

Thông báo cho bác sĩ trong trường hợp có bất kỳ tác dụng không mong muốn nào liên quan tới việc dùng thuốc.

Báo cáo các phản ứng bất lợi nghi ngờ

Việc báo cáo các phản ứng bất lợi nghi ngờ sau khi sản phẩm được cấp phép là rất quan trọng. Nó cho phép theo dõi liên tục tỷ lệ lợi ích/nguy cơ của sản phẩm. Các chuyên gia y tế báo cáo mọi tác dụng phụ bị nghi ngờ về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Triệu chứng

Các triệu chứng thường gặp nhất liên quan đến quá liều là ở đường tiêu hóa (đau dạ dày, buồn nôn và nôn).

Cách xử trí

Nên tiến hành điều trị hỗ trợ và có thể xem xét rửa dạ dày.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược lý: Thuốc tiêu chất nhầy.

Mã ATC: R05CB03.

Cơ chế tác dụng

Carbocistein (S-carboxymetyl L-cystein) là một chất làm tan chất nhầy giúp điều chỉnh sự tiết chất nhầy. Nó hoạt động trong giai đoạn đông đặc của chất nhầy, rất có thể bằng cách phá vỡ các liên kết disulfid của glycoprotein, và do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc khạc đờm.

Hơn nữa, carbocistein có tác dụng lên sự bài tiết phế quản bằng cách giảm độ nhớt của chất nhầy.

https://trungtamthuoc.com/

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Hấp thu

Sau khi uống, carbocistein được hấp thu nhanh chóng; nồng độ tối đa trong huyết tương đạt được sau hai giờ.

Chuyển hóa

Sinh khả dụng của thuốc thấp, ít hơn 10% liều dùng, có thể do chuyển hóa trong lòng ruột và tác dụng chuyển hóa lần đầu qua gan rõ rệt.

Thải trừ

Thời gian bán thải khoảng 2 giờ. Carbocistein và các chất chuyển hóa của nó chủ yếu được đào thải qua thận.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 30 ống x 5 ml dung dịch uống.

Hộp 60 ống x 5 ml dung dịch uống.

Hộp 30 ống x 10 ml dung dịch uống.

Hộp 60 ống x 10 ml dung dịch uống.

Hộp 30 gói x 5 ml dung dịch uống.

Hộp 60 gói x 5 ml dung dịch uống.

Hộp 30 gói x 10 ml dung dịch uống.

Hộp 60 gói x 10 ml dung dịch uống.

Hộp 01 chai 30 ml dung dịch uống, kèm cốc đong chia vạch.

Hộp 01 chai 60 ml dung dịch uống, kèm cốc đong chia vạch.

Hộp 01 chai 90 ml dung dịch uống, kèm cốc đong chia vạch.

Hộp 01 chai 120 ml dung dịch uống, kèm cốc đong chia vạch.

BẢO QUẢN

Nơi khô, không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG

30 tháng (kể từ ngày sản xuất).

06 tháng kể từ lần đầu mở nắp (dạng chai).

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

https://trungtamthuoc.com/

MEDCEN

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam.

Long An, ngày 16 tháng 10 năm 2024

Phó giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Nguyễn Thanh Nguyên