

Hộp CETIRIZIN-US: 90 x 20 x 40 mm



Vỉ CETIRIZIN-US: 86 x 34 mm





CETIRIZIN -US

Viên nén bao phim Cetirizin 10 mg

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cetirizin dihydroclorid 10 mg

Tá dược: Tinh bột ngô, Lactose, Natri starch glycolate, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearate, Aerosil, Hydroxypropylmethyl cellulose 606, Hydroxypropylmethyl cellulose 615, Titan dioxyd, Talc, Polyethylen glycol 6000.

Phân loại

CETIRIZIN -US là thuốc kháng histamin, đối kháng thụ thể H1.

Chỉ định

CETIRIZIN -US được chỉ định trong điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi và viêm mũi dị ứng theo mùa ở trẻ em trên 12 tuổi, viêm kết mạc dị ứng, phù Quincke (sau khi điều trị sốc).

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Liều lượng và cách dùng

Liều dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể theo chỉ định của Bác sĩ điều trị.

Liều dùng thông thường như sau:

Người lớn và trẻ em 6 tuổi trở lên: 1 viên 10 mg duy nhất mỗi ngày.

Không dùng **CETIRIZIN -US** cho người bị suy thận có độ thanh thải creatinin < 30 ml/phút.

Cách dùng

Uống nguyên viên thuốc. Có thể uống trong hoặc ngoài bữa ăn.

Chống chỉ định

- Chống chỉ định ở bệnh nhân có tiền sử dị ứng với cetirizine, hydroxyzin.
- Chống chỉ định cho trẻ em dưới 2 tuổi.
- Chống chỉ định cho trẻ em từ 2 – 6 tuổi bị rối loạn chức năng gan và/ hoặc suy thận.

Thận trọng

- Cần phải điều chỉnh liều trong các trường hợp sau: người suy thận, người đang thẩm phân thận nhân tạo, người suy gan.
- Một số bệnh nhân hơi bị ngầy ngật do dùng quá liều hay do cơ địa. Trong trường hợp này, không dùng khi lái xe hoặc vận hành máy móc.
- Tránh dùng đồng thời **CETIRIZIN -US** với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương do làm tăng tác dụng của các thuốc này.

Phụ nữ mang thai

Mặc dù nghiên cứu trên súc vật không thấy gây quái thai nhưng chưa có nghiên cứu đầy đủ trên phụ nữ mang thai, vì vậy không dùng khi có thai.

Phụ nữ cho con bú

Thuốc được bài tiết vào sữa mẹ, vì vậy không chỉ định cho phụ nữ đang cho con bú.

Lái xe và vận hành máy móc:

Có hiện tượng gây ngủ gà khi dùng thuốc do đó cần thận trọng đối với người lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác thuốc

Chưa thấy tương tác đáng kể với các thuốc khác. Độ thanh thải của cetirizine giảm nhẹ khi uống cùng 400 mg theophyllin.

Tác dụng phụ



Thuốc có những tác dụng phụ nhẹ và thoáng qua như: nhức đầu, hoa mắt, ngủ gật, khô miệng, buồn nôn.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí

Triệu chứng quá liều đã được ghi nhận như ngủ gà ở người lớn và kích động ở trẻ em. Quá liều nghiêm trọng cần gây nôn và rửa dạ dày cùng với các phương pháp hỗ trợ. Chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

Dạng trình bày

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim.

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cơ sở.

Bảo quản

Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY TNHH US PHARMA USA

Địa chỉ : Lô B1- 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08 37908860 – 08 37908861,

Fax: 08 37908856



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

