

110/137



6 SX: 

<https://trungtamthuoc.com/>

Mẫu hộp 10 vỉ (Tỷ lệ 3:4)

COMPOSITION: CINARIZIN 25 mg Excipients q.s.f 1 tablet DOSAGE: INDICATIONS: CONTRAINDICATIONS: See the leaflet inside SIDE EFFECTS: SPECIFICATION: ĐOVN IV. STORAGE: Store in dry place, protect from light, room temperature (20°C - 30°C) KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USE.			
CINNARIZIN Cinarizin 25 mg Hộp 10 vỉ x 25 viên nén GMP - WHO		CINNARIZIN Cinarizin 25 mg Hộp 10 vỉ x 25 viên nén GMP - WHO	
HAIPHARCO SDK (Reg.No): TC (Specifications): ĐOVN IV			
CÔNG THỨC: CINARIZIN 25 mg, Tá dược vừa đủ 1 viên nén LIỀU DÙNG: CHỈ ĐỊNH: CHỐNG CHỈ ĐỊNH: XIN ĐỌC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TÁC DỤNG PHỤ: TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: ĐOVN IV. BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ phòng (20 độ C - 30 độ C) ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng ĐT: 031.3745847 Fax: 031.3745053 Sản xuất tại: Số 1 Tây Sơn - Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng			
CINNARIZIN Cinarizin 25 mg Hộp 10 vỉ x 25 viên nén GMP - WHO			
HAIPHARCO SDK (Reg.No): TC (Specifications): ĐOVN IV			
Số lô SX (Lot.No): Ngày SX (Mfg. Date): HD (Exp. Date):			



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS: *Trần Văn Huyền*

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC - Xin đọc kỹ

CINNARIZIN

Viên nén Cinarizin 25 mg

GMP-WHO

* Thành phần:

- Cinarizin:25,0 mg
- Tá dược (Tinh bột mỳ, Avicel, Bột Talc, Lactose, Tinh bột sắn, Gelatin, Magnesi stearat) vừa đủ 1 viên

* Đặc tính dược lực học:

Cinarizin là thuốc kháng histamin (H_1). Phần lớn những thuốc kháng histamin H_1 cũng có tác dụng chống tiết acetylcholin và an thần. Thuốc có thể chặn các thụ thể ở cơ quan tận cùng của tiền đình và ức chế sự hoạt hóa quá trình tiết histamin và acetylcholin. Cinarizin còn là chất đối kháng calci. Thuốc ức chế sự co tế bào cơ trơn mạch máu bằng cách chặn các kênh calci.

* Đặc tính dược động học:

Sau khi uống, cinarizin đạt được nồng độ đỉnh trong huyết tương sau từ 2 đến 4 giờ. Sau 72 giờ, thuốc vẫn còn đào thải ra nước tiểu. Nửa đời huyết tương của thuốc ở người khỏe mạnh khoảng 3 giờ.

* Chỉ định:

- Rối loạn tiền đình: chóng mặt, ù tai, buồn nôn, nôn trong bệnh Ménière.
- Phòng say tàu xe.

* Liều lượng - cách dùng:

- Cinarizin được dùng đường uống, nên uống sau bữa ăn.
- Phòng say tàu xe: Người lớn uống 1 viên/lần, 2 giờ trước khi đi xe. Sau đó cứ 8 giờ uống 1 viên (nếu cần).
- Rối loạn tiền đình: Người lớn uống 1 viên/lần, 3 lần/ngày.

* Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với cinarizin hay bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Rối loạn chuyển hóa porphyrin.

* Tác dụng không mong muốn (ADR):

- Thường gặp, $ADR > 1/100$: Ngủ gà, rối loạn tiêu hóa, thường có tính chất tạm thời. Tác dụng này sẽ mất đi sau khi ngừng dùng thuốc.
- Ít gặp, $1/1000 < ADR < 1/100$: Nhức đầu, khô miệng, tăng cân; ra mồ hôi, phản ứng dị ứng.
- Hiếm gặp, $ADR < 1/1000$: Triệu chứng ngoại tháp ở người cao tuổi hoặc khi điều trị dài ngày; Giảm huyết áp khi dùng liều cao.

“Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”

*** Quá liều và xử trí:**

- **Triệu chứng:** Ngủ gà, rối loạn tiêu hóa, triệu chứng ngoại tháp ở người già hoặc hạ huyết áp.
- **Xử trí:** Có thể phòng tình trạng ngủ gà và rối loạn tiêu hóa, thường có tính chất tạm thời, bằng cách tăng dần liều tới mức tối ưu. Phải ngừng thuốc khi bệnh nặng hơn hoặc xuất hiện những triệu chứng ngoại tháp khi điều trị dài ngày cho người cao tuổi.

*** Thận trọng:**

- Cinarizin có thể gây đau vùng thượng vị, nên uống thuốc sau khi ăn để giảm kích ứng dạ dày.
- Tránh dùng thuốc dài ngày ở người cao tuổi, vì có thể làm tăng hoặc xuất hiện triệu chứng ngoại tháp đôi khi kết hợp với cảm giác trầm cảm.

*** Thời kỳ mang thai:**

- Chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai khi thật cần thiết.

*** Thời kỳ cho con bú:**

- Thuốc có thể được bài tiết vào sữa mẹ. Chỉ dùng thuốc cho người mẹ đang cho con bú khi lợi ích điều trị đối với người mẹ vượt trội hơn nguy cơ có thể xảy ra đối với trẻ.

*** Người vận hành tàu xe, máy móc:**

- Tránh dùng thuốc cho người đang vận hành tàu xe, máy móc vì thuốc có thể gây ngủ gà.

*** Tương tác thuốc:**

- Rượu, thuốc ức chế thần kinh trung ương, thuốc chống trầm cảm ba vòng nếu dùng đồng thời với cinarizin có thể gây tăng tác dụng an thần của mỗi thuốc nêu trên hoặc của cinarizin.

*** Bảo quản:** Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ phòng từ $(20 \div 30)^{\circ}\text{C}$

*** Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*** Qui cách đóng gói:** 25 viên / vỉ x 50 vỉ / hộp, 25 viên/vỉ x 10 vỉ/ hộp.

*** Tiêu chuẩn áp dụng:** ĐDVN IV

*** SĐK:**



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh

Dùng

69-CTCP
TƯ
IÂN
PHẨM
PHÒNG
IG.T.P HẢI PHÒNG

ĐỂ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 71 Điện Biên Phủ - Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3745647 - Fax: 031.3745053

SẢN XUẤT TẠI:

Số 1 Tây Sơn - Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng