

Thuốc bán theo đơn

CORTIPHARM®

Kem bôi da

**ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

Thành phần của thuốc: Mỗi lọ 8 g kem chứa:

- Dexamethason acetat 4 mg
- Chloramphenicol 160 mg
- Tá dược vừa đủ 1 lọ.

(*Acid stearic, Cetostearyl alcohol, Natri laurylsulfat, Triethanolamin, Glycerin, Ethanol 96%, Nước tinh khiết*)

Dạng bào chế: Thuốc kem bôi da

Chỉ định:

Cortipharm được dùng điều trị các bệnh có đáp ứng với corticoid tại chỗ như:

- Viêm da tiếp xúc, chốc lở, viêm nang lông.
- Các vết trầy nhiễm trùng ngoài da
- Chàm nhiễm khuẩn
- Viêm da tiết bã nhờn.
- Viêm da dị ứng

Cách dùng, liều dùng

Cách dùng: thoa ngoài da

Liều dùng: Sau khi rửa sạch chỗ đau, thoa một lớp mỏng trên da, ngày từ 1 – 4 lần

Không dùng quá 8 ngày cho một đợt điều trị

Chống chỉ định

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Nhiễm trùng nguyên phát do vi khuẩn, siêu vi, nấm hay ký sinh trùng
- Tồn thương có loét
- Mụn trứng cá
- Chứng mũi đỏ
- Viêm da do virus, lao da.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

- Không nên thoa lớp dày, trên diện tích rộng, nơi băng kín, mí mắt, vùng nhũ hoa ở phụ nữ cho con bú.
- Không nên sử dụng cho trẻ sơ sinh và nhũ nhi.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú

Chưa xác định tính an toàn khi dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú. Vì vậy cần thận trọng khi dùng thuốc cho đối tượng này và theo chỉ định của bác sĩ.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc

Không bôi cortipharm đồng thời với các thuốc khác

Tác dụng không mong muốn

- Ngoại ban, ngứa, kích ứng da, giảm sắc tố
- Khi dùng thuốc trên diện rộng, vùng da bị tổn thương hoặc đang bị băng bó, dexamethason có thể hấp thu vào hệ tuần hoàn và gây ra các tác dụng phụ như rối loạn điện giải, rối loạn tiêu hóa, nội tiết, chuyển hóa, da, cơ, xương.

Quá liều và cách xử trí:

- Chưa có ghi nhận về các trường hợp quá liều ở liều điều trị.

Dược lực học:

- Nhóm dược lý: nhóm tác dụng tại chỗ
- Mã ATC : D07CB04
- Dexamethason là fluomethylprednisolon, glucocorticoid tổng hợp, tác dụng bằng cách gắn kết vào thụ thể ở tế bào, chuyển vị vào nhân tế bào và ở đó đã tác động đến 1 số gen được dịch mã. Dexamethason có các tác dụng chính của glucocorticoid là chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Về hoạt lực chống viêm, dexamethason mạnh hơn hydrocortison 30 lần, mạnh hơn prednisolon 7 lần.

- Chloramphenicol là kháng sinh kìm khuẩn, nhưng có tác dụng diệt khuẩn ở nồng độ cao hoặc đối với những vi khuẩn nhạy cảm cao. Chloramphenicol ức chế tổng hợp protein ở những vi khuẩn nhạy cảm bằng cách gắn vào tiểu thể 50S của ribosom.

Dược động học:

- Dạng kem thoa ngoài da, có tác dụng tại chỗ.
- Sự hấp thu thuốc có thể tăng lên khi niêm mạc bị viêm hoặc tổn thương.

Quy cách đóng gói:

Hộp 1 lọ x 8 gam

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: TCCS



Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC S.PHARM
Đường D1 Lô G, khu công nghiệp An Nghiệp,
Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng