


MẪU NHÃN DỰ KIẾN

(SCBS LẦN 2)

BỘ 343/145
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12 / 6 / 2014

I. Nhãn hộp: (chai 24ml)



II. Nhãn chai

A. Mặt 1

B. Mặt 2



V. Nhãn hộp: (chai 6ml)



VI. Nhãn chai



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:

DẦU GIÓ MEKOPHAR

CÔNG THỨC: cho 1 chai

Thành phần	Chai 6 ml	Chai 10 ml	Chai 24 ml
- Eucalyptol	2,1 g	3,5g	8,4 g
- Menthol	2,34 g	3,9 g	9,36 g
- Methyl salicylate	0,258 g	0,43 g	1,032 g
- Camphor	0,102 g	0,17 g	0,408 g

(Tinh dầu Bouquet, Màu xanh Chlorophyll, Dầu Paraffin, Ethanol 96%)

TÍNH CHẤT:

- Eucalyptol: sát trùng, giảm viêm, kích thích tiêu hóa.
- Camphor: sát trùng, giảm viêm ngứa, giảm đau.
- Menthol: kháng khuẩn, giảm đau.
- Methyl salicylate: có tác dụng giảm triệu chứng các rối loạn đường hô hấp trên.

CHỈ ĐỊNH:

Phòng và trị cảm cúm, sổ mũi, nghẹt mũi, ho tức ngực, đau bụng, nhức mỏi, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, côn trùng đốt, đau nhức ở cơ bắp và khớp xương, bong gân, sưng.

CÁCH DÙNG:

Xoa ngoài da tại chỗ đau, 3-4 lần/ngày.

- Cảm cúm, sổ mũi, nghẹt mũi: xoa dầu hai bên thái dương, cổ, sau gáy, mũi.
- Nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn: xoa dầu hai bên thái dương, cổ, nhân trung, mũi.
- Ho tức ngực: xoa dầu trước ngực, cổ và sau lưng.
- Ăn không tiêu, đau bụng: xoa dầu vùng bụng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG:

- Không thoa lên da mặt, thóp, mũi trẻ nhỏ.
- Cần thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân có tiền căn dị ứng với thuốc hay mỹ phẩm như sản ngứa, nhiễm độc da.
- Không bôi lên niêm mạc, vùng mắt, vết thương hở,...
- Không nên bôi trên diện rộng, toàn thân.
- Nếu dầu dính vào mắt, rửa kỹ với nước hay nước ấm.
- Ngưng sử dụng dầu nếu bị sưng, ngứa, kích ứng kéo dài.

THỜI KỲ MANG THAI – CHO CON BÚ:

Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

TÁC DỤNG PHỤ:

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sĩ về những thuốc đang sử dụng.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TRÌNH BÀY:

Chai 6ml. Hộp 1 chai.

Chai 10 ml. Hộp 1 chai.

Chai 24 ml. Hộp 1 chai.

Sản xuất theo TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Giám Đốc Chất Lượng Công Ty Đăng Ký & Sản Xuất Thuốc



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng



DS. Nguyễn Thùy Vân

