

GMP WHO

GMP WHO

Delinar

Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ
Các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung

Hộp 03 vỉ x
10 viên nén bao phim



ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THUỐC

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc TCCS

SỐ ĐĂNG KÝ:



Sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô đất CN1-C8B-3 KCN công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, x.

Thạch Hòa, h.Thạch Thất, Tp. Hà Nội.

Tel: 024.3668.6938

Fax: 84-24.36686797

LSX:

NSX:

HSD:



8 936207 740550

GMP WHO

Delinar

Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ
Các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung

Hộp 03 vì x
10 viên nén bao phim



GMP WHO

Delinar

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim có chứa:

Thành phần dược chất:
Cao khô rễ cây móng quỳ (3:1)
(*Harpagophyti extractum siccum*)

480 mg

Thành phần tá dược: vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:
Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ, các chứng đau nhức cơ và khớp nội chung.

Dùng thuốc trong khoảng thời gian 4 tuần. Sau khoảng thời gian này, nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

Người lớn: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1-2 viên.

Không dùng cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống.

Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 4 tuần sử dụng, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống

Người có tiền sử viêm tụy.
Người bị loét dạ dày tá tràng.

Bệnh nhân bị các bệnh lý di truyền hiếm gặp là lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose.

LƯU Ý: Để xa tầm tay trẻ em.
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



GMP WHO

Delinar

GMP WHO

Delinar

Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ
Các chứng đau nhức cơ và khớp nối chung

Hộp 06 vỉ x
10 viên nén bao phim



ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THUỐC:
Bảo quản nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: TCCS
SỐ ĐĂNG KÝ:



Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI
Địa chỉ: Lô đất CN1-08B-3 KCN công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, x.
Thạch Hòa, h.Thạch Thất, Tp. Hà Nội.
Tel: 024.3668.6938
Fax: 84-24.36686797

LSX:
NSX:
HSD:




GMP WHO

Delinar

Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ
Các chứng đau nhức cơ và khớp nối chung

Hộp 06 vỉ x
10 viên nén bao phim



GMP WHO


Delinar

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim có chứa:

Thành phần dược chất: Cao khô rễ cây móng quý (3:1) (<i>Horopogophyti extractum sicum</i>)	480 mg
Thành phần tá dược: vừa đủ 1 viên	

CHỈ ĐỊNH:
Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ, các chứng đau nhức cơ và khớp nối chung.
Dùng thuốc trong khoảng thời gian 4 tuần. Sau khoảng thời gian này, nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:
Người lớn: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1-2 viên.
Không dùng cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống.
Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 4 tuần sử dụng, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống.
Người có tiền sử viêm tụy.
Người bị loét dạ dày tá tràng.
Bệnh nhân bị các bệnh lý di truyền hiếm gặp không dung nạp galactose, thiếu hụt men lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose.
LƯU Ý: Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.





GMP WHO

Delinar

Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ
Các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung



Hộp 1 lọ
x 30 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim có chứa:	
Thành phần được chất: Cao khô rễ cây móng quỷ (3:1) (<i>Harpagophytum extractum siccum</i>)	480 mg
Thành phần tá dược: vừa đủ 1 viên	

CHỈ ĐỊNH:

Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung.
Dùng thuốc trong khoảng thời gian 4 tuần. Sau khoảng thời gian này, nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

Người lớn: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1-2 viên.
Không dùng cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống.

Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 4 tuần sử dụng, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Người mắc chứng rối loạn chức năng thận nặng của thuốc.
Trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống.
Người có tiền sử viêm tụy.
Người bị loét dạ dày tá tràng.
Bệnh nhân bị các bệnh lý di truyền hiếm gặp không dung nạp galactose, thiếu hụt men lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose.


LƯU Ý:

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

GMP WHO

Delinar

Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ
Các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung



Hộp 1 lọ
x 30 viên nén bao phim

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN
CHẤT LƯỢNG THUỐC.

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: TCCS

SỐ ĐĂNG KÝ:



CVI PHARMA
Nâng tầm chất lượng

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI

Địa chỉ Lô đất CN: 08B-3 KCN công nghệ cao 1 - Khu

công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, x

Thạch Hòa, h.Thạch Thất, Tp. Hà Nội.

Tel: 024.3668.6938

Fax: 04-24.36686797

LSX:

NSX:

HSD:



8 936207 740574



THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim có chứa:	
Thành phần dược chất: Cao khô rễ cây móng quỳ (3:1) (<i>Harpagophytum extractum siccum</i>)	480 mg
Thành phần tá dược: vừa đủ 1 viên	

CHỈ ĐỊNH:
Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ, các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung.
Dùng thuốc trong khoảng thời gian 4 tuần. Sau khoảng thời gian này, nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:
Người lớn: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1-2 viên.
Không dùng cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống.
Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 4 tuần sử dụng, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống.
Người có tiền sử viêm tụy.
Người bị loét dạ dày tá tràng.
Bệnh nhân bị các bệnh lý di truyền hiếm gặp không dung nạp galactose, thiếu hụt men lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose.

GMP WHO

Delinar

Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ
Các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung



viên nén bao phim

LƯU Ý: Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THUỐC.
Bảo quản nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: TCCS
SỐ ĐĂNG KÝ:

LSX:
NSX:
HSD:

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI
Địa chỉ: Lô đất CN1-08B-3 KCN công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, x. Thạch Hòa, h.Thạch Thất, Tp. Hà Nội.
Tel: 024.3668.6938
Fax: 84-24.36686797






GMP WHO

Delinar

Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ
Các chứng đau nhức cơ và khớp nổi chung



Hộp 1 lọ
x 60 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim có chứa:	
Thành phần dược chất: Cao khô rễ cây móng quỷ (3:1) (<i>Harpagophytum extractum sicum</i>)	480 mg
Thành phần tá dược: vừa đủ 1 viên	

CHỈ ĐỊNH:

Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ, các chứng đau nhức cơ và khớp nổi chung.

Dùng thuốc trong khoảng thời gian 4 tuần. Sau khoảng thời gian này, nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

Người lớn: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1-2 viên.

Không dùng cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống.

Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 4 tuần sử dụng, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống.

Người có tiền sử viêm tụy.

Người bị loét dạ dày tá tràng.

Bệnh nhân bị các bệnh lý di truyền hiếm gặp không dung nạp galactose, thiếu hụt men lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose.

LƯU Ý: Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

GMP WHO

Delinar

Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ
Các chứng đau nhức cơ và khớp nổi chung



Hộp 1 lọ
x 60 viên nén bao phim

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THUỐC.

Bao quản nơi khô dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: TCCS

SỐ ĐĂNG KÝ:



Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI

Địa chỉ: Lô đất CN1-08B-3 KCN công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, x. Thạch Hòa, h.Thạch Thất, T.p. Hà Nội.

Tel: 024.3668.6938

Fax: 04-24.3668797

LSX:

NSX:

HSD:



8 936207 740574



THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim có chứa:

Thành phần dược chất:
Cao khô rễ cây móng quý (3:1)
(*Harpagophyti extractum siccum*)

480 mg

Thành phần tá dược: vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ, các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung.

Dùng thuốc trong khoảng thời gian 4 tuần. Sau khoảng thời gian này, nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

Người lớn: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1-2 viên.

Không dùng cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống.

Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 4 tuần sử dụng, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống.

Người có tiền sử viêm tụy.

Người bị loét dạ dày tá tràng.

Bệnh nhân bị các bệnh lý di truyền hiếm gặp không dung nạp galactose, thiếu hụt men lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose.

GMP WHO

Delinar

Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ
Các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung

60

viên nén bao phim



LƯU Ý: Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THUỐC.

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: TCCS

SỐ ĐĂNG KÝ:

LSX:

NSX:

HSD:


Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MỸ PHẨM CVI

Địa chỉ: Lô đất CN1-08B-3 KCN công nghệ
cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29
đại lộ Thăng Long, x. Thạch Hòa, h. Thạch

Thất Tp. Hà Nội.

Tel: 024.3668.6938

Fax: 84-24.36686797



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC DELINAR

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

1. Thành phần: Mỗi viên nén bao phim có chứa:

Thành phần dược chất: Cao khô rễ cây móng quỳ (3:1)
(*Harpagophyti extractum siccum*)

480 mg

Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Lactose monohydrat,
Povidon K30, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Bột Talc,
Opadry AMB II Clear, Idacol Iron oxide Red

Vừa đủ 1 viên

2. Dạng bào chế:

- Dạng bào chế: Viên nén bao phim.
- Mô tả: Viên nén bao phim hình oval, màu đỏ nâu, hai mặt lõm, cạnh và thành viên lành lặn.

3. Chỉ định:

- Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ, các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung.
- Dùng thuốc trong khoảng thời gian 4 tuần. Sau khoảng thời gian này, nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn, vui lòng tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc chuyên gia y tế.

4. Liều dùng, cách dùng:

- Người lớn: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1-2 viên.
- Không dùng cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống.
- Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 4 tuần sử dụng, vui lòng tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc chuyên gia y tế.

5. Chống chỉ định:

- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống.
- Người có tiền sử viêm tụy.
- Người bị loét dạ dày tá tràng.
- Bệnh nhân bị các bệnh lý di truyền hiếm gặp không dung nạp galactose, thiếu hụt men lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc.

- Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, người tăng huyết áp, người viêm dạ dày.
- Người bị sỏi mật, các vấn đề tim mạch cần tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi dùng thuốc.
- Nếu đau khớp kèm theo các triệu chứng sưng, nóng, đỏ khớp, cần tham khảo ý kiến của bác sỹ.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Do chưa có báo cáo về việc dùng thuốc an toàn trên phụ nữ có thai và cho con bú. Không khuyến cáo dùng thuốc này trên phụ nữ mang thai và cho con bú.

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Không có nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc đối với khả năng lái xe, vận hành máy móc.



9. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Chưa có báo cáo về tính tương tác, tương kỵ của thuốc.

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với thuốc khác.

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc.

Các triệu chứng nhẹ về đường tiêu hóa (ợ chua, đầy hơi, tiêu chảy, buồn nôn và nôn), nhức đầu, chóng mặt, dị ứng da.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

11. Quá liều và cách xử trí:

Chưa có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Nếu có các triệu chứng khi dùng thuốc quá liều, theo dõi tích cực để có biện pháp xử trí kịp thời.

12. Quy cách đóng gói.

- Hộp 3 vỉ $\times$ 10 viên và tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 6 vỉ $\times$ 10 viên và tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 lọ $\times$ 30 viên và tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 lọ $\times$ 60 viên và tờ hướng dẫn sử dụng.

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng thuốc.

- Bảo quản nơi khô, dưới 30°C , tránh ánh sáng.
- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: TCCS.

14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI**


Lô đất CN1-08B-3 Khu công nghiệp công nghệ cao 1-Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Tel: 024.3668.6938

Fax: 84-24.36686797

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trường Thành

