



DES Loratadin VACO


Desloratadin 5mg

Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

DES Loratadin VACO

Kháng Histamin

Desloratadin 5mg



24 giờ

Giảm các triệu chứng

- ✓ VIÊM MŨI DỊ ỨNG
- ✓ MÀY ĐAY



10

viên nén bao phim



Để xa tầm tay của trẻ em
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX

SDK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

film coated tablets

10



URTICARIA

ALLERGIC RHINITIS

Relieve symptoms

Desloratadine 5mg

Anti Histamine

DES Loratadin VACO

Bof of 1 blister x 10 film coated tablets

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
 Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
 Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

THÀNH PHẦN
 Desloratadin 5mg
 Tá dược v.d 1 viên nén bao phim
 CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ
 hướng dẫn sử dụng kèm theo.
 CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO



MÃ QR CODE | MÃ SỐ MÃ VẠCH

Hộp 2 vì x 10 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX
 SĐK :
 Số lô SX:
 Ngày SX:
 HD :

20

film coated tablets



24 hours



DES Loratadin VACO

Bof of 2 blisters x 10 film coated tablets

24 hours



Desloratadine 5mg

Relieve symptoms

ALLERGIC RHINITIS

URTICARIA

Anti Histamine

Vacopharm

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khanh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

THÀNH PHẦN

Desloratadin 5mg

Tà dược v.d. 1 viên nên bao phim

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

MÃ QR CODE	MÃ SỐ MÃ VẠCH
------------	---------------

11
CỔ P
VAC
2. V

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

DESLOTATADIN VACO

Desloratadin 5mg

Kháng Histamin

Giảm các triệu chứng

✓ VIÊM MŨI DỊ ỨNG

✓ MÀY ĐAY

24 giờ

100 viên nén bao phim

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

DESLOTATADIN VACO

Desloratadin 5mg

Kháng Histamin

Desloratadin 5mg

Giảm các triệu chứng

✓ VIÊM MŨI DỊ ỨNG

✓ MÀY ĐAY

24 giờ

100 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

MÃ QR CODE
MÃ SỐ MÃ VẠCH

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX
SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

DESLOTATADIN VACO

Desloratadin 5mg

Anti Histamine

Relieve symptoms

✓ ALLERGIC RHINITIS

✓ URTICARIA

100 film coated tablets

DESLOTATADIN VACO

Desloratadin 5mg

Anti Histamine

Relieve symptoms

✓ ALLERGIC RHINITIS

✓ URTICARIA

100 film coated tablets

THÀNH PHẦN
Desloratadin 5mg
Tà được v.d ... 1 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử
dùng kèm theo.
CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Sân xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Hộp 1 vì x 15 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C


HD :

MÃ QR CODE	MÃ SỐ MÃ VẠCH
------------	---------------

THANH PHAN
Desloratadin 5mg
Tà được v.d ... 1 viên nên bao phim.
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.


DES LorATADIN VACO
 Desloratadin 5mg

Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim



24 giờ

DES LorATADIN VACO
Kháng Histamin Desloratadin 5mg

Giảm các triệu chứng
 ✓ **VIÊM MŨI DỊ ỨNG**
 ✓ **MÀY ĐAY**




30
 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX
 SĐK :
 Số lô SX:
 Ngày SX:
 HD :


DES LorATADIN VACO
 Anti Histamine
 Desloratadine 5mg

Bof of 2 blisters x 15 film coated tablets



24 hours

30
 film coated tablets

Relieve symptoms
 ALLERGIC RHINITIS
 URTICARIA



MÃ QR CODE MÃ SỐ MÃ VẠCH

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
 Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
 Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

THÀNH PHẦN
 Desloratadin 5mg
 Tã được v.đ. 1 viên nén bao phim
 CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ
 hướng dẫn sử dụng kèm theo.
 CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

DES LorATADIN VACO

Desloratadin 5mg

Hộp 100 vỉ x 15 viên
nén bao phim



THÀNH PHẦN

Desloratadin 5mg

Tá dược v.đ ... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG

CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX

SDK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

MÃ QR CODE



Box of 10 blisters x 20 film coated tablets

DESORATADIN VACO

Anti Histamine Desloratadine 5mg

Relieve symptoms

- ✓ ALLERGIC RHINITIS
- ✓ URTICARIA

 **24 hours** **200**
film coated tablets



Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

MÃ QR CODE

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX

11
CỔ
CỔ PH
VAC
vac

DES LorATADIN VACO

Desloratadin 5mg

Hộp 50 vỉ x 20 viên
nén bao phim



THÀNH PHẦN

Desloratadin 5mg

Tá dược v.đ ... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG

CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

MÃ QR CODE

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT: (0272) 3.829.311 • Fax: (0272) 3.822.244

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX

SDK :

Số lô SX:


Ngày SX:

HD :



2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ



Nhãn chai 100 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Desloratadin 5mg
Tá dược v.d... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (0272) 3.829.311 • Fax: (0272) 3.822.244
Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

chai 100 viên nén bao phim

DESLOTRATADIN VACO

Kháng Histamin Desloratadin 5mg

Giảm các triệu chứng
✓ **VIÊM MŨI DỊ ỨNG**
✓ **MÀY ĐAY**

24 giờ

100
viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX

SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

MST: 110012319

CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC
VACOPHARM

www.vacopharm.com

MÃ QR CODE

MÃ SỐ MÃ VẠCH

Nhãn chai 200 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Desloratadin 5mg
Tá dược v.d... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (0272) 3.829.311 • Fax: (0272) 3.822.244
Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

chai 200 viên nén bao phim

DESLOTRATADIN VACO

Kháng Histamin Desloratadin 5mg

Giảm các triệu chứng
✓ **VIÊM MŨI DỊ ỨNG**
✓ **MÀY ĐAY**

24 giờ

200
viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX

SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

MST: 110012319

CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC
VACOPHARM

www.vacopharm.com

MÃ QR CODE

MÃ SỐ MÃ VẠCH

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 500 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Desloratadin 5mg
Tá dược v.đ ... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (0272) 3.829.311 • Fax: (0272) 3.822.244
Sân xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

chai 500 viên nén bao phim

DES LorATADIN VACO

Kháng Histamin Desloratadin 5mg

Giảm các triệu chứng
✓ VIÊM MŨI DỊ ỨNG
✓ MÀY ĐÁY

24 giờ


500
viên nén bao phim

vacopharm

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

MÃ QR CODE

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX
SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :



Nhãn chai 1000 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Desloratadin 5mg
Tá dược v.đ ... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (0272) 3.829.311 • Fax: (0272) 3.822.244
Sân xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

chai 1000 viên nén bao phim

DES LorATADIN VACO

Kháng Histamin Desloratadin 5mg

Giảm các triệu chứng
✓ VIÊM MŨI DỊ ỨNG
✓ MÀY ĐÁY

24 giờ

1000
viên nén bao phim

vacopharm

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

MÃ QR CODE

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX
SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

DESLORATADIN VACO

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Thành phần được chất

Desloratadine

5mg

Tá dược v.đ

1 viên nén bao phim

(Thành phần tá dược: Polyvinyl pyrrolidon K30, lactose monohydrat, tinh bột sắn, natri lauryl sulfat, natri starch glycolat, talc, magnesi stearat, hydroxypropyl methylcellulose 615, titan dioxyd, màu erythrosine lake, dầu thầu dầu, acesulfam kali, bột hương vị dâu)

Dạng bào chế: Viên nén hình oval, bao phim màu hồng, một mặt trơn, một mặt có vạch, cạnh và thành viên lằn lặn (kí hiệu trên mặt viên được khắc trên chày, không sử dụng mực in).

Chỉ định

Viêm mũi dị ứng.

Mày đay mạn tính vô căn.

Cách dùng, liều dùng

Dùng đường uống, một lần trong ngày, không bị ảnh hưởng bởi thức ăn.

Viêm mũi dị ứng liên tục (có triệu chứng ít hơn 4 ngày mỗi tuần hoặc ít hơn 4 tuần) nên đánh giá bệnh sử của bệnh nhân và ngưng điều trị sau khi các triệu chứng được giải quyết và tiếp tục điều trị khi tái xuất hiện. Trong viêm mũi dị ứng dai dẳng (xuất hiện các triệu chứng trong 4 ngày hoặc hơn mỗi tuần và trong hơn 4 tuần), tiếp tục điều trị cho bệnh nhân trong thời gian phơi nhiễm dị ứng.

Người lớn và trẻ em trên 11 tuổi: 1 viên / 1 lần/ngày.

Trẻ em từ 6-11 tuổi: ½ viên /1 lần/ngày.

Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng thuốc có dạng bào chế khác thích hợp với liều từ 1-1,25mg/lần/ngày.

Với bệnh nhân suy gan hoặc suy thận, liều dùng của desloratadine được khuyến cáo là 5mg (1 viên), uống cách ngày.

Khi một lần quên không dùng thuốc: Hãy uống càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu gần với liều kế tiếp, hãy bỏ qua liều đã quên và uống liều kế tiếp vào thời điểm như kế hoạch, không dùng bù liều đã quên.

Chống chỉ định

Mẫn cảm với desloratadine, loratadine, hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng thuốc

Thuốc có chứa tá dược màu, có thể gây dị ứng.

Những bệnh nhân không dung nạp được galactose, thiếu hụt enzym lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose thì không nên dùng thuốc này.

Quá liều và nhiễm độc (bao gồm cả tử vong) đã được báo cáo ở trẻ nhỏ dưới 2 tuổi dùng các chế phẩm không kê đơn chứa thuốc kháng histamin, giảm ho, long đờm và chống xung huyết mũi đơn thuần hoặc phối hợp để giảm các triệu chứng của đường hô hấp trên. Cũng chưa có bằng chứng cho thấy hiệu quả rõ ràng của các chế phẩm này ở độ tuổi dưới 2 tuổi và liều thích hợp cũng chưa được công bố. Vì vậy, nên thận trọng khi dùng các thuốc không kê đơn (đơn thuần hoặc phối hợp) chứa thuốc kháng histamin, giảm ho, long đờm và chống xung huyết mũi để giảm ho, giảm triệu chứng cảm cúm cho trẻ dưới 2 tuổi.

Mặc dù hiếm gặp ngủ gà ở các thuốc kháng histamin thế hệ 2 hơn thế hệ 1, song có thể xuất hiện ở một số bệnh nhân, do đó phải thận trọng đối với những người lái xe hoặc vận hành máy. Uống rượu cũng nên tránh trong khi dùng thuốc.

Đôi khi có những báo cáo về co giật xuất hiện ở những bệnh nhân dùng thuốc kháng histamin, do đó cũng cần thận trọng khi dùng desloratadine thải trừ qua thận dưới dạng chất chuyển hóa còn hoạt tính, do đó cần lưu ý giảm liều trên bệnh nhân suy gan. Tương tự, cũng cần giảm liều desloratadine trên bệnh nhân suy gan.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Mặc dù các nghiên cứu trên động vật cho thấy desloratadine không gây quái thai, song cũng nên thận trọng khi dùng desloratadine cho phụ nữ mang thai.

Desloratadine qua được sữa mẹ, vì thế không khuyến cáo sử dụng desloratadine cho phụ nữ đang cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Thận trọng vì thuốc có thể gây buồn ngủ.

Tương tác thuốc

Desloratadine làm tăng nồng độ và tăng tác dụng của rượu, thuốc kháng cholin, thuốc ức chế TKTW, thuốc ức chế chọn lọc thu hồi serotonin.

Nồng độ và tác dụng của desloratadine có thể tăng lên bởi droperidol, hydroxyzin, chất ức chế p-glycoprotein, pramlintid.

Desloratadine làm giảm nồng độ và giảm tác dụng của thuốc ức chế acetylcholinesterase, benzylpeniciloyl polylysin, betahistin, amphetamin, thuốc cảm ứng P-glycoprotein.

Thức ăn không ảnh hưởng đến sinh khả dụng của desloratadine.

Có tiềm năng tương tác dược động học của desloratadine với các thuốc ảnh hưởng đến enzym chuyển hóa ở microsom gan như azithromycin, cimetidin, erythromycin, fluoxetin, ketoconazol. Tuy nhiên, không có những thay đổi quan trọng nào về ECG cũng như triệu chứng lâm sàng, thay đổi chức năng sống, hay tác dụng phụ nào được ghi nhận.

Tác dụng không mong muốn (ADR)

Tần suất tác dụng không mong muốn ước tính được phân loại theo quy ước sau đây: Rất thường gặp ($ADR \geq 1/10$), Thường gặp ($1/100 \leq ADR < 1/10$), Ít gặp ($1/1.000 \leq ADR < 1/100$), Hiếm gặp ($1/10.000 \leq ADR < 1/1.000$), Rất hiếm gặp ($ADR < 1/10.000$), Không rõ (không ước tính được từ dữ liệu sẵn có).

Nhóm cơ quan	Tần suất	Các biểu hiện
Chuyển hóa và dinh dưỡng	Không rõ	Tăng thêm ăn
Tâm thần	Rất hiếm gặp	Áo giác
	Không rõ	Rối loạn hành vi, hung hăng
Hệ thần kinh	Thường gặp	Đau đầu
	Rất hiếm gặp	Chóng mặt, buồn ngủ, mất ngủ, hiệu động thái quá, co giật
Tim mạch	Rất hiếm gặp	Nhịp tim nhanh, đánh trống ngực
	Không rõ	Kéo dài khoảng QT
Đường tiêu hóa	Thường gặp	Khô miệng
	Rất hiếm gặp	Đau bụng, buồn nôn, nôn, khó tiêu, tiêu chảy
Gan mật	Rất hiếm gặp	Tăng men gan, tăng bilirubin, viêm gan
	Không rõ	Vàng da
Da và mô dưới da	Không rõ	Sợ ánh sáng
Xương, mô liên kết	Rất hiếm gặp	Đau cơ
Toàn thân	Thường gặp	Mệt mỏi
	Rất hiếm gặp	Phản ứng quá mẫn (như sốc phản vệ, phù mạch, khó thở, ngứa, phát ban và nổi mề đay)
	Không rõ	Suy nhược
Đang nghiên cứu	Không rõ	Tăng cân

Hướng dẫn cách xử trí ADR

Sử dụng desloratadine với liều thấp nhất mà có hiệu quả.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí

Chưa phát hiện ra những thay đổi lâm sàng đáng kể khi dùng desloratadine tới liều 45mg/ngày (gấp 9 lần liều điều trị). Trong trường hợp quá liều, điều trị như các biện pháp điều trị thông thường khác, bao gồm giảm hấp thu và điều trị triệu chứng. Desloratadine không được

đào thải bằng đường thẩm phân phúc mạc.

Quy cách đóng gói

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ Al-PVC, hộp 1 vỉ x vỉ 10 viên
2	Ép vỉ Al-PVC, hộp 2 vỉ x vỉ 10 viên
3	Ép vỉ Al-PVC, hộp 10 vỉ x vỉ 10 viên
4	Ép vỉ Al-PVC, hộp 1 vỉ x vỉ 15 viên
5	Ép vỉ Al-PVC, hộp 2 vỉ x vỉ 15 viên
6	Ép vỉ Al-PVC, hộp 100 vỉ x vỉ 15 viên

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
7	Ép vỉ Al-PVC, hộp 10 vỉ x vỉ 20 viên
8	Ép vỉ Al-PVC, hộp 50 vỉ x vỉ 20 viên
9	Đóng chai 100 viên
10	Đóng chai 200 viên
11	Đóng chai 500 viên
12	Đóng chai 1000 viên

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng: 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX

Tên, địa chỉ của cơ sở đăng ký và sản xuất




Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Sản xuất tại: Km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân
Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Long An, ngày 02 tháng 8 năm 2023

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thu

