



NỘI DUNG MẪU NHÃN DETOCYN 250 - HỘP 3 VỈ

WHO-GMP

DETOCYN 250

LỢI MẬT - CHỈ THỐNG

Traphaco

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN:

Cho 1 viên nang cứng:

Cao khô Actisô EP.....250 mg

(Hàm lượng acid chlorogenic ≥ 0,6%)

Tô được.....Vừa đủ

TÁC DỤNG:

Lợi mật, chỉ thống

CHỈ ĐỊNH:

Tiêu hóa kém, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật

SDK:

Lô SX:

NSX:

HD

DETOCYN 250

LỢI MẬT - CHỈ THỐNG

DETOCYN 250

WHO-GMP

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

- Uống 2-3 viên/lần x 2 lần/ngày. Dùng trước bữa ăn.

Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng bệnh.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Chống chỉ định và các thông tin khác:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

TIÊU CHUẨN:

TCSS

ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Cơ sở đăng ký và sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên

Mã số mã vạch

NỘI DUNG MẪU NHÃN DETOCYN 250 - HỘP 5 VỈ



WHO-GMP

DETOCYN 250

LỢI MẬT - CHỈ THỐNG

Traphaco

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN:

Cho 1 viên nang cứng:
Cao khô Actiô EP.....250 mg
(Hàm lượng acid chlorogenic ≥ 0.6%)
Tá dược.....Vừa đủ

TÁC DỤNG:

Lợi mật, chỉ thống

CHỈ ĐỊNH:

Tiêu hóa kém, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật

SDK:

Lô SX:

NSX:

HD

DETOCYN 250

LỢI MẬT - CHỈ THỐNG

DETOCYN 250

WHO-GMP

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

- Uống 2-3 viên/lần x 2 lần/ngày. Dùng trước bữa ăn.
Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng bệnh.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Cơ sở đăng ký và sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên

Mã số mã vạch



NỘI DUNG MẪU NHÃN DETOCYN 250 - HỘP 10 VĨ

WHO - GMP

DETOCYN 250

LỢI MẬT - CHỈ THỐNG

Traphaco

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN:

Cho 1 viên nang cứng:
Cao khô Actiô EP.....250 mg
(Hàm lượng acid chlorogenic $\geq 0,6\%$)
Tá dược.....Vừa đủ

TÁC DỤNG:
Lợi mật, chỉ thống

CHỈ ĐỊNH:
Tiêu hóa kém, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật

SĐK:
Lô SX:
NSX:
HD

DETOCYN 250

LỢI MẬT - CHỈ THỐNG

DETOCYN 250

WHO - GMP

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

- Uống 2-3 viên/lần x 2 lần/ngày. Dùng trước bữa ăn.
Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng bệnh.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Cơ sở đăng ký và sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên

Mã số mã vạch

NỘI DUNG MẪU TÚI NHÔM DETOCYN 250
(3 vỉ x 10 viên nang cứng)

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG: - Uống 2-3 viên/lần x 2 lần/ngày. Dùng trước bữa ăn. Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy tình trạng bệnh.	DET CYN 250 Traphaco CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO	3 vỉ x 10 viên nang cứng DET CYN 250 Traphaco TRAPHACO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY
	DET CYN 250 Traphaco CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO	DET CYN 250 Traphaco TRAPHACO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY
	DET CYN 250 Traphaco TRAPHACO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY	CHI DÙNG: Lợi nhuận, chi thẳng TÁC DÙNG: Tiêu hóa kém, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật

TRAPHACO
CÔNG NGHỆ CAO
CỔ PHẦN
CÔNG TY T. C. P
H. VAN LAM - T. HUNG YEN
M.S.D.N: 0060255402

LIỆU DÙNG, CÁCH DÙNG: - Uống 2-3 viên/lần x 2 lần/ngày. Dùng trước bữa ăn. Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy tình trạng bệnh.	DET CYN 250 Traphaco CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO	5 vỉ x 10 viên nang cứng DET CYN 250 Traphaco TRAPHACO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY
LIỆU DÙNG, CÁCH DÙNG: - Uống 2-3 viên/lần x 2 lần/ngày. Dùng trước bữa ăn. Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy tình trạng bệnh.	DET CYN 250 Traphaco CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO	5 vỉ x 10 viên nang cứng DET CYN 250 Traphaco TRAPHACO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY
LIỆU DÙNG, CÁCH DÙNG: - Uống 2-3 viên/lần x 2 lần/ngày. Dùng trước bữa ăn. Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy tình trạng bệnh.	DET CYN 250 Traphaco CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO	5 vỉ x 10 viên nang cứng DET CYN 250 Traphaco TRAPHACO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY
LIỆU DÙNG, CÁCH DÙNG: - Uống 2-3 viên/lần x 2 lần/ngày. Dùng trước bữa ăn. Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy tình trạng bệnh.	DET CYN 250 Traphaco CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO	5 vỉ x 10 viên nang cứng DET CYN 250 Traphaco TRAPHACO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY

LIỆU DÙNG, CÁCH DÙNG: - Uống 2-3 viên/lần x 2 lần/ngày. Dùng trước bữa ăn. Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy tình trạng bệnh. Traphaco CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO	DET CYN 250 Traphaco CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO DET CYN 250 Traphaco CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO DET CYN 250 Traphaco TRAPHACO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY	DET CYN 250 Traphaco TRAPHACO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY DET CYN 250 Traphaco TRAPHACO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY DET CYN 250 Traphaco TRAPHACO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY
		DET CYN 250 Traphaco TRAPHACO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY DET CYN 250 Traphaco TRAPHACO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY DET CYN 250 Traphaco TRAPHACO HIGH TECH JOINT STOCK COMPANY

Toa hướng dẫn sử dụng thuốc



DETOCYN 250

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Thành phần: Cho 1 viên nang cứng:

Thành phần hoạt chất:

Cao khô Actisô EP (*Extractum Cynarae siccus*)
(Hàm lượng acid chlorogenic $\geq 0,6\%$)

Hàm lượng

250 mg

Thành phần tá dược: Tinh bột sắn, Magnesi stearat, Colloidal

silicon dioxit, Methylparaben, Propylparaben, Vỏ nang gelatin

Vừa đủ

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Mô tả: Viên nang cứng màu xanh

Tác dụng: Lợi mật, chỉ thống.

Chỉ định: Tiêu hóa kém, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật.

Liều dùng, cách dùng:

Uống 2-3 viên/lần x 2 lần/ngày. Dùng trước bữa ăn.

Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng bệnh.

Chống chỉ định:

- Các bệnh nhân dị ứng với các thành phần của thuốc, đặc biệt các bệnh nhân nhạy cảm với thực vật họ Cúc Asteraceae, Methylparaben và Propylparaben.
- Các trường hợp đường mật tắc nghẽn.
- Người tiểu nhạt, tỳ vị hư hàn, phụ nữ có thai.

Cảnh báo và thận trọng: Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không sử dụng cho phụ nữ có thai.
- Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú, tránh sử dụng liều cao trong thời gian dài.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

- Không ảnh hưởng.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.



Handwritten signature

Quá liều và cách xử trí:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Trường hợp sử dụng thuốc quá liều, tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, PVC-Nhôm; Hộp 5 vỉ x 10 viên, PVC-Nhôm; Hộp 10 vỉ x 10 viên, PVC-Nhôm.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Cơ sở đăng ký và sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên



Handwritten signature