

Rx Thuốc bán theo đơn

DEXTROMAX

CÔNG THỨC: Mỗi viên nén bao phim chứa

- Terpin hydrat 100 mg

- Dextromethorphan.HBr 10 mg

Tá dược (avicel, croscopovidon, tinh bột mì, talc, magnesi stearat, PVP, HPMC, PEG 6000, Talc, Titan oxid, màu vàng tartrazin, màu xanh patent, màu đỏ oxyd sắt) v.d. 1 viên

TRÌNH BÀY:

- Viên nén bao phim; Vĩ 10 viên, hộp 10 vĩ; chai 100 viên.

DƯỢC LỰC HỌC:

*** Dextromethorphan:**

- Dextromethorphan hydrobromid là thuốc giảm ho có tác dụng lên trung tâm ho ở hành não.
- Dextromethorphan được dùng giảm ho nhất thời do kích thích nhẹ ở phế quản và họng như cảm lạnh thông thường hoặc hít phải các chất kích thích. Dextromethorphan có hiệu quả nhất trong điều trị ho mạn tính, không có đờm. Thuốc thường được dùng phối hợp với nhiều chất khác trong điều trị triệu chứng đường hô hấp trên. Thuốc không có tác dụng long đờm.

*** Terpin hydrat:**

- Terpin hydrat có tác dụng long đờm.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

*** Dextromethorphan:**

- Dextromethorphan được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và có tác dụng trong vòng 15 - 30 phút sau khi uống, kéo dài khoảng 6 - 8 giờ (12 giờ với dạng giải phóng chậm). Thuốc được chuyển hóa ở gan và bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không đổi và các chất chuyển hóa demethyl, trong số đó có dextrophan cũng có tác dụng giảm ho nhẹ.

*** Terpin hydrat:** chưa có thông tin

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị các triệu chứng ho, long đờm, mạn tính; hay ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Suy hô hấp ở bất cứ mức độ nào, ho của người hen suyễn, cao huyết áp, bệnh tim, tiểu đường, bệnh tuyến giáp.
- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
- Người dùng thuốc ức chế IMAO.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

- Khi dùng đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể làm tăng tác dụng của thuốc. Quinidin làm tăng nồng độ dextromethorphan trong huyết thanh và tăng các tác dụng không mong

muốn của dextromethorphan.

- Có báo cáo về sự tương kỵ giữa dextromethorphan hydrobromid với penicilin, tetracyclin, salicyclat, natri phenobarbital.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý:

Dextromethorphan: Có thể xảy ra mệt mỏi, chóng mặt, nhịp tim nhanh, buồn nôn, táo bón, dị ứng ngoài da, co thắt phế quản, thỉnh thoảng thấy buồn ngủ nhẹ.

Terpin hydrat: Buồn nôn, nôn, đau bụng sẽ xảy ra khi uống terpin hydrat trong lúc đói.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC VỚI THUỐC KHÁC:

- Không nên dùng thuốc với các thuốc ức chế monoamin oxydase (IMAO) vì có thể xảy ra một số triệu chứng: sốt cao, tăng huyết áp và có thể xảy ra chảy máu não, thậm chí tử vong.

- Khi dùng đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể làm tăng tác dụng của thuốc. Quinidin làm tăng nồng độ dextromethorphan trong huyết thanh và tăng các tác dụng không mong muốn của dextromethorphan.

- Có báo cáo về sự tương kỵ giữa dextromethorphan hydrobromid với penicilin, tetracyclin, salicyclat, natri phenobarbital.

*** Sử dụng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú:**

Không dùng cho phụ nữ có thai hay cho con bú.

*** Tác động của thuốc khi lái tàu xe và vận hành máy móc:**

- Thận trọng khi dùng cho người lái tàu xe, vận hành máy móc vì thuốc có thể gây buồn ngủ.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Uống theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc theo liều sau:

* Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên, ngày 2 – 3 lần.

* Trẻ em > 30 tháng tuổi: 1 – 2 viên/ngày, chia ra 2 – 3 lần.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:

- Quá liều có thể làm buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cầu, bí tiểu tiện, trạng thái mê, ảo giác, mất điều hòa, suy hô hấp, co giật.

- Xử trí quá liều: Hỗ trợ, dùng naloxon 2 mg tiêm tĩnh mạch, cho dùng nhắc lại nếu cần tới tổng liều 10 mg.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

BẢO QUẢN NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C, TRÁNH ÁNH SÁNG.

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

27 Nguyễn Chí Thanh - K.2 - P.9 - Tp. Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

ĐT: (0294) 3753121, Fax: (0294) 3740239