

Mẫu nhãn sản phẩm

CHỈ ĐỊNH:

- Sát trùng da, niêm mạc: Trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật.
- Tẩy uế dụng cụ y khoa trước khi tiệt trùng.
- Phụ trị: Bệnh nấm ngoài da, hăm da, nước ỉn chân.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người có tiền sử quá mẫn với iod
- Trẻ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ sơ sinh.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

BẢO QUẢN:

Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK :
Số lo SX :
NSX :
HD :



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM
Địa chỉ: 273 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
Nhà máy sản xuất: 192 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Tel: (84-4) 36533502 - Fax: (84-4) 36557831

500 ml DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

DUNG DỊCH LUGOL

Công thức:
Iod : 5,0 g
Kali iodid : 10,0g
Nước tinh khiết vô : 500 ml

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

THẬN TRỌNG:

- Nếu dùng lặp lại và kéo dài có thể bị quá tải iod dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp.
- Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận, với người bệnh đang điều trị bằng iốt.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Sát trùng da, niêm mạc: Tắm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật: pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để rửa. Hoặc tắm thuốc vào vải gạc sạch đắp lên ngày 1-2 lần.
- Tẩy uế dụng cụ: Pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để ngâm dụng cụ trong 30 phút. Sau đó vớt dụng cụ ra rửa lại bằng nước sạch, lau khô, đem tiệt trùng.
- Bệnh nấm da, nước ỉn chân: Tắm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da bị tổn thương, ngày 1-2 lần.



CHỈ ĐỊNH:

- Sát trùng da, niêm mạc: Trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật.
- Tẩy uế dụng cụ y khoa trước khi tiệt trùng.
- Phụ trị: Bệnh nấm ngoài da, hăm da, nước ỉn chân.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người có tiền sử quá mẫn với iod
- Trẻ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ sơ sinh.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

BẢO QUẢN:

Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK :
Số lo SX :
NSX :
HD :



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM
Địa chỉ: 273 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
Nhà máy sản xuất: 192 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Tel: (84-4) 36533502 - Fax: (84-4) 36557831

1000 ml DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

DUNG DỊCH LUGOL

Công thức:
Iod : 10,0 g
Kali iodid : 20,0g
Nước tinh khiết vô : 1000 ml

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

THẬN TRỌNG:

- Nếu dùng lặp lại và kéo dài có thể bị quá tải iod dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp.
- Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận, với người bệnh đang điều trị bằng iốt.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Sát trùng da, niêm mạc: Tắm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật: pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để rửa. Hoặc tắm thuốc vào vải gạc sạch đắp lên ngày 1-2 lần.
- Tẩy uế dụng cụ: Pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để ngâm dụng cụ trong 30 phút. Sau đó vớt dụng cụ ra rửa lại bằng nước sạch, lau khô, đem tiệt trùng.
- Bệnh nấm da, nước ỉn chân: Tắm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da bị tổn thương, ngày 1-2 lần.



CHỈ ĐỊNH:

- Sát trùng da, niêm mạc: Trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật.
- Tẩy uế dụng cụ y khoa trước khi tiệt trùng.
- Phụ trị: Bệnh nấm ngoài da, hăm da, nước ỉn chân.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người có tiền sử quá mẫn với iod
- Trẻ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ sơ sinh.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

BẢO QUẢN:

Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK :
Số lo SX :
NSX :
HD :



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM
Địa chỉ: 273 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
Nhà máy sản xuất: 192 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Tel: (84-4) 36533502 - Fax: (84-4) 36557831

5000 ml DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

DUNG DỊCH LUGOL

Công thức:
Iod : 50,0 g
Kali iodid : 100,0g
Nước tinh khiết vô : 5000 ml

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

THẬN TRỌNG:

- Nếu dùng lặp lại và kéo dài có thể bị quá tải iod dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp.
- Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận, với người bệnh đang điều trị bằng iốt.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Sát trùng da, niêm mạc: Tắm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật: pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để rửa. Hoặc tắm thuốc vào vải gạc sạch đắp lên ngày 1-2 lần.
- Tẩy uế dụng cụ: Pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để ngâm dụng cụ trong 30 phút. Sau đó vớt dụng cụ ra rửa lại bằng nước sạch, lau khô, đem tiệt trùng.
- Bệnh nấm da, nước ỉn chân: Tắm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da bị tổn thương, ngày 1-2 lần.



**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 12/1...6.../2011

llh

Mẫu nhãn sản phẩm

CHỈ ĐỊNH:

- Sát trùng da, niêm mạc: Trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật.
- Tẩy uế dụng cụ y khoa trước khi tiệt trùng.
- Phụ trị: Bệnh nấm ngoài da, hăm da, nước ỉn chân.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người có tiền sử quá mẫn với iod
- Trẻ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ sơ sinh.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

BẢO QUẢN:
Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS
SDK :
Số lô SX :
NSX :
HD :



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM
Địa chỉ: 273 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
Nhà máy sản xuất: 192 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Tel: (84-4) 38533502 - Fax: (84-4) 38557831

20 ml DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

DUNG DỊCH

LUGOL

Công thức:
Iod : 0,2 g
Kali iodid : 0,4g
Nước tinh khiết vđ : 20 ml

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

THẬN TRỌNG:

- Nếu dùng lặp lại và kéo dài có thể bị quá tải iod dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp.
- Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận, với người bệnh đang điều trị bằng lithi.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Sát trùng da, niêm mạc: Tắm thuốc vào bông sạch, bôi lên vùng da trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật: pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để rửa. Hoặc tắm thuốc vào vải gạc sạch, đắp lên ngày 1-2 lần.
- Tẩy uế dụng cụ: Pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để ngâm dụng cụ trong 30 phút. Sau đó vớt dụng cụ ra rửa lại bằng nước sạch, lau khô, đem tiệt trùng.
- Bệnh nấm da, nước ỉn chân: Tắm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da bị tổn thương, ngày 1-2 lần.

CHỈ ĐỊNH:

- Sát trùng da, niêm mạc: Trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật.
- Tẩy uế dụng cụ y khoa trước khi tiệt trùng.
- Phụ trị: Bệnh nấm ngoài da, hăm da, nước ỉn chân.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người có tiền sử quá mẫn với iod
- Trẻ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ sơ sinh.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

BẢO QUẢN:
Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS
SDK :
Số lô SX :
NSX :
HD :



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM
Địa chỉ: 273 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
Nhà máy sản xuất: 192 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Tel: (84-4) 38533502 - Fax: (84-4) 38557831

30 ml DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

DUNG DỊCH

LUGOL

Công thức:
Iod : 0,3 g
Kali iodid : 0,6g
Nước tinh khiết vđ : 30 ml

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

THẬN TRỌNG:

- Nếu dùng lặp lại và kéo dài có thể bị quá tải iod dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp.
- Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận, với người bệnh đang điều trị bằng lithi.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Sát trùng da, niêm mạc: Tắm thuốc vào bông sạch, bôi lên vùng da trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật: pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để rửa. Hoặc tắm thuốc vào vải gạc sạch, đắp lên ngày 1-2 lần.
- Tẩy uế dụng cụ: Pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để ngâm dụng cụ trong 30 phút. Sau đó vớt dụng cụ ra rửa lại bằng nước sạch, lau khô, đem tiệt trùng.
- Bệnh nấm da, nước ỉn chân: Tắm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da bị tổn thương, ngày 1-2 lần.

CHỈ ĐỊNH:

- Sát trùng da, niêm mạc: Trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật.
- Tẩy uế dụng cụ y khoa trước khi tiệt trùng.
- Phụ trị: Bệnh nấm ngoài da, hăm da, nước ỉn chân.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người có tiền sử quá mẫn với iod
- Trẻ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ sơ sinh.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

BẢO QUẢN:
Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS
SDK :
Số lô SX :
NSX :
HD :



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM
Địa chỉ: 273 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
Nhà máy sản xuất: 192 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Tel: (84-4) 38533502 - Fax: (84-4) 38557831

50 ml DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

DUNG DỊCH

LUGOL

Công thức:
Iod : 0,5 g
Kali iodid : 1,0g
Nước tinh khiết vđ : 50 ml

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

THẬN TRỌNG:

- Nếu dùng lặp lại và kéo dài có thể bị quá tải iod dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp.
- Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận, với người bệnh đang điều trị bằng lithi.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Sát trùng da, niêm mạc: Tắm thuốc vào bông sạch, bôi lên vùng da trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật: pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để rửa. Hoặc tắm thuốc vào vải gạc sạch, đắp lên ngày 1-2 lần.
- Tẩy uế dụng cụ: Pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để ngâm dụng cụ trong 30 phút. Sau đó vớt dụng cụ ra rửa lại bằng nước sạch, lau khô, đem tiệt trùng.
- Bệnh nấm da, nước ỉn chân: Tắm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da bị tổn thương, ngày 1-2 lần.

CHỈ ĐỊNH:

- Sát trùng da, niêm mạc: Trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật.
- Tẩy uế dụng cụ y khoa trước khi tiệt trùng.
- Phụ trị: Bệnh nấm ngoài da, hăm da, nước ỉn chân.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người có tiền sử quá mẫn với iod
- Trẻ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ sơ sinh.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

BẢO QUẢN:
Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS
SDK :
Số lô SX :
NSX :
HD :



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM
Địa chỉ: 273 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
Nhà máy sản xuất: 192 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Tel: (84-4) 38533502 - Fax: (84-4) 38557831

100 ml DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

DUNG DỊCH

LUGOL

Công thức:
Iod : 1,0 g
Kali iodid : 2,0g
Nước tinh khiết vđ : 100 ml

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

THẬN TRỌNG:

- Nếu dùng lặp lại và kéo dài có thể bị quá tải iod dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp.
- Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận, với người bệnh đang điều trị bằng lithi.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Sát trùng da, niêm mạc: Tắm thuốc vào bông sạch, bôi lên vùng da trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
- Chăm sóc vết bỏng, vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật: pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để rửa. Hoặc tắm thuốc vào vải gạc sạch, đắp lên ngày 1-2 lần.
- Tẩy uế dụng cụ: Pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để ngâm dụng cụ trong 30 phút. Sau đó vớt dụng cụ ra rửa lại bằng nước sạch, lau khô, đem tiệt trùng.
- Bệnh nấm da, nước ỉn chân: Tắm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da bị tổn thương, ngày 1-2 lần.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC DUNG DỊCH LUGOL

1. Tên thuốc: **DUNG DỊCH LUGOL**
2. Công thức: cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất: Lọ 20ml
Iod
Kali iodid
Nước tinh khiết vừa đủ
3. Dạng bào chế của thuốc: Dung dịch dùng ngoài
4. Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 20ml, 30ml, 50ml, 100ml, chai nhựa 500ml, 1000ml, can nhựa 5000 ml có nhãn kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
5. Các đặc tính dược lý:
 - 5.1. Các đặc tính dược lực học: Dung dịch Lugol có tác dụng sát khuẩn, diệt khuẩn, nấm, virus, động vật đơn bào, kén và bao tử.
 - 5.2. Các đặc tính dược động học: Iod thẩm được qua da và thải trừ qua nước tiểu.
6. Chỉ định, điều trị:
 - Sát trùng da, niêm mạc: Trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
 - Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật.
 - Tẩy uế dụng cụ y khoa trước khi tiệt trùng.
 - Phụ trị: Bệnh nấm ngoài da, hăm da, nước ăn chân.
7. Liều lượng, cách dùng:
 - Sát trùng da, niêm mạc: Tắm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền.
 - Chăm sóc vết bỏng, vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật: pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để rửa. Hoặc tắm thuốc vào vải gạc sạch đắp lên ngày 1-2 lần.
 - Tẩy uế dụng cụ: Pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để ngâm dụng cụ trong 30 phút. Sau đó vớt dụng cụ ra rửa lại bằng nước sạch, lau khô, đem tiệt trùng.
 - Bệnh nấm da, nước ăn chân: Tắm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da bị tổn thương, ngày 1-2 lần.
8. Chống chỉ định: - Người có tiền sử quá mẫn với iod
 - Trẻ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ sơ sinh.
 - Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.
9. Cảnh báo và thận trọng khi sử dụng: + Nếu dùng lặp lại và kéo dài có thể bị quá tải iod dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp.
+ Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận, với người bệnh đang điều trị bằng lithi.
10. Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Không bền trong môi trường kiềm, tương tác với các hợp chất có thủy ngân.
11. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không được dùng
12. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có báo cáo.
13. Tác dụng không mong muốn: Có thể gây kích ứng tại chỗ.
"Thông báo cho bác sĩ biết những tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc".
14. Quá liều:
Dùng chế phẩm nhiều lần trên vùng da tổn thương rộng hoặc bông sẽ gây vị kim loại, tăng tiết nước bọt, đau rất họng, miệng, đau dạ dày, ỉa chảy.
Khi đó phải điều trị triệu chứng và hỗ trợ, chú ý đặc biệt đến cân bằng điện giải, chức năng thận và tuyến giáp.
15. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
16. Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
17. Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM

Địa chỉ văn phòng : Số 273 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Số 192 Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Tel: 04.38533502 - Số Fax: (84-4)36557831.

PHÓ CỤC TRƯỞNG

<https://trungtamthuoc.com>
Nguyễn Việt Hưng