

MẪU HỘP GEL UỐNG EFTILUGEL

Kích thước thực : 13,0 cm x 12,0 cm X 6,6 cm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 20/12/2012

Nhôm phosphate ở thể keo 20%
Eftilugel

Eftilugel
Nhôm phosphate ở thể keo 20%



Hộp 26 gói
20g

GMP - WHO



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
10 Công Trường Quốc Tế, Quận 3, TP.HCM

CÔNG THỨC:

- Nhôm phosphate gel 20% 12,38 g
- Tá dược vừa đủ 1 gói 20 g

CHỈ ĐỊNH:

- Viêm thực quản, viêm dạ dày cấp và mạn tính, loét dạ dày - tá tràng, kích ứng dạ dày, các hội chứng thừa acid như ợ nóng, ợ chua, và hiện tượng tiết nhiều acid.
- Những rối loạn của dạ dày do thuốc, do sai chế độ ăn hoặc sau khi dùng quá nhiều nicotin, cafe, kẹo, hoặc thức ăn quá nhiều gia vị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

Thuốc được chỉ định lúc có cơn đau hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ 1-2 gói/lần, không dùng quá 6 lần/ngày.
Uống thuốc giữa bữa ăn hoặc khi có cơn đau.

BẢO QUẢN:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

Eftilugel
Nhôm phosphate ở thể keo 20%



Hộp 26 gói
20g

GMP - WHO



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
10 Công Trường Quốc Tế, Quận 3, TP.HCM

Sản xuất tại Nhà máy GMP - WHO số 330C2,
đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. HCM

SĐK:

Tiêu chuẩn: TCCS


Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

Ngày 19 tháng 09 năm 2011

CHỖ ĐÓNG GIÁM ĐỐC



DS. *Lê Thanh Sĩ*

MẪU GIẤY NHÔM GEL UỐNG EFTILUGEL

Kích thước thực : 11,5 cm x 6,2 cm

CÔNG THỨC:
- Nhôm phosphate gel 20%12,38 g
- Tá dược vừa đủ 1 gói 20 g

CHỈ ĐỊNH:
- Viêm thực quản, viêm dạ dày cấp và mạn tính, loét dạ dày - tá tràng, kích ứng dạ dày, các hội chứng thừa acid như rát bỏng, ợ chua, và hiện tượng tiết nhiều acid.
- Những rối loạn của dạ dày do thuốc, do sai chế độ ăn hoặc sau khi dùng quá nhiều nicotin, cafe, kẹo, hoặc thức ăn quá nhiều gia vị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:
Thuốc được chỉ định lúc có cơn đau hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ 1-2 gói/lần, không dùng quá 6 lần/ngày.
Uống thuốc giữa bữa ăn hoặc khi có cơn đau.

BẢO QUẢN:
Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

SĐK: Tiêu chuẩn: TCCS

Số lô SX :
Ngày SX :
HD:

ph

Eftilugel

Nhôm phosphat ở thể keo 20%

Gói 20g



ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

GMP - WHO

 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
10 Công Trường Quốc Tế, Quận 3, TP.HCM
Sân xuất tại Nhà máy GMP - WHO số 830C2, đường C, KCN Cầm Lãi, Q.3, TP. HCM



Ngày 19 tháng 09 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC GEL UỐNG EFTILUGEL

Kích thước thước : 9,2 cm x 13,5 cm

Eftilugel Gel uống

CÔNG THỨC : cho 1 gói 20 g

- Nhôm phosphate gel 20% 12,38 g
- Tá dược: Xanthan gum, Kali sorbat, Sorbitol lỏng, Aspartam, Bột hương vị cam, Nước tinh khiết

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

DƯỢC LỰC HỌC:

Nhôm phosphate được dùng như một thuốc kháng acid dịch dạ dày dưới dạng gel nhôm phosphate (một hỗn dịch) và dạng viên nén. Nhôm phosphate làm giảm acid dịch vị dư thừa nhưng không gây trung hòa: Gel dạng keo tạo một màng bảo vệ tựa chất nhầy che phủ diện rộng niêm mạc đường tiêu hóa. Lớp màng bảo vệ gồm nhôm phosphate phân tán mịn làm liền nhanh ổ viêm và loét, bảo vệ niêm mạc dạ dày chống lại tác động bên ngoài và làm người bệnh dễ chịu ngay.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Bình thường thuốc không được hấp thu vào cơ thể và không ảnh hưởng đến cân bằng acid - kiềm của cơ thể.

Nhôm phosphate hòa tan chậm trong dạ dày và phản ứng với acid hydrocloric để tạo thành nhôm clorid và nước. Ngoài việc tạo nhôm clorid, nhôm phosphate còn tạo acid phosphoric. Khoảng 17 - 30% lượng nhôm clorid tạo thành được hấp thu và nhanh chóng được thận đào thải, ở người có chức năng thận bình thường. Nhôm phosphate không được hấp thu sẽ đào thải qua phân.

Nhôm phosphate có khả năng trung hòa chỉ bằng một nửa của nhôm hydroxyd, nhưng ưu điểm hơn là không làm ảnh hưởng đến sự hấp thu phosphate của đường ruột (100 mg nhôm hydroxyd khan có khả năng trung hòa 5 mili đương lượng (5 mEq) acid.

CHỈ ĐỊNH:

- Viêm thực quản, viêm dạ dày cấp và mạn tính, loét dạ dày - tá tràng, kích ứng dạ dày, các hội chứng thừa acid như rát bỏng, ợ chua, và hiện tượng tiết nhiều acid.
- Những rối loạn của dạ dày do thuốc, do sai chế độ ăn hoặc sau khi dùng quá nhiều nicotin, cafe, kẹo, hoặc thức ăn quá nhiều gia vị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Thuốc kháng acid có thể làm giảm hiệu lực của các thuốc khác. Nếu dùng cùng lúc với một thuốc khác nên cách nhau khoảng 2 giờ.

THẬN TRỌNG:

Tránh điều trị liều cao lâu dài ở người bệnh suy thận.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thường gặp: Táo bón.

Thông báo cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không ảnh hưởng.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Không có thông tin.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG :

- Thuốc được chỉ định lúc có cơn đau hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ 1-2 gói/lần, không dùng quá 6 lần/ngày.
- Uống thuốc giữa bữa ăn hoặc khi có cơn đau.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI :

Hộp 26 gói x 20 g .

BẢO QUẢN :

Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG :

24 tháng kể từ ngày sản xuất.


- Gel uống EFTILUGEL đạt theo TCCS.
- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Sản xuất tại: Nhà máy GMP - WHO số 930 C2, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. HCM.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



Ngày 19 tháng 09 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Lê Thanh Sĩ