

1- Nhãn hộp:

Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetat) 400IU

Enural

GMP-WHO

3 Blisters x 10 Soft capsules

Enural

Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetat) 400IU

THÀNH PHẦN:
Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetat)..... 400IU.
Tá dược vừa đủ..... 1 viên.

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị và dự phòng tình trạng thiếu Vitamin E với các biểu hiện về bệnh cơ và thần kinh như: giảm phản xạ, dáng đi bất thường, giảm nhạy cảm với rung động và cảm thụ bản thân, liệt cơ mắt, bệnh võng mạc nhiễm sắc tố, thoái hóa sợi trục thần kinh.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc.
- Giảm thrombin huyết do thiếu Vitamin K.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Dùng theo đường uống.
Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc theo liều sau: Người lớn: mỗi lần uống 1 viên.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

GMP-WHO

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

Enural

Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetat) 400IU

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: 102 Chi Lăng - TP. Hải Dương
Điện thoại: (0320) 3 853 848 - 3 858 824

Phân phối bởi:
CÔNG TY DƯỢC PHẠM THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: 49 Bà Triệu Cầu Long - P2 - Quận Tân Bình - TP.HCM
Điện thoại: (08) 296 8452 - 51
Email: info@thanhdatpharma.com

BẢO QUẢN:
- Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
SDK:
Số lô sx (Lot No):
Ngày sx (Mfg. Date):
Hạn Dùng (Exp. Date):

ĐỀ TẶNG TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG

2- Nhãn vỉ:

Enural

Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetat) 400IU

GMP-WHO

Reg. No: Manufactured by: HD PHARMA, JSC. Distributed by: THANH DAT PHARMA.

Enural

Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetat) 400IU

GMP-WHO

Reg. No: Manufactured by: HD PHARMA, JSC. Distributed by: THANH DAT PHARMA.

Enural

Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetat) 400IU

GMP-WHO


Reg. No: Manufactured by: HD PHARMA, JSC. Distributed by: THANH DAT PHARMA.

Số lô sx: HD:







MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1 - Nhãn hộp:



2 - Nhãn vỉ:



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ENURAL TĐ

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl acetat) 400 IU

Tá dược: (Dầu đậu nành, Gelatin, Glycerin, Nipagin, Nipazol, Dung dịch Sorbitol 70%, Ethyl vanilin,.....vd 1 viên).

Dược lực học

Vitamin E ngăn cản oxy hóa các thành phần thiết yếu trong tế bào; ngăn cản tạo thành các sản phẩm oxy hóa độc hại, ví dụ các sản phẩm peroxy hóa do chuyển hóa các acid béo chưa bão hòa; phản ứng với các gốc tự do (nguyên nhân gây tổn hại màng tế bào do oxy hóa), mà không tạo ra các gốc tự do khác trong quá trình đó.

Alphatocopherol tổng hợp (dl - alphatocopherol, còn gọi là vitamin E tổng hợp) có hoạt tính sinh học kém hơn các chất trong tự nhiên, chiết từ nguồn dược liệu (d - alphatocopherol, còn gọi là Vitamin E thiên nhiên)

Dược động học

Đề vitamin E hấp thu qua đường tiêu hóa, mật và tuyến tụy phải hoạt động bình thường. Lượng vitamin E hấp thu giảm khi liều dùng tăng lên. Thuốc vào máu qua vi thể dưỡng chấp trong bạch huyết, rồi được phân bố rộng rãi vào tất cả các mô và tích lại ở mô mỡ.

Chỉ định

Điều trị và dự phòng tình trạng thiếu Vitamin E với các biểu hiện về bệnh cơ và thần kinh như giảm phản xạ, dáng đi bất thường, giảm nhạy cảm với rung động và cảm thụ bản thân, liệt cơ mắt, bệnh võng mạc nhiễm sắc tố, thoái hóa sợi trục thần kinh.

Chống chỉ định

- Mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc.
- Giảm Thrombin huyết do thiếu Vitamin K.

Liều dùng - cách dùng

- Dùng theo đường uống.
- Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc theo liều sau:
Người lớn: Mỗi ngày uống 1 viên.

Tác dụng không mong muốn



[Handwritten signature]

Vitamin E thường được dung nạp tốt. Liều cao có thể gây ỉa chảy, đau bụng, và các rối loạn tiêu hóa khác và cũng có thể gây mệt mỏi, yếu.

"Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

Tương tác thuốc

Vitamin E đối kháng với tác dụng của vitamin K, nên làm tăng thời gian đông máu.

Nồng độ vitamin E thấp ở người bị kém hấp thu do thuốc (như kém hấp thu khi dùng cholestyramin)

Tăng hấp thu vitamin A qua ruột khi có vitamin E; vitamin E bảo vệ vitamin A khỏi bị thoái hóa do oxy hóa làm cho nồng độ vitamin A trong tế bào tăng lên.

Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú

Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

Thuốc không ảnh hưởng tới người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Quá liều và xử trí:

Chưa có thông tin về trường hợp quá liều.

Vitamin E là vitamin tan trong dầu, do đó có thể tích lũy trong cơ thể khi dùng liều cao hoặc kéo dài. Khi dùng kéo dài cần tham khảo ý kiến bác sỹ.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Trình bày: Hộp 3 vi x 10 viên; Hộp 10 vi x 10 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.

Chú ý:

- Không dùng quá liều chỉ định.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng, TP. Hải Dương

ĐT/Fax 0320.853.848

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

