



HỘP
ESPERE 30 VIÊN (3 VỈ X 10 VIÊN)

WHO - GMP

3 Vỉ x 10 Viên nang mềm

ESPERE

Diosmin 600 mg

[Thành phần] Mỗi viên nang mềm chứa:

Diosmin 600 mg.

Tá dược vừa đủ.

[Chỉ định/Chống chỉ định/Liều dùng/Chú ý/Tác dụng phụ/Thông tin khác]

Xin đọc thêm trong tờ hướng dẫn sử dụng.

[Bảo quản]

Trong bao bì kín, nơi khô, tránh ánh sáng, dưới 30°C.

[Tiêu chuẩn]

Nhà sản xuất.

[Hạn dùng]

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

[Số Đăng Ký]

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠT VI PHÚ

Lô M7A, Đường D17, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Phân phối bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA

88 Đường 152 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. HCM

3 Blisters x 10 soft capsules

ESPERE

Diosmin 600 mg

WHO - GMP

Manufactured by:

DAVI PHARM CO., LTD

Lot. M7A, D17 Street, My Phuoc 1 Ind. Park, Thoi Hoa, Ben Cat, Binh Duong, Vietnam

Distributed by:

GONSA JOINT STOCK COMPANY

88, 152 Cao Lo St., Ward 4, Dist. 8, HCMC

Excipients 600 mg.

In-house.

[Specification]

[Indications/Contra-indications/Dosage

q.s.

36 months from the date of manufacturing.

[Shelf - life]

[Visa No.]

Keep out of reach of children

Carefully read the insert paper before use

the temperature below 30°C.

[Storage] Store in tight, light-resistant containers at

Please see the enclosed leaflet.

[Precaution/Side Effects/Other informations]

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 22/6/17

VỈ
ESPERE 1 VỈ 10 VIÊN



22 ✓

ESPÉRE

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa

Diosmin 600 mg

Tá dược: Dầu dừa, sáp ong trắng, Lecithin, Gelatin, Glycerin, Methylparaben, Propylparaben, Titan dioxide, Ethyl vanilin, nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang mềm

QUY CÁCH: Hộp 3 vỉ x 10 viên

DƯỢC LÝ HỌC

Dược lực học

Tăng cường lực tĩnh mạch và bảo vệ mạch

Tác dụng trên hệ thống mạch máu trở về tim bằng cách:

- Làm giảm tính căng dẫn và ứ trệ của tĩnh mạch
- Trong vi tuần hoàn, thuốc bình thường hóa tính thấm mao mạch và tăng sức bền mao mạch

Diosmin giúp điều trị bệnh trĩ bằng cách giảm sưng (viêm) và phục hồi chức năng tĩnh mạch.

Tăng cường trương lực thành tĩnh mạch nên làm giảm hiện tượng ứ máu bên trong các búi trĩ.

Làm giảm nhiều các yếu tố gây viêm như prostaglandin E2, E alpha2 và thromboxane B2 cũng như các gốc tự do. Vì thế thuốc cũng làm giảm tình trạng sưng phù.

Bảo vệ vi tuần hoàn.

Cải thiện dẫn lưu mạch bạch huyết.

Dược động học

Ở người, sau khi uống chất có chứa diosmin đánh dấu bởi ^{14}C :

- Bài xuất chủ yếu qua phân, trung bình có 14% liều dùng được bài xuất qua nước tiểu.
- Thời gian bán thải là 11 giờ.
- Thuốc chuyển hóa thành các acid phenolic hoặc các dẫn xuất glycine liên hợp và được thải trừ qua nước tiểu. Phần Diosmin không hấp thu được thải trừ theo phân.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị những triệu chứng trĩ cấp và mạn tính

Điều trị những triệu chứng liên quan đến suy tĩnh mạch – mạch bạch huyết mãn tính đặc trưng bởi: nặng chân, đau, chồn chân vào buổi sáng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Đối với suy tĩnh mạch – mạch bạch huyết: 1 viên mỗi ngày vào bữa điểm tâm
- Đối với trĩ cấp và mạn tính: 2 – 3 viên/ngày, uống trong bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn với thành phần của thuốc
- Tiền sử phù Quincke
- Suy tim mất bù chưa điều trị
- Suy gan, thận nặng

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

- Thận trọng khi dùng cho người suy gan, rối loạn điện giải, thông phong, suy tim, suy thận, hẹp động mạch thận, người cao tuổi, người lái xe và vận hành máy móc
- Nếu các triệu chứng tri không mất đi trong vòng 15 ngày, phải hỏi ý kiến bác sĩ.

Phụ nữ có thai

Nghiên cứu thực nghiệm trên động vật không chứng minh là thuốc có tác dụng gây quái thai ở động vật. Hiện chưa có thông báo về tác dụng độc hại trên người nên không dùng cho phụ nữ có thai.

Phụ nữ nuôi con bú

Vì chưa có dữ liệu việc thuốc có bài xuất vào sữa hay không, tránh cho con bú khi dùng thuốc này.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thận trọng khi dùng cho người lái xe và vận hành máy móc

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Đã có báo cáo về một số trường hợp rối loạn tiêu hóa (đau dạ dày, đau bụng, tiêu chảy) và rối loạn thần kinh thực vật (cảm giác bất an, nhức đầu), không cần ngừng điều trị.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc

TƯƠNG TÁC THUỐC

Để tránh các tương tác có thể xảy ra giữa các thuốc, phải luôn luôn báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn hiện đang được điều trị bất cứ một thuốc nào khác.

Không dùng phối hợp với Lithium

Thận trọng khi dùng đồng thời với muối kali, thuốc lợi niệu giữ kali, thuốc gây loạn nhịp, thuốc gây mê, thuốc điều trị tăng huyết áp khác.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Chưa có báo cáo về quá liều do thuốc. Nên điều trị triệu chứng nếu có quá liều xảy ra.

BẢO QUẢN: Bảo quản trong bao bì kín, dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Nhà sản xuất

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠT VI PHÚ

Lô M-17A, Đường D17, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Phân phối bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN GON SA

Số 88, đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ



✓

TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lỗ Minh Hùng