

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu:...../...../.....

R_x Thuốc bán theo đơn

ETONCI B1

Vitamin B1 150mg

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG/ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USE



Hộp 10 Viên
Box of 10 Blisters x 10 Tablets

**Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng -
Liều dùng/ Indications, Contraindications,
Dosage - Administration:** Xin xem tờ
hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp/
See the package insert inside.

Sản xuất tại/ Manufactured by:

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/
HATAY PHARMACEUTICAL JSC

La Khê - Hà Đông - TP Hà Nội/ La Khe - Ha Dong - Ha Noi City

Theo hợp đồng với CÔNG TY C.P DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TÂY

Cum CN sạch Phú Lâm - Phú Lâm - Hà Đông - TP Hà Nội

Tiêu chuẩn/ Specifications:

ĐDVN IV/ Vietnamese pharmacopoeia IV

Hộp 10 Viên
Box of 10 Blisters x 10 Tablets



ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG/ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USE

Vitamin B1 150mg

ETONCI B1

R_x Prescription only

125.60.50

Thành phần/ Composition:

Mỗi viên nén chứa/ Each tablet contains:
Vitamin B1 (Thiamin nitrat)150mg
Tá dược vd/Excipients q.s.f...1 viên/ 1 tablet

SDK (Reg.No):

Số lô SX (Lot.No):

Ngày SX (Mfg.Date):

HD (Exp.Date):

Bảo quản/ Storage:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/
Store in a dry place, below 30°C.





Hướng dẫn sử dụng thuốc:

Thuốc bán theo đơn:

ETONCIB1

(Vitamin B₁ 150mg)

- Dạng thuốc: Viên nén

-Thành phần: Mỗi viên nén chứa:

Vitamin B ₁ (Thiamin nitrat)	150mg
Tá dược vđ	1 viên

(Tá dược gồm: Tinh bột mì, lactose, gelatin, nipagin, nipasol, magnesi stearat, nước tinh khiết).

- Các đặc tính dược lực học: Thiamin thực tế không có tác dụng dược lý, thậm chí ở liều cao. Thiamin pyrophosphat, dạng thiamin có hoạt tính sinh lý, là coenzym chuyển hóa carbohydrat làm nhiệm vụ khử carboxyl của các alpha - cetoacid như pyruvat và alpha - cetoglutarat và trong việc sử dụng pentose trong chu trình hexose monophosphat.

- Các đặc tính dược động học :

Sự hấp thu thiamin trong ăn uống hàng ngày qua đường tiêu hóa là do sự vận chuyển tích cực phụ thuộc Na⁺. Khi nồng độ thiamin trong đường tiêu hóa cao sự khuếch tán thụ động cũng quan trọng. Tuy vậy, hấp thu liều cao bị hạn chế. Sau khi tiêm bắp, thiamin cũng được hấp thu nhanh, phân bố vào đa số các mô và sữa.

Ở người lớn, khoảng 1 mg thiamin bị giáng hóa hoàn toàn mỗi ngày trong các mô, và đây chính là lượng tối thiểu cần hàng ngày. Khi hấp thu ở mức thấp này, có rất ít hoặc không thấy thiamin thải trừ qua nước tiểu. Khi hấp thu vượt quá nhu cầu tối thiểu, các kho chứa thiamin ở các mô đầu tiên được bão hòa. Sau đó lượng thừa sẽ thải trừ qua nước tiểu dưới dạng phân tử thiamin nguyên vẹn. Khi hấp thu thiamin tăng lên hơn nữa, thải trừ dưới dạng thiamin chưa biến hóa sẽ tăng hơn.

- Chỉ định: Điều trị bệnh tê phù do thiếu vitamin B₁ (beri-beri), viêm đa dây thần kinh, hội chứng Wernicke và hội chứng Korsakoff.

- Cách dùng –liều dùng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Liều dùng:

* **Beriberi:** Nhẹ: liều có thể tới 30 mg, uống 1 lần hoặc chia làm 2 - 3 lần, uống hàng ngày.

Nặng: liều có thể tới 300 mg, chia làm 2 - 3 lần mỗi ngày.

* **Hội chứng Wernicke:** Nên tiêm bắp, liều đầu tiên: 100 mg. Thường các triệu chứng thần kinh đỡ trong vòng từ 1 - 6 giờ. Sau đó, hàng ngày hoặc cách 1 ngày: 50 - 100 mg/ngày, tiêm bắp. Dợt điều trị: 15 - 20 lần tiêm.

- Chống chỉ định: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- Thận trọng: Những người dị ứng với Penicilin dễ có dị ứng với vitamin B₁ và ngược lại.

- Tác dụng không mong muốn: Các phản ứng có hại của thiamin rất hiếm và thường theo kiểu dị ứng. Các phản ứng quá mẫn xảy ra chủ yếu khi tiêm.

* **Hiếm gặp :** Toàn thân: Ra nhiều mồ hôi, sốc quá mẫn.

Tuần hoàn: Tăng huyết áp cấp.

Da: Ban da, ngứa, mày đay.

Hô hấp: Khó thở.

Phản ứng khác: Kích thích tại chỗ tiêm.

* **Ghi chú:** " Thông báo cho bác sỹ những tác động không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo.

- Sử dụng quá liều: Chưa có báo cáo.

- Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

* *Lưu ý:* Khi thấy viên thuốc bị ẩm mốc, viên thuốc bị nứt, vỡ, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Qui cách đóng gói:** Hộp 10 vỉ x10 viên.
- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
- **Tiêu chuẩn áp dụng:** DDVN IV.

12

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SX TẠI: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
THEO HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY C.P DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ
TÂY

La Khê - Hà Đông- TP. Hà Nội

ĐT: 04.33522203-33516101. FAX: 04.33522203

BÊN ĐẶT GIA CÔNG:
CÔNG TY C.P DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

Giám đốc



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phan...

GIÁM ĐỐC
ĐS. Hoàng Văn Khương

