

**THÀNH PHẦN**

Mỗi viên nang mềm chứa:

*Hoạt chất:*

Eucalyptol..... 100 mg

Menthol..... 0,5 mg

Tinh dầu tần..... 0,18 mg

Tinh dầu gừng..... 0,5 mg

*Tá dược:* Dầu đậu nành, Gelatin, Glycerin, Sorbitol lỏng, Ethyl vanilin, Nipagin, Nipasol, Màu xanh green vừa đủ 1 viên nang mềm.**DƯỢC LỰC HỌC**

EUCATOL kết hợp trích tinh tinh dầu và tinh dầu của các dược liệu thuộc nhóm cây thuốc chữa ho, cảm cúm gồm: bạc hà, trầm, tần, gừng.

Eucalyptol: có tính sát trùng, được dùng chữa ho, kích thích tiêu hóa. Eucalyptol được đào thải chủ yếu qua đường hô hấp.

Menthol: là trích tinh của tinh dầu bạc hà, có tính chất làm dịu ho, làm loãng niêm dịch. Uống liều nhỏ có thể gây hưng phấn, tăng bài tiết của tuyến mồ hôi, làm hạ thân nhiệt. Sau khi hấp thu, menthol được bài tiết trong nước tiểu và mật ở dạng glucuronid. Menthol được sử dụng trong cảm sốt, nhức đầu, sổ mũi, viêm họng, ho, kích thích tiêu hóa, tiêu chảy và đau bụng.

Gừng: có tác dụng chống dị ứng, giảm co thắt cơ trơn. Tinh dầu gừng có tác dụng kháng khuẩn trên nhiều chủng vi khuẩn, làm loãng niêm dịch, làm giảm ho, chống viêm và giảm đau. Gừng thường được sử dụng điều trị cảm cúm, làm ra mồ hôi, chữa ho, hen phế quản, viêm phế quản, chống cảm lạnh. Gừng còn là vị thuốc chữa đầy bụng, ăn uống không tiêu, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng.

Tần dày lá (húng chanh): là một dược liệu chữa cảm cúm, ho hen. Tinh dầu tần có tác dụng kháng sinh mạnh đối với vi khuẩn *Staphylococcus*, *Salmonella typhi*, *Shigella*, *E.coli*, *Streptococcus*, *Pneumococcus*...**DƯỢC ĐỘNG HỌC**

Chưa có báo cáo

**CHỈ ĐỊNH**

EUCATOL được chỉ định:

Điều trị các chứng ho, đau họng, sổ mũi, cảm cúm.

Sát trùng đường hô hấp.

Làm loãng niêm dịch, làm dịu ho.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG***Cách dùng:* EUCATOL được dùng bằng đường uống.*Liều lượng:* Dùng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, liều thông thường:

Người lớn: uống 2 viên mỗi lần x 3 lần mỗi ngày.

Trẻ em trên 2 tuổi: uống 1 viên mỗi lần x 3 lần mỗi ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 2 tuổi.

**THẬN TRỌNG**

Menthol có tính ức chế hô hấp qua đường thở (hít vào) nhất là đối với trẻ nhỏ. Vì vậy, cần sử dụng thận trọng cho trẻ nhỏ.

Cần thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

**TƯƠNG TÁC THUỐC**

Chưa có tài liệu.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

Do chưa có dữ liệu nghiên cứu trên phụ nữ có thai và cho con bú nên cần thận trọng trong những trường hợp này.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN**

Có báo cáo rằng dùng menthol liều lớn qua đường tiêu hóa có thể gây đau bụng, buồn nôn, nôn, chóng mặt, buồn ngủ.

**Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc****QUÁ LIỀU**

Chưa có báo cáo.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, dưới 25°C, tránh ánh sáng.**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.**ĐÓNG GÓI:** Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm.**TIÊU CHUẨN:** Tiêu chuẩn nhà sản xuất.**ĐỂ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM****ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG****NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

Sản xuất tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM**

Số 43, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 06503 769 606 - Fax: 06503 769 601