

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

Mỗi 1 viên nang mềm EUGINTOL FORT chứa:

Thành phần hoạt chất:

Eucalyptol (*Oleum Eucalypti*).....100,00 mg
Tinh dầu gừng(*Oleum Zingiberis*).....0,50 mg
Tinh dầu húng chanh(*Oleum Plectranthi*)...0,18 mg
Menthol (*Mentholium*).....0,50 mg

Thành phần tá dược: Dầu parafin, BHT; Dầu đậu nành; Gelatin; Sorbitol lỏng 70%; Glycerin; Propylparaben; Methylparaben; Ethylvanillin; Brilliant blue dye; Ethanol 96%; Nước tinh khiết

DẠNG BÀO CHẾ:

Viên nang mềm, bên trong chứa dung dịch thuốc màu xanh, mùi thơm của tinh dầu.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị các triệu chứng ho mà nguyên nhân do:

- Ho do cảm lạnh, đau họng, sổ mũi, cảm cúm.
- Dị ứng đường hô hấp trên, viêm phế quản-phổi cấp, mạn tính, cảm cúm, ho do kích ứng với các bệnh vùng mũi xoang.
- Dễ khạc đờm, sát khuẩn nhẹ đường hô hấp.
- Ho do hút thuốc hoặc hít phải khói thuốc, chất kích thích.

- Ăn uống không tiêu, chướng bụng, đầy hơi.
- Sát trùng đường hô hấp, làm dịu cơn đau họng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Dùng uống

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần uống 2-3 viên, ngày uống 2 – 3 lần.
- Trẻ em từ 6 – 12 tuổi: Mỗi lần uống 1-2 viên, ngày uống 2 lần.
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi – 6 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên, ngày uống 3 lần.
- Hoặc theo hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng thuốc trong các trường hợp:

- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
- Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai.
- Ho do bệnh suyễn, bệnh lao.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Cần thận trọng với những người bệnh dưới đây.

- Người bệnh ho có quá nhiều đờm, ho mạn tính ở người hút thuốc, ho do tràn khí.
- Thuốc có thể gây kích ứng niêm mạc miệng.
- Khi uống liều cao Eugintol Fort có thể thấy rối loạn tiêu hóa, nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn và ói mửa. Nặng hơn thì bị trầm cảm thần kinh trung ương bao gồm hôn mê, chứng xanh da, mất điều hòa, co đồng tử, rối loạn hô hấp, mê sảng, co giật.

CHÚ Ý ĐỂ PHÒNG

- Trường hợp ho có đàm cần phải để tự nhiên vì là yếu tố cơ bản bảo vệ phổi-phế quản.
- Trước khi kê toa thuốc chống ho, cần tìm nguyên nhân gây ho để có điều trị đặc hiệu, nhất là hen phế quản, viêm phế quản mạn tính, giãn

phế quản, các chất gây cản trở trong phế quản, ung thư, nhiễm trùng phế quản-phổi, suy thất trái, tắc nghẽn phổi, tràn dịch màng phổi.

- Nếu ho kháng với 1 loại thuốc ho dùng theo liều thông thường, không nên tăng liều mà cần khám lại tình trạng lâm sàng của bệnh nhân.

Menthol có tính ức chế hô hấp qua đường thở (hít vào mũi) nhất là đối với trẻ em dưới 2 tuổi, trẻ sơ sinh.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ cho con bú, chỉ nên dùng thuốc khi lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:

Do không có các nghiên cứu về tương tác, tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

- Tác dụng không mong muốn liên quan đến các tinh dầu thường nhẹ, và hiếm gặp như: kích ứng niêm mạc miệng, rối loạn tiêu hóa, táo bón, buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, ói mửa, co thắt phế quản, dị ứng da, ức chế hô hấp.

- Có báo cáo rằng dùng Menthol liều lớn qua đường tiêu hoá có thể có đau bụng, nôn ói, chóng mặt, buồn ngủ.

THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 3 vỉ x 10 viên.

Hộp 5 vỉ x 10 viên.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hộp 20 vỉ x 10 viên.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC:

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

www.spm.com.vn

Lô số 51, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Đường số 2, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 37507496 - Fax: (028) 38771010