

Rx Thuốc bán theo đơn

Hộp 1 tuýp 40 g

FENTONIL VAGINAL CREAM

Fenticonazole Nitrate BP

2% Vaginal Cream Tube of 40g

Kem bôi âm đạo



FENTONIL VAGINAL CREAM
Fenticonazole Nitrate BP
2% Vaginal Cream Tube of 40g

FENTONIL VAGINAL CREAM

Fenticonazole Nitrate BP

2% Vaginal Cream Tube of 40g

Thành phần:

Mỗi 100 g chứa:

Fenticonazole Nitrate 2 g

(Mỗi tuýp 40g chứa:

Fenticonazole Nitrate 0.8g)

Chi định, cách dùng, chống chỉ định, các thông tin khác:
xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Đề xa tầm tay trẻ em

Nhà nhập khẩu:

SĐK : VN-

Số lô sx : 04306F

NSX : 23/06/2010

HD : 22/06/2013

Sản xuất bởi:

Pacific Pharmaceuticals Ltd.,
30th K.M. Multan Road, Lahore.
Pakistan



FENTONIL VAGINAL CREAM

Fenticonazole Nitrate BP

2% Vaginal Cream Tube of 40g

FENTONIL VAGINAL CREAM
Fenticonazole Nitrate BP
2% Vaginal Cream Tube of 40g

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 01/10/14

Rx Thuốc bán theo đơn

FENTONIL VAGINAL CREAM

Fenticonazole Nitrate BP

2% Vaginal Cream Tube 0.40g

Kem bôi âm đạo

Thành phần:

Mỗi 100 g chứa:

Fenticonazole Nitrate 2 g

(Mỗi tuýp 40g chứa:

Fenticonazole Nitrate 0.8g)

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, các thông tin khác:
xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Đề xa tầm tay trẻ em

Tuýp 40 g

SDK : VN-
Số lô sx : 04306F
NSX : 23/06/2010
HD : 22/06/2013



Sản xuất bởi:
Pacific Pharmaceuticals Ltd.,
30th K.M. Multan Road, Lahore.
Pakistan




Instructions:

1. Screw the applicator onto the tube in place of the cap

2. Gently press the lower end of the tube allow the cream to enter the applicator. In the event of the piston being some what resistant, pull on it gently. When not otherwise prescribed by the physician, the applicator should be filled up to the stoping point

3. Remove the applicator from the tube and close the tube immediately afterwards with the cap.

4. In supine position, with knees raised and spread apart, gently introduce the applicator into the vagina as deeply as possible. Push the piston completely into the applicator. Then, pull out the applicator (without touching the piston).



Sản xuất bởi:
Pacific Pharmaceuticals Ltd.,
30th K.M. Multan Road, Lahore,
Pakistan

Applicator for
FENTONIL 2% Vaginal Cream



Thuốc này chỉ được bán theo đơn của thầy thuốc.

FENTONIL VAGINAL CREAM

THÀNH PHẦN

Fenticonazole nitrate ... 2%

Tá dược: Xalafin, Cetyl Alcohol, Glyceryl Monostearate, Lanolin Hydrogenated, Almond Oil, Disodium Edetate, Propylene Glycol.

DƯỢC LỰC HỌC

Fenticonazole nitrate - một dẫn xuất mới của imidazole - là một chất kháng nấm phổ rộng, cho tác động kìm sự phát triển và diệt nấm trên các dermatophytes (là tác nhân gây hầu hết các bệnh nhiễm vi nấm trên da và niêm mạc), các loại nấm men gây bệnh, nấm mốc và nấm lưỡng hình.

Thử nghiệm *in vitro* và *in vivo* cho thấy Fenticonazole có tác động chống lại các loại vi nấm sau :

Trichophyton mentagrophytes, T. verrucosum, T. rubrum, T. tonsurans, T. terrestre; Microsporum canis, M. gypseum, M. audouinii, M. fulvum, M. cookei; Epidermophyton floccosum; Candida albicans; Cryptococcus neoformans; Geotrichum candidum ; Torulopsis glabrata, Sporotrichum schenckii, Aspergillus niger, A. fumigatus, A. flavus, Penicillium crysogenum.

- Ngoài ra, Fenticonazole còn có tác động chống lại các vi khuẩn Gram dương (Staphylococcus, Streptococcus). Vì vậy được chỉ định trong trường hợp nhiễm nấm có kèm bội nhiễm.

Khác với cơ chế tác động của các kháng sinh, cơ chế tác động kháng khuẩn của Fenticonazole được thể hiện trên nhiều mức khác nhau: trên màng tế bào vi khuẩn (làm tăng tính thấm), trên các plasmide (ức chế tiến trình oxy hóa ở ti thể), trên nhân (ức chế sự tổng hợp ARN).

- Fenticonazole cũng có hoạt tính chống Trichomonas vaginalis, cả *in vitro* và *in vivo*.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Các nghiên cứu dược động học trên phụ nữ và trên động vật đã chứng tỏ rằng hấp thu qua da và niêm mạc (âm đạo) rất thấp. Fenticonazole và các chất chuyển hóa của nó không phát hiện thấy trong huyết tương.

CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nấm Candida âm đạo (viêm âm hộ - âm đạo, viêm âm đạo).
- Nấm bội nhiễm (gây ra bởi vi khuẩn gram dương).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn cảm với thuốc.

CHÚ Ý ĐỀ PHÒNG

Bệnh do vi nấm Candida : khi làm vệ sinh nên sử dụng loại xà phòng có pH trung tính hoặc kiềm (do pH acid tạo thuận lợi cho vi nấm Candida phát triển).

LÚC CÓ THAI VÀ LÚC CHO CON BÚ

Mặc dầu sự hấp thu qua da và qua âm đạo rất kém nhưng không nên sử dụng chế phẩm này trong thai kỳ.

Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú. Cần cân nhắc giữa lợi ích dùng thuốc của mẹ với nguy cơ có thể xảy ra cho trẻ bú mẹ. Người bệnh cần thông báo với bác sỹ khi đang cho con bú.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý

- Do fenticonazole hấp thu rất thấp qua da và niêm mạc nên không gây tác dụng toàn thân. Tuy nhiên, nếu bôi thuốc lên vùng da bị chảy máu, lên diện tích rộng, ở trẻ sơ sinh nhất là ở những vùng da có nếp gấp, cũng nên lưu ý đến khả năng này.

- Rất hiếm khi xảy ra các biểu hiện không dung nạp tại chỗ, như cảm giác nóng rát nhẹ, ngứa, ban đỏ.

* Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

- Do fenticonazole hấp thu rất thấp qua da và niêm mạc nên không gây ra tương tác với thuốc dùng đường uống.

- Khi dùng kem fenticonazole, không dùng đồng thời với các loại thuốc bôi ngoài da khác.

LIỀU LƯỢNG và CÁCH DÙNG

Mỗi lần (khoảng 5g) bôi vào âm đạo bằng dụng cụ kèm theo, ngày 2 lần.

DÙNG THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không ảnh hưởng gì đến công việc lái xe và vận hành máy móc.

QUÁ LIỀU

Chưa thấy có trường hợp quá liều thuốc này được ghi nhận.

ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 tuýp x 40 g cream.

BẢO QUẢN:

Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng. Nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG:

3 năm kể từ ngày sản xuất.

Không được dùng thuốc quá hạn sử dụng.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Đặt thuốc ngoài tầm tay trẻ em.
Cần thêm thông tin, hãy tham khảo ý kiến bác sỹ.
Thuốc bán theo đơn.*

Sản xuất bởi: **M/s. Pacific Pharmaceuticals Ltd.,**
Add: 30th K.M., Multan Road, Lahore – Pakistan

