




Thành phần: Mỗi tuýp 10g có chứa:
Terbinafine Hydrochloride 0.1g
Tá dược vừa đủ

Dạng bào chế: Dạng kem

Chỉ định: Điều trị tại chỗ nấm da tay, da chân, nấm da thân, da đầu, nấm da nhiều màu sắc.

Liều dùng & Cách dùng: Bôi vào chỗ điều trị 2 lần mỗi ngày, 1 - 2 tuần cho 1 đợt điều trị

Chống chỉ định, thận trọng và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Không dùng quá liều chỉ định

Nhà sản xuất



**DIHON PHARMACEUTICAL
GROUP CO.,LTD.**

No.45Keyi Road, Kunming New & High-Tech,
Industrial Development Zone, Yunnan, China.

Hạn dùng:

Số lô SX:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 6/10/15



169/9A
BSA

Nhà sản xuất và phân phối: CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THUỐC TẠI HÀ NỘI
Số 13, Lô 13A, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

FITNEAL[®]

FJ139-01
0M20800101

Hộp 1 tuýp 10g

External use only

Số đăng ký: VN-XXX-XX

OTC

Nhà phân phối tại Việt Nam



FITNEAL[®]

Terbinafine Hydrochloride Cream

Số lô:
Ngày SX:
Hạn dùng:

Nhà phân phối tại Việt Nam:
CÔNG TY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á
Hà Nội:
Số 13, Lô 13A Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04-783 1673 * Fax: 04-783 1676
TP. HCM:
44/31 Sư Vạn Hạnh Mới Dũ, P.12, Q.10
Tel: 08 - 8630116 * Fax: 08 - 8630117

Tính chất dược lý:

Terbinafin hydrochlorid là một dẫn xuất allylamine có phổ chống nấm rộng. Thuốc ức chế và diệt nấm qua ức chế squalene epoxidase, một enzyme chủ chốt trong quá trình sinh tổng hợp steroid ở nấm. Tác động này dẫn tới sự thiếu hụt ergosterol và tích tụ squalene nội bào, làm chết tế bào nấm. Enzyme squalene epoxidase không liên kết với hệ cytochrom P-450.

FJ139-01
0M20800101

Thành phần: Mỗi tuýp 10g có chứa:
Terbinafine Hydrochloride 0.1g
Tá dược vừa đủ

Dạng bào chế: Dạng kem

Chỉ định: Điều trị tại chỗ nấm da tay, da chân, nấm da thân, da đầu, nấm da nhiều màu sắc.

Liều dùng & Cách dùng: Bôi vào chỗ điều trị 2 lần mỗi ngày, 1 - 2 tuần cho 1 đợt điều trị

Chống chỉ định, thận trọng và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Bảo quản: Trong bao bì kín, nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Không dùng quá liều chỉ định



Nhà sản xuất:
**DIHON PHARMACEUTICAL
GROUP CO.,LTD.**

No.45 Keyi Road, Kunming New & High-Tech,
Industrial Development Zone, Yunnan, China.



FITNEAL[®]

Terbinafine Hydrochloride Cream

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

FITNEAL
(KEM TERBINAFINE HYDROCHLORIDE)
Chỉ dùng tại chỗ trên da

Thành phần:

Mỗi tuýp 10g có chứa:

Hoạt chất: Terbinafine hydrochloride 0,1 g.
Tá dược: Liquid parafin, stearic acid, laurocapram, paregal O, Anhydrous Sodium Sulfite, glycerol, Cetostearyl Alcohol, Ethanol (96%), Nước cất.

Dạng bào chế: Cream
Đóng gói: Tuýp 10g, hộp 1 tuýp

Tính chất dược lý:

Terbinafin hydroclorid là một dẫn xuất allylamine có phổ chống nấm rộng. Thuốc ức chế và diệt nấm qua ức chế squalene epoxidase, một enzym chủ chốt trong quá trình sinh tổng hợp steroid ở nấm. Tác động này dẫn tới sự thiếu hụt ergosterol và tích tụ squalene nội bào, làm chết tế bào nấm. Enzyme squalene epoxidase không liên kết với hệ cytochrom P-450. Terbinafine hydrochloride không ảnh hưởng đến sự chuyển hoá của các hormone hoặc những thuốc khác.

Chỉ định:

Chỉ định cho điều trị tại chỗ nấm da tay, nấm da chân, nấm da thân, nấm da đùi, nấm da nhiều màu sắc.

Chống chỉ định:

Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với Terbinafine

Liều dùng và cách dùng:

Bôi vào chỗ điều trị 2 lần mỗi ngày. Một đến hai tuần cho một đợt điều trị.

Thận trọng:

1. Không được uống và tránh tiếp xúc với mắt.
2. Ngừng thuốc ngay nếu ở chỗ bôi thuốc xuất hiện nóng bỏng, đỏ, ngứa và hỏi bác sĩ của bạn.
3. Không dùng thuốc nếu hình thức mô tả của thuốc thay đổi.
4. Trẻ em dùng thuốc theo sự giám sát của người lớn.
5. Để thuốc ngoài tầm với của trẻ.

Tương tác thuốc:

Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng nếu bạn đang dùng bất kỳ một loại thuốc nào.

Tác dụng không mong muốn:

Phản ứng quá mẫn hoặc kích ứng tại chỗ hiếm khi được báo cáo.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Các nghiên cứu về sự sinh sản trên động vật không chỉ ra tác dụng độc hại nào của thuốc, nhưng chưa có thử nghiệm kiểm chứng nào được thực hiện trên phụ nữ có thai. Vì vậy, không nên dùng thuốc cho phụ nữ có thai trừ khi lợi ích điều trị vượt trội những nguy cơ có thể xảy ra. Terbinafine được bài tiết qua sữa mẹ và mặc dù với lượng hấp thu ít vẫn không nên dùng thuốc trong thời kỳ cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Quá liều

Chưa có trường hợp quá liều nào được biết đến.

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín và ở chỗ mát nhiệt độ dưới 30°C.

Số đăng ký: VN-

Nhà sản xuất:

DIHON PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.

45 Keyi Road, Kunming New and High-Tech. Industrial Development Zone, Yunnan, China.



TUQ. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng



ICOU WEN