

HỘP FLATOKAN: (W x D): 112 x 38 x 53 mm

500/0172

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 8/11/2013

FLATOKAN

GMP-WHO

- Suy tuần hoàn não, rối loạn tuần hoàn.
- Chống mất do rối loạn vận mạch.
- Û tai do rối loạn vận mạch.
- Suy giảm trí nhớ.

Cao Ginkgo biloba
80mg

6 vỉ x 10 viên nén bao phim

FLATOKAN
Ginkgo biloba extract 80mg



6 blisters x 10 film coated tablets

Composition: Each film coated tablet contains:
Ginkgo biloba extract.....80mg
Excipients q.s.....1 tablet.
Indications, contra-indications, dosage, administration:
Please refer to enclosed package insert.
Storage: In a dry and cool place, below 30°C,
protect from direct sunlight.
Do not refrigerate.
Keep out of reach of children.
Read the package insert carefully before use.
Specification: Manufacturer.

FLATOKAN



Manufacturer: **US PHARMA USA COMPANY LIMITED**
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC



TRUONG PHUC PHARMA
Marketed & Distributed by:
Truong Phuc Pharmaceutical & Trading Co., Ltd
50A Le Van Huân Str, Ward 13, Tan Binh Dist, HCMC



FLATOKAN

GMP-WHO

- Cerebral circulatory failure, circulatory disorders.
- Vertigo vasomotor disorders.
- Tinnitus vasomotor disorders.
- Memory loss.

Ginkgo biloba extract
80mg

6 blisters x 10 film coated tablets

FLATOKAN

SDK (Reg. No.):
Số lô SX (Batch No.):
Ngày SX (Mfd.):
HD (Exp.):

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa:
Cao Ginkgo biloba.....80mg
Tá dược v.d.....1 viên.
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.
Bảo quản:
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Không bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh.
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất.

FLATOKAN



Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**
Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP HCM



TRUONG PHUC PHARMA
Phân phối và tiếp thị bởi:
Công Ty TNHH TM & DP Trương Phúc
50A Lê Văn Huân, P. 13, Quận Tân Bình, TP HCM



VỈ FLATOKAN: (W x D): 107 x 50 mm





FLATOKAN

Viên nén bao phim chứa Cao bạch quả (Ginkgo biloba extract) 80 mg

Thành phần

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao bạch quả (Ginkgo biloba extract) 80,00 mg

Tá dược: Tinh bột ngô, Lactose, Microcrystallin cellulose 101, Polyvinyl pyrrolidon (PVP) K30, Aerosil, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC) 606, Titan dioxyt, Talc, Polyethylen glycol 6000, Màu vàng Quinolein, Màu đỏ ion oxyd.

Chỉ định

FLATOKAN được chỉ định trong các trường hợp:

- Giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.
- Suy tuần hoàn não.
- Rối loạn chức năng do thiếu máu cục bộ ở tai mũi họng và mắt (như chóng mặt, ù tai, giảm thính lực, suy võng mạc).
- Bệnh tắc nghẽn động mạch chi dưới mãn tính.
- Cải thiện hội chứng Raynaud.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Liều và cách dùng

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1 viên x 2 lần/ ngày. Uống trong hoặc sau bữa ăn.

Chống chỉ định

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Bệnh nhân bị rối loạn chảy máu.

Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

Trẻ em dưới 12 tuổi.

Thận trọng:

Rối loạn đông máu hoặc đang sử dụng thuốc chống đông.

Không dùng thay thế thuốc hạ áp đặc trị.

Phụ nữ mang thai, cho con bú

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.



Tương tác thuốc

Tăng nguy cơ chảy máu khi sử dụng chung với thuốc chống đông máu, chống huyết khối: warfarin, heparin, aspirin...

Liều cao FLATOKAN làm giảm hiệu quả của các thuốc chống động kinh carbamazepin, acid valproic. FLATOKAN có thể làm tăng hiệu quả cũng như tác dụng phụ của các thuốc IMAO (isocarboxazid, phenelzine, tranylcypromine), thuốc chống trầm cảm ức chế chọn lọc serotonin (sertralin).

Tác dụng phụ

Rất hiếm: nhức đầu, chóng mặt, tim đập nhanh, rối loạn tiêu hóa, rối loạn chảy máu, dị ứng ở da.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí

Quá liều có thể gây ra co giật do sự hiện diện của 4-metoxypyridoxine.

Xử trí: điều trị kịp thời với vitamin B6 có thể ngăn chặn các cơn co giật.

Dạng trình bày

Vỉ 10 viên, hộp 6 vỉ.

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản

Bảo quản thuốc ở nơi khô, thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Không bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY TNHH US PHARMA USA

Lô B1 – 10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam.

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08 37908860



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh