

Hộp 20 gói 5 m















Dung dịch uống FOLICEN
Gói 5 ml



 FOLICEN MEDCEN Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v) Gói 5 ml dung dịch uống	Thành phần: Mỗi 5 ml dung dịch uống chứa: Cao khô lá Thường Xuân (<i>Hederae helioides folii extractum siccum</i>) chiết bằng ethanol 30% (theo tỉ lệ 5 - 7,5:1) 0,7% (w/v) (35 mg/5 ml) Tà được vừa đủ Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. Bảo quản nơi khô, không quá 30°C, tránh ánh sáng. ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG! Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam Số lô - HD
---	--

Dung dịch uống FOLICEN
Gói 7,5 ml

 FOLICEN MEDCEN Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v) Gói 7,5 ml dung dịch uống	Thành phần: Mỗi 7,5 ml dung dịch uống chứa: Cao khô lá Thường Xuân (<i>Hederae helioides folii extractum siccum</i>) chiết bằng ethanol 30% (theo tỉ lệ 5 - 7,5:1) 0,7% (w/v) (52,5 mg/7,5 ml) Tà được vừa đủ Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. Bảo quản nơi khô, không quá 30°C, tránh ánh sáng. ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG! Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam Số lô - HD
--	--

Dung dịch uống FOLICEN

Hộp 20 ống 5 ml



Dung dịch uống FOLICEN
Hộp 20 ống 7,5 ml



Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp. Date:

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN



FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)



Hộp 20 ống x 7,5 ml dung dịch uống

FOLICEN

Thành phần:
Mỗi 7,5 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (*Hederae heli-
cisi extractum siccum*) chiết bằng ethanol
30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1) 0,7% (w/v) (52,5
mg/7,5 ml)
Tã được vừa đủ

Chỉ định:
Điều trị các triệu chứng ho do viêm đường
hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm
phế quản mạn tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30°C, tránh
ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG!



FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)



Hộp 20 ống x 7,5 ml dung dịch uống



Liều dùng:
- Trẻ nhỏ (2 - 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi
ngày
- Trẻ độ tuổi 6 - 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5
ml/lần x 3 lần mỗi ngày
- Người lớn: 5 - 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong các
liều: 2,5 ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng
cho liều 5 ml và 7,5 ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng
dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

Hộp 30 ống 5 ml

Cao khô là Thừng Xuân 0,7% (w/v)

FOLIGEN



FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)



Hộp 30 ống x 5 ml dung dịch uống

FOLIGEN

Thành phần:
Mỗi 5 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (*Hederae helicis folii extractum siccum*) chiết bằng ethanol 30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1) 0,7% (w/v) (35 mg/5 ml)
Tà dược vừa đủ

Chỉ định:
Điều trị các triệu chứng ho do viêm đường hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.
SDK - Reg. No.:

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG!**



FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)



Hộp 30 ống x 5 ml dung dịch uống

FOLIGEN


Liều dùng:


- **Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi):** 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày
- **Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi:** 5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày
- **Người lớn:** 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày


Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong các liều: 2,5 ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng cho liều 5 ml và 7,5 ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam







Dung dịch uống FOLICEN
Ống 5 ml



FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)



5 ml dung dịch uống

Không được tiêm

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Số lô - HD
QH - 09

Dung dịch uống FOLICEN
Ống 7,5 ml

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)



7,5 ml dung dịch uống

Không được tiêm

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Số lô - HD
QH - 09



FOLICEN

Thành phần:
Mỗi 1 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (*Hederae heli-
cis folii extractum siccum*) chiết bằng ethanol 30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1) 7 mg (0,7% w/v)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Bảo quản nơi khô, không quá 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.
SDK - Reg. No.:



60 ml dung dịch uống
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)


**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG!**

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhì
Thành, Thủ Thừa, Long An,
Việt Nam

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Dung dịch uống FOLICEN

Chai 90ml



Dung dịch uống FOLICEN

Chai 120ml



Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN



FOLICEN



120 ml dung dịch uống

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)



FOLICEN

Thành phần:
Mỗi 1 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (*Hederae heli-
cis folii extractum siccum*) chiết bằng ethanol
30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1) 7 mg (0,7% w/v)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định:
Điều trị các triệu chứng ho do viêm đường
hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm
phế quản mạn tính.
Bảo quản nơi khô, không quá 30°C, tránh
ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.
SDK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG!

FOLICEN



120 ml dung dịch uống

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)



FOLICEN

Liều dùng:
- **Trẻ nhỏ (2 - 5 tuổi):** 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi
ngày
- **Trẻ độ tuổi 6 - 11 tuổi và trên 12 tuổi:** 5
ml/lần x 3 lần mỗi ngày
- **Người lớn:** 5 - 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong các
liều: 2,5 ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng
cho liều 5 ml và 7,5 ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng
dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhì
Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)



FOLICEN

Thành phần:
Mỗi 1 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (*Hederae heli-
cis folii extractum siccum*) chiết bằng ethanol 30% (theo
tỉ lệ (5 - 7,5):1) 7 mg (0,7% w/v)
Tá dược vừa đủ

**Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông
tin khác:** Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
kèm theo.

Bảo quản nơi khô, không quá 30°C, tránh ánh
sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.
SDK - Reg. No.:



FOLICEN



120 ml dung dịch uống

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)



ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG!

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An,
Việt Nam

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

FOLICEN

Dung dịch uống

Đề xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THÀNH PHẦN

- Thành phần dược chất:** Mỗi 1 ml dung dịch chứa:
Cao khô lá thường xuân (*Hederae helicis folii extractum siccum*) chiết bằng ethanol 30% (theo tỉ lệ 5-7,5/1) 0,7% (kl/tt) (7 mg/ ml).
- Thành phần tá dược:** Sorbitol 70%, HPMC 606, acid citric khan, sucralose, natri benzoat, polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHẾ, MÔ TẢ SẢN PHẨM

Dung dịch uống.
Dung dịch trong suốt, màu vàng nâu đến nâu, mùi đặc trưng của dược liệu; không có cặn, tiểu phân lạ và váng mốc.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị các triệu chứng ho do viêm đường hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG

Liều dùng

Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày
Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày
Người lớn: 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng

Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong các liều: 2,5 ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng cho liều 5 ml và 7,5 ml.

Thời gian điều trị

Thời gian dùng thuốc tùy thuộc vào mức độ trầm trọng của các triệu chứng, nhưng phải dùng ít nhất là 1 tuần, ngay cả khi chỉ bị nhiễm trùng đường hô hấp nhẹ.
Để đảm bảo việc điều trị được thành công, nên dùng thuốc thêm 2-3 ngày sau khi đã hết các triệu chứng bệnh.
Trong trường hợp bệnh vẫn còn dai dẳng và xuất hiện tình trạng khó thở, sốt, đàm có mủ hoặc máu, phải đi khám bác sĩ ngay lập tức.



CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Đối với những trường hợp bất dung nạp fructose.

Trẻ em dưới 24 tháng (2 tuổi).

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Phụ nữ có thai và cho con bú

Bởi tính an toàn của thuốc trên phụ nữ có thai vẫn chưa được xác định, do đó không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Lưu ý đặc biệt

Cũng như các chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, FOLICEN có thành phần hoạt chất là chất chiết xuất từ thực vật, do đó màu của thuốc đôi khi có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của thuốc.

Tá dược

Sản phẩm có chứa sorbitol 70%, không chỉ định thuốc này trong những trường hợp bất dung nạp fructose do di truyền.

Sản phẩm chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) trong mỗi 5 ml, về cơ bản được xem như “không chứa natri”.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Do dữ liệu về tính an toàn chưa đầy đủ, không dùng FOLICEN cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Tương tác thuốc

Không dùng đồng thời với các thuốc được chuyển hoá qua isoenzym CYP450.

Người ta vẫn chưa phát hiện được việc uống thuốc FOLICEN cùng với các thuốc khác có gây những tác dụng không mong muốn hay không, vì vậy việc sử dụng FOLICEN đồng thời với các thuốc khác, ví dụ như kháng sinh, được xem là an toàn.

Tương kỵ

Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Những tác dụng không mong muốn được phân nhóm theo tần suất: rất thường gặp ($ADR \geq 1/10$), thường gặp ($1/100 \leq ADR < 1/10$), ít gặp ($1/1.000 \leq ADR < 1/100$), hiếm gặp ($1/10.000 \leq ADR < 1/1.000$), rất hiếm gặp ($ADR < 1/10.000$), không rõ tần suất (tần suất không ước tính được từ những dữ liệu có sẵn).

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Rất hiếm gặp: FOLICEN cũng có thể gây nhuận tràng do thuốc có chứa sorbitol.

Thông báo cho bác sĩ trong trường hợp có bất kỳ tác dụng không mong muốn nào liên quan tới việc dùng thuốc.

Báo cáo các phản ứng bất lợi nghi ngờ

Việc báo cáo các phản ứng bất lợi nghi ngờ sau khi sản phẩm được cấp phép là rất quan trọng. Nó cho phép theo dõi liên tục tỷ lệ lợi ích/nguy cơ của sản phẩm. Các chuyên gia y tế báo cáo mọi tác dụng phụ bị nghi ngờ về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Không có trường hợp quá liều đã được mô tả.

Trong trường hợp có dấu hiệu ngộ độc do dùng quá liều hoặc uống quá nhiều, rửa dạ dày và điều trị triệu chứng sẽ được thực hiện, nếu thích hợp.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 20 ống x 5 ml dung dịch uống.

Hộp 30 ống x 5 ml dung dịch uống.

Hộp 50 ống x 5 ml dung dịch uống.

Hộp 20 ống x 7,5 ml dung dịch uống.

Hộp 30 ống x 7,5 ml dung dịch uống.

Hộp 50 ống x 7,5 ml dung dịch uống.

Hộp 20 gói x 5 ml dung dịch uống.

Hộp 30 gói x 5 ml dung dịch uống.

Hộp 50 gói x 5 ml dung dịch uống.

Hộp 20 gói x 7,5 ml dung dịch uống.

Hộp 30 gói x 7,5 ml dung dịch uống.

Hộp 50 gói x 7,5 ml dung dịch uống.

Hộp 01 chai x 60 ml dung dịch uống, kèm cốc đong chia vạch.

Hộp 01 chai x 90 ml dung dịch uống, kèm cốc đong chia vạch.

Hộp 01 chai x 120 ml dung dịch uống, kèm cốc đong chia vạch.

BẢO QUẢN

Nơi khô, không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG

30 tháng (kể từ ngày sản xuất).

06 tháng kể từ lần đầu mở nắp (dạng chai).

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

250-
TY
ÂN
JEN
T.LO



MEDCEN

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam.

Long An, ngày 22 tháng 10 năm 2025



Phó giám đốc

Nguyễn Minh Nguyên

