


Mẫu hộp 6 vỉ x 10 viên bao phim xin lưu hành
 Kích thước thực: 10,3 cm x 5,3 cm x 5,0 cm

**BỘ Y TẾ
 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 20/12/2012



CÔNG THỨC:
 Bột tỏi (pulvis Allium) 350 mg
 Bột Nghệ (pulvis Curcumae) 100 mg
 Tá dược vừa đủ 1 viên bao phim

CHỈ ĐỊNH:
 - Giảm Cholesterol, giảm Lipid máu, giảm huyết áp, để phòng xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim.
 - Tăng cường hệ miễn dịch, điều trị hỗ trợ các bệnh nhiễm trùng.
 - Lợi mật, thông mật, giúp kích thích tiêu hóa.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
 - Phụ nữ mang thai.
 - Những người phế vị nhiệt, huyết nhiệt, cơ thể suy nhược không dùng được.
 - Thuốc không có chỉ định dùng cho trẻ em.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
 Uống 1-2 viên/lần. Ngày 2 lần hoặc theo toa bác sĩ.



BẢO QUẢN:
 Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 TRƯỚC KHI DÙNG**

Sản xuất tại: Nhà máy GMP - WHO
 số 930 C2, đường C, KCN Cát Lái,
 Q.2, TP. HCM.

Số lô SX: HD :
 Ngày SX:


Ngày 10 tháng 11 năm 2011
 TÓNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Từ

MẪU HỘP XIN LƯU HÀNH

Kích thước thực: 9,2 cm x 5,5 cm x 5,5 cm



Ngày 10 tháng 11 năm 2011

CÔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Từ

Mẫu nhãn xin lưu hành

Kích thước thực: 16,0 cm x 5,0 cm

CÔNG THỨC:
Bột tỏi (pulvis Allium)..... 300 mg
Bột nghệ (pulvis Curcumae)..... 100 mg
Tá dược vừa đủ..... 1 viên bao phim

CHỈ ĐỊNH:
- Giảm Cholesterol, giảm Lipid máu, giảm huyết áp,
để phòng xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim.
- Tăng cường hệ miễn dịch, điều trị hỗ trợ các bệnh nhiễm trùng.
- Lợi mật, thông mật, giúp kích thích tiêu hóa.

Sản xuất tại: Nhà máy GMP - WHO số 930 C2,
đường C, KCN Cat Lái, Q.2, TP. HCM.

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CHAI 100 VIÊN BAO PHIM

Garlicur. G

TIÊU CHUẨN: TCCS
SDK:



CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Phụ nữ mang thai.
- Những người phế vị nhiệt, loét dạ dày, cơ thể suy nhược.
- Thuốc không có chỉ định dùng cho trẻ em.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Uống 1-2 viên/lần, Ngày 2 lần hoặc theo toa bác sĩ.

BẢO QUẢN:
Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Số lô SX: _____
Ngày SX: _____ HD: _____



Ngày 10 tháng 11 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ



MẪU TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIÊN BAO PHIM GARLICUR - G

Kích thước thực : 9,2 cm x 13,5 cm

Garlicur. G

Viên bao phim

CÔNG THỨC : cho 1 viên bao phim

- Bột Tỏi (pulvis Allium).....350 mg
- Bột Nghệ (pulvis Curcumae).....100 mg
- Tá dược : Sodium starch glycolat, Avicel 101, Tinh bột ngô, Lactose monohydrat, Povidon K30, Nipagin, Aerosil 200, Magnesi stearat, Ethanol 96%, Hydroxypropylmethylcellulose 615 Cp, Polyethylen glycol 6000, Bột Talc, Tween 80, Titan dioxide lake, Oxid sắt vàng, Vàng tartrazin lake, Ethanol 96%, Nước tinh khiết.

TÍNH CHẤT:

- Tỏi: Tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, giảm huyết áp và chống tăng huyết áp, giảm cholesterol trong máu và lipid máu. Được đề nghị dùng trong để phòng xơ vữa động mạch. Ngoài ra còn điều trị trong các trường hợp bị cảm. Tỏi còn là chất kích thích cơ thể và điều hoà các chức năng chủ yếu như các rối loạn gan và các tuyến nội tiết nên được dùng trong chữa bệnh tiểu đường, phòng ung thư, giúp chống những bệnh xơ cứng động mạch, huyết áp, ...
- Nghệ: Tác dụng lợi mật và thông mật dùng làm thuốc chữa các bệnh về gan và giải độc gan. Ngoài ra còn có tác dụng làm tan cholesterol trong máu.

CHỈ ĐỊNH:

- Giảm cholesterol, giảm lipid máu, giảm huyết áp, để phòng xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim.
- Tăng cường miễn dịch điều trị hỗ trợ các bệnh nhiễm trùng.
- Lợi mật, thông mật, giúp kích thích tiêu hóa.

THẬN TRỌNG: Chưa có thông tin.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có thông tin.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Phụ nữ mang thai.
- Những người phế vị nhiệt, huyết nhiệt, cơ thể suy nhược.
- Thuốc không có chỉ định cho trẻ em.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa có thông tin.

Thông báo cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Phụ nữ có thai không nên sử dụng.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có thông tin.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG : Uống 1 - 2 viên. Ngày 2 lần hoặc theo toa bác sĩ.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI : Hộp 6 vỉ x 10 viên bao phim; Chai 100 viên bao phim.

BẢO QUẢN : Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG : 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Viên bao phim GARLICUR - G đạt theo TCCS.
- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Sản xuất tại: Nhà máy GMP - WHO số 930 C2, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. HCM.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T. PHARMA Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968

Email: duocpham32@ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com




PHÓ CỤC TRƯỞNG :

Nguyễn Văn Thanh

Ngày 10 tháng 08 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. *Lê Thanh Pử*