

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 18/01/2013

MẪU HỘP GIẤY



MẪU NHÃN LỘ NHỰA 200G



Thuốc mỡ chữa bỏng/ointment for burn treatment

200g

GLODESE-SH91



Medipharco Tenamydo BR S.r.l.
SINCE 1997

Thành phần: Cao khô **GLODESE - SH91** 8,5g
Tương đương: Thân, cành, lá cây Hoa già (*Dioscorea chinensis* Annonaceae) : 50g
Thân cây Bón bót (*Drochodon eriocarpum* Euphorbiaceae) : 50g
Tá dược vừa đủ 100g

Chỉ định: Phòng ngừa và điều trị nhiễm khuẩn trong bỏng, vùng lấy da, vết cắt rách trầy da, vết thương, nhiễm Herpes và các nốt côn trùng đốt.

Chống chỉ định: cách dùng - liều dùng, các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Điều kiện bảo quản: Nơi khô thoáng, dưới 30°C.

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SX tại: CTCP LDOP MEDIPHARCO TENAMYDO BR S.r.l.
8 Nguyễn Trường Tộ - Phường Vĩnh - Tp Huế - Tỉnh TT Huế



Số lô SX:

Hạn dùng:

Handwritten signature



MẪU TUÝP NHỰA

Hạn dùng:

GLODESE-SH91

Thành phần: Cao khô GLODESE-SH91.....8,5g

Tương đương:
Thân, cành, lá cây Hoa giẻ: 50g
(*Desmos chinensis* Annonaceae)
Thân cây Bòn bót: 50g
(*Glochidion eriocarpum* Euphorbiaceae)
Tã được vừa đủ100g

Chỉ định: Phòng ngừa và điều trị nhiễm khuẩn trong bỏng, vùng lấy da, vết đứt rách chảy da, vết thương, nhiễm Herpes và các nốt côn trùng đốt.

Điều kiện bảo quản:
Nơi khô thoáng, dưới 30°C.

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.





Thuốc mỡ chứa bỏng

GLODESE-SH91

GMP-WHO

Nhà SX: CTCP LDDP
MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.l

20g


S.G.C.N: 311032000039 - C.T.G.P
CÔNG TY CP
LIÊN DOANH
DƯỢC PHẨM
MEDIPHARCO TENAMYD
BR s.r.l
H. T. THỪA THIÊN HUẾ



* Ghi chú: Số lô SX và hạn dùng được in chìm ở đáy tuýp.

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

GLOSESE - SH91

Thuốc mỡ chữa bỏng

CÔNG THỨC: Mỗi 100 gam thuốc mỡ có chứa

Cao khô Glodese SH91: 8,5 g

Tương đương: Thân, cành, lá cây Hoa giề (*Desmos chinensis* Annonaceae): 50g

Thân cây Bòn bót (*Glochidion eriocarpum* Euphorbiaceae): 50g

Tá dược: Alcol cetylic, Lanolin, Dầu Parafin, Sáp ong trắng, Cetomacrogol,

Vaselin, Propylen glycol, Nipagin, Nước cất vừa đủ.....100 gam

TÁC DỤNG:

- Trên tổn thương bỏng: Giảm viêm, phù nề sung huyết, giảm tiết dịch nên giảm đau.
- Bỏng sâu, bỏng nhiễm khuẩn: Có tác dụng làm sạch giả mạc mủ, hoại tử bỏng, kích thích biểu mô hóa liền vết thương bỏng
- Trên vùng lấy da: Có tác dụng cầm máu, giảm viêm nề, tiết dịch, giảm tỷ lệ viêm mủ
- Đối với vi sinh vật: Có tác dụng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn, đặc biệt là đối với *Pseudomonas aeruginosa*, *S.aureus*

CHỈ ĐỊNH:

Phòng ngừa và điều trị nhiễm khuẩn trong bỏng, vùng lấy da, vết đứt rách trầy da, vết thương, nhiễm Herpes và các nốt côn trùng đốt.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Rửa sạch vết bỏng bằng nước muối sinh lý, loại bỏ dị vật và các hoại tử giác mạc nếu có. Rửa lại vết bỏng bằng nước muối sinh lý và sát trùng xung quanh vết bỏng bằng ethanol 70° Thấm khô vết bỏng bằng gạc vô trùng. Tẩm thuốc mỡ vào gạc vô khuẩn (khoảng 10g /150 cm² gạc).

- Ở tổn thương bỏng mới, bỏng sâu độ II và độ III:

Tẩm thuốc vào gạc hoặc bôi trực tiếp 1 lớp thuốc lên vùng tổn thương bỏng, phủ gạc vô khuẩn, băng kín, 3 ngày thay băng 1 lần

- Ở vùng lấy da: Tẩm thuốc vào gạc, phủ kín vùng lấy da, sau 24 - 48 giờ thay băng và để bán hở

- Ở tổn thương sâu, bỏng nhiễm khuẩn, các tổn thương khác: Tẩm thuốc vào gạc hoặc bôi trực tiếp lên vùng tổn thương, phủ gạc, băng kín. Thay băng hằng ngày hoặc cách ngày.

Thời gian điều trị: Điều trị cho đến khi lành hẳn hoặc khi tổn thương sẵn sàng cho ghép da.

Tuýp thuốc 20 g chỉ dùng trong 7 ngày sau khi mở nắp

Lọ thuốc 200 g để dùng chung, chỉ dùng trong 24 giờ sau khi mở nắp

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với các thành phần của thuốc

THẬN TRỌNG: Chỉ bôi ngoài da, tránh để thuốc dính vào mắt. Nếu có tình trạng kích ứng hay nhạy cảm,

ngưng điều trị hỏi ý kiến Bác sĩ.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON CON BÚ:

Không có tài liệu về tác dụng có hại với phụ nữ có thai và cho con bú

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa phát hiện thấy thông tin về tương tác thuốc

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Có cảm giác đau, nóng, rát tại chỗ khoảng 10 phút sau khi đắp thuốc.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có tài liệu về sử dụng quá liều.

LỜI KHUYẾN CÁO:

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Tuýp nhựa 20 gam, hộp 1 tuýp. Lọ nhựa 200 g.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.



CTCP LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEDI PHARCO TENAMYD BR s.r.l

8 Nguyễn Trường Tộ - P.Phước Vĩnh - Tp.Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

MEDI PHARCO TENAMYD BR s.r.l

ĐT: 054. 3611870 - 3822704

Fax: 054.3826077



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



Th.S Hoàng Thị Hồng Phương

Huế, ngày 17 tháng 1 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC