


Mẫu nhãn GLUCOFLEX 250

Hộp 30 viên (3 vỉ x 10 viên)

100% real size



Mẫu nhãn GLUCOFLEX 250

Vỉ 10 viên

100% real size

FLEX®250
Glucosamine sulfate 250mg
Phối:
AMPHARCO U.S.A
O U.S.A

GLUCOFLEX®250
Glucosamine sulfate 250mg
Sản xuất và Phân Phối:
CTY CPDP AMPHARCO U.S.A
N.N AMPHARCO U.S.A
SDK:

FLEX®250
Glucosamine sulfate 250mg
Phối:
AMPHARCO U.S.A
O U.S.A

GLUCOFLEX®250
Glucosamine sulfate 250mg
Sản xuất và Phân Phối:
CTY CPDP AMPHARCO U.S.A
N.N AMPHARCO U.S.A
SDK:

GLUCOFLEX®250
Glucosamine sulfate 250mg
Sản xuất và Phân Phối:
CTY CPDP AMPHARCO U.S.A
N.N AMPHARCO U.S.A
S Số lô SX: HD:

GLUCOFLEX®250
Glucosamine sulfate 250mg
Sản xuất và Phân Phối:
CTY CPDP AMPHARCO U.S.A
N.N AMPHARCO U.S.A

CÔNG TY
PHÂN
CÔNG TY CPDP AMPHARCO U.S.A
NHON TRÀ - H. T. ĐỒNG NAI

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

GLUCOFLEX® 250

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén dài bao phim chứa:

- Glucosamine sulfate 250 mg, tương đương với 196,3 mg glucosamin (dưới dạng Glucosamine sulfate potassium chloride) .
- Tá dược: Microcrystalline cellulose 101, Mannitol, Copovidone, Alginic acid, Stearic acid, Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose 102, Opadry white, Tartrazine lake, Nước tinh khiết vđ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH

Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống từ 1250mg đến 1500mg glucosamine / ngày (các dạng muối của glucosamine được quy đổi tương ứng với glucosamine), chia làm 3 lần. Với Glucoflex 250, có thể uống 6 viên chia làm 3 lần trong ngày. Có thể dùng đơn độc glucosamine sulfate hoặc phối hợp với các thuốc khác như chondroitine 1200mg/ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo từng cá thể, ít nhất dùng trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

TÁC DỤNG PHỤ

Thuốc có chứa sulfur nên có thể gây rối loạn tiêu hóa nhẹ và thoáng qua.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng bất lợi gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG

Khi điều trị các bệnh mãn tính, cần xem xét các khả năng sau:

- Khi áp dụng phác đồ điều trị lâu dài cần tiến

hành các xét nghiệm lâm sàng định kỳ: thử nước tiểu, xét nghiệm máu, xét nghiệm chức năng gan...

- Nên xem xét các phương pháp điều trị khác với việc dùng thuốc.

Khi điều trị các bệnh cấp tính, cần xem xét các khả năng sau:

- Cần theo dõi bệnh nhân trong trường hợp viêm cấp tính.
- Tránh dùng 1 loại thuốc trong một thời gian dài.

Không dùng chung với các thuốc kháng viêm giảm đau khác.

Lưu ý đến các tác dụng phụ khi dùng thuốc cho trẻ em và người lớn tuổi; nên dùng với liều thấp nhất có tác dụng trị liệu.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không nên kết hợp đồng thời thuốc này với các thuốc kháng viêm, giảm đau.

QUÁ LIỀU

Liều cao của Glucosamine có thể gây bất thường đường tiêu hóa như phân mềm, tiêu chảy, buồn nôn. Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ là cần thiết.

BẢO QUẢN

Ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng trực tiếp và nơi ẩm ướt.

TRÌNH BÀY

Vì 10 viên nén dài bao phim.
Hộp 3 vi và hộp 10 vi.

TIÊU CHUẨN
TCCS.

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.



*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ*

Sản xuất và phân phối:

CTY CPDP AMPHARCO U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Tel: 0613-566205

Fax: 0613-566203