

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/.../6.../2013

MẪU VỈ



SỐ LÔ SX, HD ĐƯỢC IN CHÌM TRÊN VỈ


MẪU HỘP



GLUCOSAMIN

GLUCOSAMIN

GMP - WHO



DOPHARMA

10 vỉ x 10 viên nang

S.D.K.K.D: 0100109113 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

CÁCH DÙNG - LIỀU LƯỢNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH,
TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**ĐỂ XA TẤM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

SDK:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
9 Trần Thành Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Sân xuất tại:
Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam
ĐT: 04.2041246

Trung



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

ĐỂ THUỐC XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

(Viên nang)

GLUCOSAMIN

TRÌNH BÀY: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

CÔNG THỨC: Cho 1 viên nang:

Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat Natri clorid) 250 mg
Tá dược (Magnesi stearat, Talcum, Aerosil) vđ 1 viên nang

CÁC ĐẶC TÍNH ĐƯỢC LỢI HOC:

Glucosamin tham gia quá trình chuyển hóa tổng hợp nên thành phần của sụn khớp. Nó là một amino - monosaccharide, nguyên liệu để tổng hợp proteoglycan, khi vào trong cơ thể nó kích thích tế bào ở sụn khớp tăng tổng hợp và trùng hợp nên cấu trúc proteoglycan bình thường. Kết quả của quá trình trùng hợp là muco-polysaccharide, thành phần cơ bản cấu tạo nên đầu sụn khớp. Glucosamine còn kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá trình mất calci của xương. Glucosamine đồng thời ức chế các enzym phá hủy sụn khớp như collagenase, phospholipase A2 và giảm các gốc tự do superoxi để phá hủy các tế bào sinh sụn. Glucosamine làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp. Vì thế glucosamine không những giảm triệu chứng của thoái hóa khớp (đau, khó vận động) mà còn ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển.

CÁC ĐẶC TÍNH ĐƯỢC ĐỘNG HOC:

Glucosamin sulfat được hấp thu rất tốt sau khi uống, khoảng 90-98% qua thành ống tiêu hóa, dễ dàng vận chuyển vào tế bào sụn khớp, kích thích tổng hợp glycosaminoglycans (yếu tố chủ yếu tạo sụn).

CHỈ ĐỊNH:

Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

CÁCH DÙNG - LIỀU LƯỢNG:

Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống 1250 mg đến 1500 mg glucosamin/ngày (5 - 6 viên/ngày) chia 3 lần. Có thể dùng đơn độc glucosamin sulfat hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin 1200mg/ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân bị quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR):

Hiếm gặp, thường nhẹ hoặc thoáng qua. Rất hiếm khi xảy ra rối loạn tiêu hóa, buồn ngủ, nhức đầu và đỏ da.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Glucosamin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi sử dụng chung với Heparin.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Sử dụng thận trọng trên những người mắc bệnh tiểu đường hoặc giảm glucose huyết. Cần theo dõi đường huyết thường xuyên trên bệnh nhân đái tháo đường. Thận trọng khi dùng trên những bệnh nhân bị rối loạn chảy máu hoặc đang dùng các thuốc làm tăng nguy cơ chảy máu. Trong trường hợp này có thể điều chỉnh liều nếu cần thiết. Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Chỉ sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Chưa có thông tin thuốc gây nguy hiểm với thai nhi và người cho con bú. Nhưng cần có sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ khi dùng thuốc.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE HOẶC VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa được ghi nhận.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Liều cao có thể gây đầy bụng, tiêu phân lỏng, buồn nôn.

Ngưng sử dụng thuốc và thông báo cho bác sĩ ngay khi có những triệu chứng quá liều.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam

Sản xuất tại:

Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam
ĐT: 04.20474126

Hà nội, ngày tháng năm 2013

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

Giám Đốc
ĐS Ngô Thị Tuyết Phương