



MẪU NHÃN THUỐC





1/ Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:



2/ Nhãn hộp trung gian:

Mẫu nhãn hộp 10 vỉ x 10 viên:

Chau



3. Toa hướng dẫn sử dụng thuốc:

GLUCOSAMIN 250		Viên nang
THÀNH PHẦN:	1 viên	
Glucosamin.HCl.....	250 mg	
Tá dược.....	vừa đủ	1 viên nang
(Tá dược gồm: Microcrystalline cellulose(Avicel) 110 mg, Talc 10 mg, Magnesi stearat 5 mg)		
DẠNG TRÌNH BÀY: Hộp 10 vỉ x 10 viên.		
CHÚ Ý: - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. - NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.		
ĐƯỢC LỰC HỌC: Kích thích sự chuyển hoá đồng hoá của các mô thuộc xương sụn thông qua kích thích sinh tổng hợp mucopolysaccharide (là thành phần thiết yếu của các chất quanh sụn) và các mô giữa của xương, qua đó ngăn ngừa tiến trình thoái hoá sụn. Glucosamin cung cấp hoạt tính làm trơn nên có tác động cải thiện độ nhớt của hoạt dịch.		
ĐƯỢC ĐỘNG HỌC: Hấp thu: bằng đường uống, sinh khả dụng 26% Phân bố: glucosamin nhanh chóng khếch tán vào mô và kết hợp với protein huyết thanh. Chuyển hóa: Glucosamin hydroclorid bị dehydroclorid, được chuyển hoá thành các phân tử nhỏ hơn (chủ yếu ở gan) và sau cùng thành khí carbonic, nước và urê. Nửa đời thải trừ: 70 giờ Thải trừ: Glucosamin hydroclorid được đào thải chủ yếu qua thận, một lượng nhỏ được thải trừ qua mật và đường hô hấp.		
CHỈ ĐỊNH: Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.		
LIỀU DÙNG: Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống từ 1500 mg đến 1800 mg/ngày, chia 3 lần. Có thể dùng đơn độc hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin 1200mg/ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.		
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu an toàn và hiệu quả điều trị.		
THẬN TRỌNG: Sử dụng thận trọng trên những người mắc bệnh tiểu đường hoặc giảm glucose huyết. Thận trọng khi dùng trên những bệnh nhân bị rối loạn chảy máu hoặc đang dùng các thuốc làm tăng nguy cơ chảy máu. Trong trường hợp này có thể điều chỉnh liều nếu cần thiết.		
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Thường gặp: khó chịu ở bụng, buồn ngủ, mất ngủ, đau đầu, phản ứng ở da và nhạy cảm với ánh nắng. Hiếm gặp: đau bụng, ăn không ngon, nôn, buồn nôn, đầy hơi, táo bón, ợ nóng và tiêu chảy.		
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ: Thời kỳ mang thai: chống chỉ định do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị. Thời kỳ cho con bú: chống chỉ định do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.		
TƯƠNG TÁC THUỐC: Glucosamin có thể làm giảm tác dụng của insulin hay các thuốc kiểm soát nồng độ đường trong máu khác. Dùng chung glucosamin với các thuốc lợi tiểu như furosemid có thể làm tăng tác dụng phụ của glucosamin. Glucosamin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi sử dụng chung với các thuốc gây tăng nguy cơ chảy máu, thuốc chống đông, thuốc chống kết tập tiểu cầu và các thuốc kháng viêm không steroid.		
QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Thông tin về quá liều do thuốc còn hạn chế. Trong trường hợp quá liều, bệnh nhân nên được theo dõi và điều trị triệu chứng.		
Lưu ý: Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.		
BẢO QUẢN - HẠN DÙNG: Bảo quản: Dưới 30°C. Nơi khô mát, tránh ánh sáng. ĐỂ THUỐC XA TẮM TAY TRẺ EM. Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.		
Tiêu chuẩn: TCCS.		



WHO - GMP

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA

Đường 2-4 Phường Vĩnh Hòa - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà

Nha Trang, ngày 28 tháng 3 năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Lê Nguyễn