

GLUCOSAMIN-BRV 750

Thuốc cốm

THÀNH PHẦN: Glucosamin sulfat 750 mg (tương đương với Glucosamin base 589 mg) và các tá dược gồm: Manitol, lactose monohydrat, aspartam, mùi cam bột, natri citrat, silic dioxyd dạng keo khan, sunset yellow, nước tinh khiết vừa đủ 1 gói 3 g.

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc cốm.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 30 gói.

DƯỢC LỰC:

Glucosamin là chất chủ yếu tạo nên sụn khớp, có đặc tính kích thích tạo sụn khớp, ức chế các enzym phá hủy sụn khớp và làm tăng sản xuất chất nhày bôi trơn khớp giúp cử động được dễ dàng. Glucosamin được dung nạp rất tốt và thuốc có tác dụng kéo dài sau vài tháng.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

Thuốc cốm GLUCOSAMIN – BRV 750 được dùng để làm giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều lượng: Mỗi ngày 2 gói, chia 2 lần.

Cách dùng: Hòa tan thuốc trong một ly nước và uống vào các bữa ăn. Một đợt điều trị từ 2 – 3 tháng tùy tình trạng bệnh, có thể lặp lại 2-3 đợt một năm nếu cần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn cảm với Glucosamin hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi (do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị).

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

- Đối với người cao tuổi, khi dùng lâu dài cần kiểm tra chức năng gan, thận và công thức máu định kỳ.
- Do thuốc điều trị nguyên nhân nên tác dụng của thuốc có thể bắt đầu sau một tuần trở đi, vì vậy nếu đau nhiều có thể kết hợp thêm thuốc giảm đau chống viêm trong những ngày đầu.

- Tuy thuốc không chứa đường nhưng do bản chất thuốc cũng nên thận trọng khi dùng cho bệnh nhân đái tháo đường.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

- Người đang dùng thuốc lợi tiểu cần dùng liều lớn hơn: 20mg/kg/ngày.
- Khi dùng chung với Heparin có khả năng làm tăng nguy cơ chảy máu.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng thuốc cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không có tài liệu đề cập đến.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Không có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Glucosamin không gây tác dụng phụ trên dạ dày ruột như các thuốc chống viêm không steroid.
- Tác dụng phụ thường rất nhẹ và thoáng qua. Hiếm khi gặp khó chịu ở dạ dày, nôn, ăn khó tiêu hay tiêu chảy khi đó nên uống thuốc trong bữa ăn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẒẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ.

WHO-GMP

TOA GLUCOSAMIN-BRV 750 24-A

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

Địa chỉ: Khu A, số 18, đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM