







Thành phần:

Mỗi g nhũ tương chứa:

Methyl salicylat.....30%

Menthol.....8%

Dạng bào chế: Lotion

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Bảo quản : Trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Lắc kỹ trước khi dùng

SĐK:

Số lô SX:

NSX: dd.mm.yy

HD: dd.mm.yy

Nhà đăng ký :



Công ty TNHH Dược phẩm VNP

Ở 91 + 92 A3 khu Đô thị Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Nhà sản xuất:



Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.

Nhãn lọ



NEW GOLSAMIN
Lotion

Methyl salicylat 30%
Menthol 8%

Lọ 57 g

NEW GOLSAMIN
Lotion

Thành phần:
Mỗi g nhũ tương chứa:
Methyl salicylat.....30%
Menthol.....8%

Dạng bào chế: Lotion

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Bảo quản : Trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em
Lắc kỹ trước khi dùng

SĐK:
Số lô SX:
NSX: dd.mm.yy
HD: dd.mm.yy

Nhà đăng ký :
Công ty TNHH Dược phẩm VNP
Ô 91 + 92 A3 khu Đô thị Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Nhà sản xuất:
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.

Nhãn lọ

GOLSAMIN NEW

Methyl salicylat 30%+ Menthol 8%

Để xa tâm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Lắc kỹ trước khi dùng



Thành phần:

Mỗi g chứa:

Thành phần hoạt chất:

Methyl salicylat.....30%

Menthol.....8%

Thành phần tá dược:

PEG-100 stearate, glycerin, castor oil, propylen glycol, cồn 96°, span 80, tween 80, acid stearic, dinatri EDTA, methyl paraben, propyl paraben, natri citrat, nước tinh khiết.

Dạng bào chế: Lotion

Mô tả: Nhũ tương màu trắng đục, đồng nhất sau khi lắc

pH: 4,0-8,0

Chỉ định

Giảm đau trong các trường hợp:

- Thấp khớp, viêm khớp, sưng trực, vết bầm.
- Đau lưng hay đau cứng vai trong công việc.
- Đau khớp ở khuỷu tay, đầu gối và mắt cá chân.
- Đau và mỏi cơ sau các hoạt động thể dục thể thao hoặc ở người già.

Liều dùng và cách dùng

Xoa một lượng nhũ tương vừa đủ, nhẹ nhàng lên vùng đau, lăn nhẹ phần massage lên chỗ đau. Tùy nhu cầu, có thể bôi Golsamin new nhiều lần trong ngày. Rửa tay ngay sau đó để tránh tiếp xúc với mắt trừ khi dùng thuốc điều trị ở tay.

Chống chỉ định

- + Chống chỉ định với các trường hợp mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- + Không bôi lên các vết thương có các triệu chứng nhiễm trùng (sưng, nóng, đỏ, đau) vì các thuốc có tính dầu nóng sẽ làm giãn mạch máu, khiến cho máu đổ về tăng lên, ứ trệ lại. Hậu quả là viêm càng sưng và phù nề hơn.
- + Chống chỉ định với trẻ em dưới 3 tuổi.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc



- + Chỉ dùng ngoài, tránh tiếp xúc với mắt hay niêm mạc.
- + Không thoa lên vùng da bị trầy xước, kích ứng hay mẫn cảm.
- + Nếu thấy mẩn đỏ, phát ban ngoài da thì nên ngừng thuốc vì có thể có dị ứng với thuốc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ có thai và cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Nói chung không nên dùng Golsamin new trong thời gian dài hoặc bôi trên diện rộng vì chưa có đủ dữ liệu an toàn trên đối tượng này.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Không gây ảnh hưởng.

Tương tác, tương kỵ của thuốc

Methyl salicylat tương tác với các thuốc nhóm chống đông máu như acenocoumarol, wafarin, wafarin sodium, wafarin posstasium, fluindion, phenydion làm tăng nguy cơ chảy máu do methyl salicylat có tác dụng trên quá trình đông máu. Vì vậy, cần tránh phối hợp này, trong trường hợp bệnh nhân sử dụng đồng thời các thuốc này, cần phải thận trọng và có sự giám sát chặt chẽ.

Tác dụng không mong muốn của thuốc

Thuốc có thể gây viêm da dị ứng, kích ứng da nếu sử dụng thuốc dài ngày.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều và cách xử trí

Các nghiên cứu cho thấy dùng Golsamin new không gây hiện tượng quá liều.

Quy cách đóng gói:

Hộp 1 lọ 57 g

Hộp 1 lọ 114 g

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Nhà sản xuất



Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

