

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 22/06/2017

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

WHO-GMP

HAPUKGO 40

Cao khô lá Bạch quả (tương đương 9,6 mg flavonol glycosides) 40 mg



DVT
HATAPHARM

HAPUKGO 40
Cao khô lá Bạch quả (tương đương 9,6 mg flavonol glycosides) 40 mg

Thành phần: Mỗi viên nang cứng chứa:
Cao khô lá Bạch quả (tương đương 9,6 mg flavonol glycosides) 40 mg
Tá dược vđ 1 viên
Chỉ định - Chống chỉ định - Cách dùng - Liều dùng và các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông
- TP. Hà Nội
SDK (Reg.No) :
Số lô SX (Lot.No) :
Ngày SX (Mfg.Date) :
HD (Exp.Date) :

Box of 3 blisters x 10 capsules

WHO-GMP

HAPUKGO 40

Extractum Folium Ginkgo biloba siccus (equivalent to 9,6 mg flavonol glycosides) 40 mg



DVT
HATAPHARM

Composition: Each capsule contains:
Extractum Folium Ginkgo biloba siccus (equivalent to 9,6 mg flavonol glycosides) 40 mg
Excipients q.s.f. 1 capsule
Indications - Contraindications - Dosage - Administration and other informations: See the package insert inside.
Storage: Store in a dry place, below 30°C
Precautions: Manufacturer's
Keep out of reach of children. Carefully read the accompanying instructions before use.

Manufactured by:
HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C
Population groups No. 4 - La Khe -
Ha Dong - Ha Noi city



HAPUKGO 40
Cao khô lá Bạch quả (tương đương 9,6 mg flavonol glycosides) 40 mg
Sản xuất tại: **CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

HAPUKGO 40
Cao khô lá Bạch quả (tương đương 9,6 mg flavonol glycosides) 40 mg
Manufactured by:
HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C
Reg.No:

HAPUKGO 40
Cao khô lá Bạch quả (tương đương 9,6 mg flavonol glycosides) 40 mg
Sản xuất tại: **CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**
Số lô SX: **HD:**

Hướng dẫn sử dụng thuốc HAPUKGO 40

- **Dạng thuốc:** Viên nang cứng

- **Qui cách đóng gói:** Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên.

- **Thành phần:** Mỗi viên nang cứng chứa:

Cao khô lá Bạch quả (tương đương 9,6 mg flavonol glycosides) 40 mg

Tá dược vd

(Tá dược gồm: Tinh bột sắn, amidon, lactose, gelatin, magnesi stearat, bột talc)

- **Chỉ định:**

* Giảm trí nhớ, kém tập trung tư tưởng, đặc biệt ở người cao tuổi để chống stress.

* Các triệu chứng đau do suy tuần hoàn ở động mạch ngoại vi như đau thắt lưng, rối loạn dinh dưỡng.

* Thiếu năng tuần hoàn não, ù tai, chóng mặt, giảm thị lực và vài chứng suy võng mạc mắt do thiếu máu cục bộ.

* Thuốc còn dùng trong chứng đau cách hồi do tắc động mạch chi dưới mạn tính, hội chứng Raynaud.

- **Cách dùng - liều dùng:**

Người lớn: Uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày.

Trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1 viên/lần x 2-3 lần/ngày.

Hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

- **Chống chỉ định:**

Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai, thiếu năng trí tuệ bẩm sinh. Trẻ em dưới 12 tuổi. Giai đoạn cấp của tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim cấp, hạ huyết áp.

- **Thận trọng:**

Thuốc không phải là thuốc hạ huyết áp vì vậy không thể thay thế cho các thuốc điều trị cao huyết áp.

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:**

Thuốc dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú khi thật cần thiết theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Nhẹ và hiếm gặp có thể gây rối loạn tiêu hoá, nhức đầu, chóng mặt, dị ứng da, hạ huyết áp, đánh trống ngực, có thể gây rối loạn chảy máu.

* **Ghi chú:** "Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Không nên dùng đồng thời với thuốc chống đông máu hoặc aspirin. Thuốc hấp thu tốt ở phần trên đường tiêu hoá, dùng thuốc vào bữa ăn đảm bảo hấp thu thuốc nhanh và hoàn toàn vì thuốc lưu lại lâu ở đường tiêu hoá. Không dùng cùng thuốc chống trầm cảm, thuốc chống động kinh.

- **Sử dụng quá liều:** Chưa có tài liệu báo cáo.

- **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.** Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, dính nang, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới trả lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS



ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

*"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ, dược sĩ"*

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

Số điện thoại: 04.33824685 Số fax: 04.33829054



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**
Đỗ Minh Hùng

