

370/152

MẪU NHÃN DỰ KIẾN



I. NHÃN HỘP :

Rx | Thuốc bán theo đơn / Prescription only

GMP-WHO

HEPTAMINOL

Heptaminol hydrochloride 187,8mg

HỘP 2 vỉ x 10 VIÊN NÉN / Box of 2 blisters x 10 tablets

Sản xuất tại:

CTCP HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt-Q.11-TP. HCM-Việt Nam

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
Sản xuất theo TCCS.
Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng,
nhiệt độ không quá 30°C.

HEPTAMINOL

SDX/Reg. No.:

Số lô SX/Batch No.:

Ngày SX/Mfg. Date:

HD/exp. Date:

Composition:

Heptaminol hydrochloride 187,8mg

Excipients q. for 1 tablet

Xem tờ hướng dẫn sử dụng

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Tà được vừa đủ 1 viên

Heptaminol hydrochloride 187,8mg

CÔNG THỨC:

Manufactured by:

Mekophar Chemical Pharmaceutical J.S. Co
297/5 Lý Thường Kiệt St - Dist 11 - HCMC - Vietnam

8 934574 010924



II. NHÃN VỈ :

(Số lô SX, hạn dùng in nổi trên vỉ)



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: (SCBS LẦN 1)

R_x

HEPTAMINOL

Viên nén

CÔNG THỨC: cho 1 viên

- Heptaminol hydrochloride.....187,8 mg
- Tá dược..... vừa đủ 1 viên

(Dicalcium phosphate khan, Povidone, Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Low-substituted hydroxypropyl cellulose, Colloidal silicon dioxide, Tinh bột ngô)

DƯỢC LỰC HỌC:

Heptaminol có tác dụng kích thích α_1 – adrenergic nên gây co mạch ngoại vi dẫn đến tăng huyết áp.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Heptaminol được hấp thu nhanh và hoàn toàn sau khi uống, nồng độ đỉnh trung bình trong huyết tương là 1,6mg/l đạt được sau khi uống 1,8 giờ. Thời gian bán thải trong huyết tương khoảng 2,5 - 2,7 giờ. Heptaminol đào thải chủ yếu qua thận dưới dạng không chuyển hóa trong vòng 24 giờ.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị các trường hợp bị hạ huyết áp tư thế (cảm giác choáng váng khi thay đổi đột ngột từ tư thế đang nằm hoặc ngồi sang tư thế đứng dậy), đặc biệt trong trường hợp do dùng thuốc hướng tâm thần.

CÁCH DÙNG:

- Theo chỉ dẫn của bác sỹ.
- Liều thông thường:
 - + Người lớn: uống 1 - 2 viên/lần, 3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Tăng huyết áp nặng.
- Cường giáp.
- Phù não, động kinh.
- Kết hợp với IMAO (nguy cơ tăng huyết áp kịch phát).

THẬN TRỌNG:

- Các vận động viên thể thao cần lưu ý vì hoạt chất trong thuốc có thể cho kết quả dương tính với các xét nghiệm khi kiểm tra các chất kích thích.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY:

- Người lái xe và vận hành máy cần thận trọng khi dùng thuốc này.

THỜI KỲ MANG THAI – CHO CON BÚ:

- Phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú nên tránh dùng vì chưa có dữ liệu về việc Heptaminol có ảnh hưởng đến bào thai và tiết được vào sữa mẹ.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- IMAO: không phối hợp (nguy cơ tăng huyết áp kịch phát).
- Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Nổi ban da, phát ban, nhịp tim đập nhanh.

Ngừng sử dụng thuốc và thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Có một số rất hiếm trường hợp uống quá liều Heptaminol hydrochloride được báo cáo. Trường hợp uống quá liều Heptaminol: cần theo dõi huyết áp và nhịp tim tại bệnh viện.

Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TRÌNH BÀY:

Vi 10 viên. Hộp 2 vi.

Sản xuất theo TCCS

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày 20 tháng 5 năm 2015

Tổng Giám Đốc



DS. *Huỳnh Thị Lan*



TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

