


MẪU NHÃN

1/ Vĩ 10 viên nén



Số lô SX, hạn dùng:
in chìm trên vĩ



MẪU NHẬN

2/ Hộp 5 vỉ x 10 viên

Hexyltab Rx	Hexyltab Rx - Thuốc bán theo đơn GMP-WHO Biphenyl dimethyl dicarboxylat 25mg Hộp 5 vỉ x 10 viên nên	Hexyltab Thành phần: Cho 1 viên Biphenyl - dimethyl - dicarboxylate..... 25mg Tá dược vừa đủ..... 1viên Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Hexyltab Rx	Hexyltab Rx - Prescription drug GMP-WHO Biphenyl dimethyl dicarboxylat 25mg 5 blisters x 10 tablets	Hexyltab Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng: Xin xem kỹ trong tờ hướng dẫn sử dụng Bảo quản: ở nhiệt độ dưới 30°C. Để nơi khô thoáng, tránh ánh sáng ĐỂ THUỐC XA TẦM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 9 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ds. Nguyễn Thị Sơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC - XIN ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG

VIÊN NÉN

Rx HEXYLTAB
(THUỐC BÁN THEO ĐƠN)

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa

- Biphenyl - dimethyl – dicarboxylat..... : 25 mg
- Tá dược (Lactose, Eragel, Amidon deble, PVP, Natri lauryl sulfat, Avicel, Magnesi stearat, Aerosil) vừa đủ..... : 1 viên

DƯỢC LỰC HỌC:

- Biphenyl dimethyl dicarboxylat ức chế sự hủy hoại tế bào gan, cải thiện đáng kể sự suy giảm chức năng gan và các triệu chứng viêm gan.
- Tăng cường chức năng khử độc gan, kích thích tái tạo tế bào gan.
- Bảo vệ tế bào gan khỏi thương tổn do các chất độc như rượu, các thuốc độc đối với gan.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Biphenyl dimethyl dicarboxylat hấp thu qua đường uống. Thuốc tập trung chủ yếu ở gan và bài tiết dưới dạng không đổi, chủ yếu qua phân.

CHỈ ĐỊNH :

Thuốc được dùng trong các trường hợp: hỗ trợ điều trị viêm gan do siêu vi (cấp và mạn tính, kể cả viêm gan siêu vi B), viêm gan do rượu, viêm gan do dùng thuốc, gan nhiễm mỡ, rối loạn chức năng gan (mệt mỏi, khó ở, biếng ăn...).

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Dùng theo sự chỉ định của bác sĩ hoặc dùng liều trung bình là :

- * *Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi :* 1-2 viên/ lần x 3 lần/ ngày, uống sau bữa ăn.
- * *Trẻ em :* 2 - 6 tuổi : 1 - 2 viên /ngày.
6 - 12 tuổi : 2 - 3 viên/ngày.

Trẻ em dưới 2 tuổi : Cần tham khảo ý kiến Bác sĩ .

Sau khi men ALT trở về bình thường, nên duy trì trị liệu bằng Biphenyl dimethyl dicarboxylate trong vòng 6 tháng đến 1 năm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Bệnh nhân dị ứng với thành phần của thuốc.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: không có thông tin

TÁC DỤNG NGOẠI Ý:

- Thỉnh thoảng có xuất hiện ngoại ban, tuy nhiên triệu chứng có thể mất đi khi dùng thuốc kháng dị ứng.
- Có thể xuất hiện chứng vàng da thoáng qua, tuy nhiên triệu chứng có thể mất đi nếu ngưng thuốc hay dùng đồng thời với thuốc trị vàng da.
- Hiếm khi gây buồn nôn.

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc



TƯƠNG TÁC THUỐC :

- Không có tương tác thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: không có thông tin

KHUYẾN CÁO:

- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng như: viên bị ướt, bị biến màu.

- *Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hãy hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ.*

TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN :

- Thuốc ép trong vỉ bấm 10 viên , hộp 05 vỉ có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C. Để thuốc nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng. **ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.**

- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Thuốc được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - TP Đà Nẵng

Tel: 0511.3760130 Fax: 0511.3760127 Email: Info@danapha.com

Điện thoại tư vấn : 0511.3760131

Và phân phối trên toàn quốc

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 7 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Quang Trị, MBA

