

THUỐC HO THẢO DƯỢC

* Tên sản phẩm: THUỐC HO THẢO DƯỢC

* Khuyến cáo:

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

“Để xa tầm tay trẻ em”

“Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc”

* Công thức cho 1 chai:

Thành phần Hoạt chất	Tên khoa học	Hàm lượng
Cát cánh	<i>Radix Platycodi grandiflori</i>	6 g
Kinh giới	<i>Herba Elsholtziae ciliatae</i>	10 g
Từ uyển	<i>Radix et Rhizoma Asteris tatarici</i>	10 g
Bách bộ	<i>Radix Stemonae tuberosae</i>	10 g
Hạnh nhân	<i>Semen Armeniacae amarum</i>	10 g
Cam thảo	<i>Radix Glycyrrhizae</i>	8 g
Trần bì	<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>	8 g
Mạch môn	<i>Radix Ophiopogonis japonici</i>	10 g
Thành phần Tá dược (Natri benzoat, Đường trắng, Nước tinh khiết): vừa đủ 100 ml		

* Dạng bào chế: Siro thuốc.

* Quy cách đóng gói: Thuốc được đóng trong chai nhựa 100 ml, 1 chai + 1 cốc chia liều + 1 tờ HDSĐ được đựng trong 1 hộp giấy cứng.

* Chỉ định: Trị chứng ho do lạnh, ho lâu ngày không dứt, ho đờm nhiều, khạc đờm khó, viêm phế quản cấp và mạn tính.

* Liều dùng và cách dùng:

- Liều dùng:

+ Trẻ em 5-12 tuổi: Uống 10 ml/lần x 2-3 lần/ngày.

+ Từ 12 tuổi trở lên: Uống 15 ml /lần x 2-3 lần/ngày.

- Cách dùng: Uống trực tiếp hoặc có thể pha loãng với một ít nước ấm hoặc nước đun sôi để nguội.

* Chống chỉ định: Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Người đái tháo đường, trẻ em dưới 5 tuổi, người có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

* Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Thận trọng dùng thuốc khi đang rối loạn tiêu hóa (đau bụng tiêu chảy).

*** Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

- Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

- Trường hợp phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

*** Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:** Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

*** Tương tác, tương kỵ của thuốc:**

- *Tương tác của thuốc:*

+ Chưa ghi nhận được các tài liệu hoặc báo cáo nào về tương tác của thuốc với các thuốc tây y, nhưng nếu phải dùng đồng thời với thuốc tây y thì tốt nhất nên uống cách nhau 2h.

- *Tương kỵ của thuốc:* Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

*** Tác dụng không mong muốn:** Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Phải thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi có bất cứ dấu hiệu bất thường nào xảy ra khi sử dụng thuốc.

*** Quá liều và cách xử trí:**

- Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

- Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

*** Bảo quản:** Để nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C.

*** Hạn dùng của thuốc:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*** Tiêu chuẩn:** TCCS

Cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái

Địa chỉ: 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái

ĐT: 0216 3852 523 - Fax: 0216 3850 364